Hortus botanicus regiae Academiae oeconomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

QK73
.C953
T32
1908-191

III.
Delectus seminum plantarum
anno 1908 collectorum.

Gymnospermae.

Coniferae.

Larix europaea D. C.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L.
Sagittaria frondescens G. F. & W. Mey.
„ horizontalis Willd.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria psittacina Lehm.
Galanthus Forsteri Baker.
Ixiolirion Pallasii Fisch & Mey.

Cannaceae.

Canna indica L. var. amoena.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
„ atrata L.
Carex capillaris L.
„ contigua Hoppe.
„ curvata Knaf.
„ cyperoides L.
„ distans L.
„ divulsa Good.
„ echinata Murr.
„ ericetorum Poll.
„ ferruginea Scop.
„ festiva Dewey.
„ flava L.
„ glauca Murr.
„ hordeiformis Thuill.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ irrigua Sm.
„ lamprocarpa Čel.
„ lepidocarpa Tsch.
„ leporina L.
„ limosa L.
„ Michelii Host.
„ montana L.
„ multiflora Wahlenbg.
„ muricata L.

Mo. Bot. Garden

Carex Oederi Ehrh.
„ ovata Burm.
„ pallescens L.
„ panicea L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ pilulifera L.
„ praecox Jacq.
„ Pseudo-cyperus L.
„ pulicaris L.
„ punctata Gaud.
„ remota L.
„ rhynchophysa Fisch. Mey & Avè-Lall.
„ rigida Good.
„ riparia Curt.
„ rupestris All.
„ secalina Wahlbg.
„ sempervirens Willd.
„ Shortiana Dewey.
„ silvatica Huds.
„ teretiuscula Good.
„ vesicaria L.
„ vulgaris Fries.
„ vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
„ flavescens L.
„ fuscus L.
„ longus L.
„ mucronatus Rottl.
„ Paramatta Balb.
„ tenellus L.
Eriophorum alpinum L.
„ angustifolium Roth.
„ polystachyum Rotr.
„ vaginatum L.
Scirpus acicularis L.
„ Holoschoenus L.
„ lacustris L.
„ ovatus Rotr.
„ palustris L.
„ Tabernaemontani C. C. Gmel.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch. var. aristata.
„ „ „ „ inermis.
Avena fatua L.
„ nuda L. var. inermis.
„ „ „ „ aristata (Bohemia).
„ „ „ „ „ (Germania).

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ obtusata Al. alba (Hungaria).
3. „ a) pugnax. Al.
b) „ „ (Polend).
4. „ a) tatarica (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
5. „ a) tristis Al. (Hungaria).
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. a) aurea Kcke (Bourbon).
b) „ „ (Osetia, Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
2. „ brunnea Kcke.
3. „ grisea Kcke.
4. „ Krausei Kcke.
5. „ a) montana Alef.
b) „ „ (Brauner begrannter).
6. „ mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt.
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Germania.
h) Hirsch.
i) Landa's Grün-Hafer.
j) Lapponia.
k) Leutewitz.
l) Ligovo.
m) Oderbruch.
n) Podolia.
o) Polonia.
p) Probstei.
r) Romania.
s) Silesia.
t) Triumf.

Avena sativa L.

7. var. a) nigra Krause (Étampes).
 b) „ „ (Fennia).
 c) „ „ (Kylbergensis).
8. „ a) praegravis Langethal (Australia).
 b) „ Langethal (Germania).
 c) „ Langethal (Scotia).
 d) „ Langethal (Willkommen).
9. „ a) setosa Kcke
 b) „ „ (Brauner borstiger).
10. „ a) trisperma Schübler, aristata.
 b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Hort.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
 a) Altona.
 b) Dania.
 c) Imperial.
 d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
 a) Bavaria.
 b) Bestehorn.
 c) Chevalieri.
 d) Chile.
 e) giganteum.
 f) Hierosolyma.
 g) Philadelphia.
 h) Phoenix.
 i) Probstei.
 j) Nolč's Imperial Typ A.
 k) „ „ „ B.
 l) „ „ „ C.
 m) „ Bohemia Gerste.
 n) „ boemische früheste.
8. var. spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
 b) „ „ (hymalayense).
 c) „ „ (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
 b) „ „ (brachyurum.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. genuinum.
 a) Cyprus.
 b) Italia.
 c) Marocco.
 d) Mandschuria.
 e) Norvegia.
 f) Peru.
 g) Rimpaui.
2. „ a) coeleste L. (lucidum).
 b) „ „ (obscurum).
3. „ a) coerulescens Kcke. (florentinum.
 b) „ Kcke. (oryzoides).
4. „ leiorrhynchum Kcke.
5. „ nigrum Willd.
6. „ pallidum Ser.
7. „ trifurcatum Schl. (Nepal).
8. „ a) violaceum Kcke.
 b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

„ Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.

„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.

Hordeum zeocriton L.
- „ **Steudelii ♀ × trifucatum ♂ H.**
- „ **zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.**
- „ „ **♀ × trifurcatum ♂ B.**
- „ „ **♀ × trifurcatum ♂ C.**
- „ „ **♀ × trifurcatum ♂ D.**

Secale cereale L.

a) Brandenburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum baeoticum Boiss.

Triticum compactum Host.

1. var. clavatum Alef.
2. „ creticum Mazz.
   a) Blé Herison sans barbes.
   b) Germania.
   c) Palermitanum.
3. „ echinodes Kcke.
4. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
5. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum.
3. „ Bauhini Alef. (Roter sammtiger).
4. „ brunneum Alef.
5. „ campylodon Kcke.
6. „ cladurun Alef.
7. „ farrum Bayle.
8. „ Fuchsii Kcke.
9. „ Krausei Alef.
10. „ liguliforme Kcke.
11. „ macrantherum Kcke.
12. „ pycnurum Alef.
13. „ rufum Schübl. (Roter, Sommer).

Triticum durum Desf.

a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) Germerode.
d) Malaga.

1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelas Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murcieuse Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum monococcum L.

1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause (Hispania).
4. „ chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens.
8. „ a) velutinum (latum).
   b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thavudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.
a) Běloturka (guber. Saratow).
b) Compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.
1. var. Dreischianum Kcke (Bela Sadovska Opitna Stanzia).
2. „ gentile Kcke (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke (Portugal).
4. „ megapolitanum Kcke.

Triticum vulgare L.
1. var. albidum Alef.
2. „ aristatum.
b) Victoria.
a) Chrestenseni.
3. „ barbarossa Alef.
4. „ a) caesium Alef.
b) „ „ Blauer, Sommer.
5. „ coeruleo velutinum Kcke.
6. „ erythrospermum Kcke.
a) aristatum.
b) Petali.
c) Salerno.
7. „ ferrugineum Alef.
a) Hunderttägig.
b) Umea.
8. „ graecum.
9. „ a) Hostianum.
b) „ Weisser Sammtiger Gramen.
10. „ leucospermum Kcke.
11. „ lutescens Alef (Küstendil).
12. „ muticum.
a) Australia.
b) California.
c) Heine's W.
d) Noë's W.
e) Schlandstaedt.
f) Slané (Bohemia).

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.
1. gigantea.
2. sibirica.

Hordeum hexastichum L.
1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum.
b) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ Chrestenseni.

Hordeum tetrastichum L.
1. Alberti.
2. Chrestenseni.
3. Groeningense.
4. luteum.
5. Mammuth.

Hordeum tetrastichum L. var. nigrum.

Hordeum tetrastichum L. var. lupulinum.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.
1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. saxonicum giganteum.
4. Hirschberg.
5. Lipsia.
6. Pirna, montanum.
7. Probstei.
8. Petkuss.
9. Hessischer Stauden-R.
10. Schlanstaedt.
11. Schlaraffen-Roggen.
12. Thüringen (Imperial).
13. Göttingen.
14. Brandenburg (Bauern-Roggen).
15. Ober-Wartha.
16. Kornkammer.
17. Hyperbel.
18. Walkenhaus.
19. Louisenhof-Square-head.
20. Campigner R.
21. Montagner R.
22. Champagner R.
23. Dania.
24. Suecia.
25. Norvegia.
26. Helsingfors.
27. Rossia.
28. Podolia.
29. Azow.
30. Wechselroggen v. Zborow.
31. Sibiria.
32. Heine's Zeelander.
33. Zeelander Original.
34. Alpinum.

Secale cereale L.
35. Romanum.
36. Hispanicum.
37. Abessinicum.
38. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
39. Bestehorn's R.
40. Chrestensen's R. giganteum.
41. Chrestensen's Doppelroggen.
42. Correns R.
43. Wasa.
44. Victoria (vom Harz).
45. Riesen-Staudenroggen.
46. Monstré.
47. Bahlsen's-Elite R.
48. Bahlen' »Ascania«.
49. Jubiläum's R.
50. Vaněk's »Mammuth«-R.
51. Landa's »Hannibal«-R.
52. Chrestensen's Triumph-R.
53. Vaněk's Excelsior R.
54. Vaněk's König's R.
55. Bahlsen's Imperial.
56. Trispermum.
57. Colossal-hybridum.
58. St. Joannis.
59. Altpaleschkener R.
60. Hadmersleben.
61. Buhlendorf.

Secale cereale L. × Triticum vulgare.

Secale montanum Guss.

Triticum compactum Host.

Triticum dicoccum Schr.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostitaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

„ „ „ var. aegilopoides.

Triticum Spelta L.
1. albovelutinum.
2. album (aristatum).
3. album (inerme).
4. bengalense aristatum.
5. dasyanthum.
6. erubescens aristatum.
7. rubrum.
8. velutinum aristatum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgdum L.
1. a) graceum (Korinthus).
   b) „ (Sylon).
   c) „ (Louthiana).
   d) „ (Naupaktos).
   e) „ (Epitaurus).
   f) „ (Marathon).
   g) „ (Argolis).
   h) „ (Andos).
2. Erivan.
3. Missolunghi.
4. Kastilia.
5. Kalabria.
6. Katania.
7. Yenning's white.
8. Blé Galland.
9. Kalimon.
10. Petali.
11. Bahlsen.
12. Rivet's red.
13. Aegyptus (velutinum aristatum).
14. Australia.
15. dinura Al. (Helena).
16. compositum (velutinum).
17. compactum, Chrestenseni »Miracle«.

Triticum vulgare L.

var. aristatum:
1. banaticum.
2. Blé de Champagne.
3. Chrestensen's Goliath-W.
4. Don. W.
5. Rivets' W.

var. erythrospermum Kcke:
1. Chrestensen's Square head.
2. Chile.
3. Bestehorn's W.
4. Kastamuni.
5. Kis-Tur (Hungaria).
6. Romania.
7. Horford's Michigan bronce
8. Wetterau.
9. Graf Wallersdorf (hybr.).

var. ferrugineum Al.
1. Rimpau's W. (Germania).

var. muticum:
1. Frankensteiner Kolben W.

Triticum vulgare L.

2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. Essex.
5. Hunter's white.
6. Wittington's verbess. W.
7. White Chiddam.
8. Hochländischer Kolbenweizen.
9. Noë's Früh W.
10. Aleph Vilmorin's W.
11. Champion white.
12. Victoria white.
13. Hardcastle.
14. Amerika (leucospermum album arenarium).
15. Cassey's white.
16. Zeelander W. (Original).
17. Berg W. (Bohemia).
18. Neapol.
19. Koström Original W.
20. Urtoba.
21. Probsteier Orig. weiss W.
22. Kaiser Wilhelm.
23. Elys.
24. Juliweizen.
25. Hallet's red pedigrée.
26. Hickling's prolific.
27. Kessingsland.
28. Golden Drop W. (Bohemia).
29. Golden Drop W. (verbessert).
30. Martin Amber (Amerika).
31. Hartwood's W.
32. Vilmorin.
33. North Allerton.
34. Sandomir Original W.
35. Sandomir (v. Cherson).
36. Probsteier roter.
37. Baxter's wheat.
38. Fenton's W.
39. Hundisburg.
40. Matinoba.
41. Grösster Goldweizen.
42. Richmond's Riesen W.
43. Mainstay Pedigreé.
44. St. Land.
45. Goldene Perle.
46. Svalöf.
47. Clever's W.
48. Ungarischer weisser, glatter.
49. Neapol.
50. Bestehorn's »Coloss.«
51. Westfalischer Land-Weizen.
52. Kosterschaner.
53. Kalifornia (album).
54. Amerika borealis.
55. Mold's verbess. Weiss W.
56. Main's Staudup.
57. Kinver.
58. »Nordstrand« (album).
59. »Nordstrand« (rubrum).
60. Wesslings' weiss W.
61. Kalifornia.
62. Holländisch-schwedischer W.
63. Scotia (rubrum).
64. Scotia (akklimatisiert).
65. Iverness Hochland W.
66. Verbesserter Wechselweizen.
67. Düring's W.
68. Cimbal's Gelb. W.
69. Cimbal's »Oeconomierat Kützleb.«
70. Ristomer W.
71. Heine's Bordier.
72. Sibirischer Weizen.
73. Rimpau's Früher Bastardweizen.
74. Besseler's Nro 1.
75. Besseler's Nro 3.
76. Epp.
77. Giesmannsdorfer Weiss-W.
78. Tarver W.
79. Běloturka v. Cherson.
80. Rumänischer Kolbenweizen.
81. Model v. Bestehorn.
82. Hallet's Genealogw.
83. Old red Lammas.
84. Spalding's prolific.
85. Nursery.
86. Browick red.
87. Burwell.
88. Blé de Bordeaux
89. Blé rouge inversable.
90. Blead red scotsch.
91. Bristol.
92. Dattelweizen (Vilmorin).
93. Lamend.
94. Bestehorn's Dividendenw.
95. Annenw.
96. Kingshybrid.

Triticum vulgare L.

97. Red King scott.
98. Red londar.
99. Red Mary gold.
100. Browick red.
101. Roter sächsischer Landw.
102. Mold's red prolific.
103. Teverson.
104. Cimbal's Centenar.
105. Nordischer Tonnenw.
106. Cimbal's Kaiser Nicolaus II.
107. „ Graf Zedlitz.
108. Altmaerkischerw.
109. Deutscher Kurzw.
110. Mary goldw.
111. Winterblumenw.
112. Prinz Albert.
113. Spalding v. Hundisburg.
114. Pearl red Chaff.
115. Schwedischer Stammw.
116. Regent.
117. Wittmack.
118. Cimbal's Fürst Hatzfeld.
119. Helsingfors.
120. Golden rough chaff red.
121. Schariff's Square head, Orig.
122. Besseler's Square head.
123. Heine's kurzer Square head.
124. „ langer „ „
125. Kirsche's Square head.
126. Métte's „ „
127. Strube's „ „
128. Breustedt's langer Square head.
129. „ kurzer „ head.
130. Andebeck Square head.
131. Leutewitz „ „
132. Brauner „ „
133. Chrestensen's weisspelziger Square head.
134. Chrestensen's rotspelziger Square head.
135. Englischer brauner Square head.
136. v. Načeradec.
137. Bore-Svalüf.
138. Extra Svalöf Square head.
139. Egyptischer Mumien »Exelsior.«
140. Original Schiriffw.
141. Landa's roter Wechselw.
142. Landa's »Gigantea«.
143. Böhmischer roter Wechselw.
144. Imperial Kolbenw.
145. Schwedischer Originalw.
146. Chrestensen's Dividendenw.
147. Brandenburger Braunährenw.
148. Bahlsen's Gigantea.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macruca Jaub & Spach.
„ ovata L.
„ speltoides Tsch.
„ squarosa L.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.

Aegopogon pusillus Beauv.

Agropyrum dasyanthum Ledeb.

Agrostis alpina Scop.
„ canina L.
„ minutiflora Desf.
„ rupestris All.
„ Spica-venti L.
„ stolonifera L.
„ „ „ var. gigantea Gaud.
„ verticillata Willd.
„ vulgaris With.

Aira agrostidea Loisel.
„ bottnica Wahlenb.
„ caespitosa L.
„ capillaris Host.
„ flexuosa L.

Alopecurus agrestis L.
„ fulvus Sm.
„ geniculatus L.
„ pratensis L.

Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum Carrenianum Parl.
„ gracile Biv.
„ odoratum L.
„ „ var. longearistatum Čel.
„ Puellii Lec. & Lam.

Arrhenatherum avenaceum P. B.

Atropis distans Griesb.

Avena alba Wahl.
„ brevis Rth.
„ bromoides Gouan.
„ fatua L.
„ ludoviciana Dur.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis L.
Avellinia Michellii Parl.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst & Steud.
Brachypodium pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza geniculata Thunb.
„ maxima L.
„ media L.
Bromus adoënsis Hochst.
„ arvensis L.
„ asper Murr.
„ brachystachys Horn.
„ brizaeformis Fisch.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ exaltatus Bernh.
„ giganteus L.
„ inermis Leyss.
„ macranthes Meyen.
„ madritensis L.
„ marginatus Steud.
„ mollis L.
„ patulus Mert & Koch.
„ Preslii Kunth.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ „ „ var. grossus.
„ serotinus Beneken.
„ squarrosus L.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
Calamagrotis arundinacea Roth.
„ epigeios Rotr.
„ Halleriana D. C.
„ lapponica Hartm.
„ stricta Trin.
Catabrosa aquatica Beauv.
Ceratochloa pendula Schrad.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gay.
Chloris barbata Sw.
„ crinita Lag.
„ elegans H. B. & K. N.
„ radiata Sw.
Cinna mexicana Beauv.
Coix exaltata Jacq.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens. Beauv.
Crypsis aculeata Ait.
„ alopecuroides Schrad.
„ schoenoides Lam.
Cynosurus cristatus L.
„ echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis Aschersoniana Graeb.
„ glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Desmazeria sicula Dun.
Diplachne fascicularis Beauv.
„ serotina Link.
Eatonia purpurascens Rafin.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
„ indica Gaertn.
„ oligostachya Link.
„ Tocussa Fresen.
„ trichostachya Kunth.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Vahl.
„ glaucifolius Muhl.
„ hordeiformis Desf.
„ hystrix L.
„ mexicanus Cav.
„ philadelphicus L.
„ propinquus Fresen.
„ sabulosus Bieb.
„ virginicus L.
Eragrostis amabilis Wight & Arn.
„ Barrelieri Daveau.
„ capillaris Steud.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ maxima Baker.
„ maior Host.
„ mexicana Link.
„ minor Host.
„ nigra Nees.

Eragrostis nigricans Steud.
„ pilosa P. B.
„ Purshii Host.
„ virescens J. & C. Presl.
Festuca Alopecurus Schousb.
„ amethystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ Beckeri Hack.
„ borealis Mert & Koch.
„ bromoides Gray.
„ clavata Moench.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ delicatula Lag.
„ duriuscula Jacq.
„ elegans Boiss.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ heterophylla Lam.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ „ „ var. glauca Schrad.
„ „ „ „ hispida.
„ Pančičiana H. M. & J.
„ pannonica Wulf.
„ pratensis Huds.
„ psammophila Hackel.
„ Pseudovina Hackel.
„ pulchella Schrad.
„ rhaetica Suter.
„ rubra L.
„ „ „ var. fallax.
„ „ „ „ heterophylla.
„ rigida Kunth.
„ silvatica Vill.
„ spectabilis Jan.
„ tenella Fries.
„ tenuifolia Roth.
„ uniloides Will.
„ vaginata Waldst & Kit.
„ varia Haenke.
„ violacea Gaud.
„ xanthina Roem & Schult.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria fluitans R. Br.
„ plicata Fries.
Hilaria rigida Vasey.
Hierochloa australis Roem. & Schult.
„ borealis Roem. & Schult.
Holcus lanatus L.
„ mollis L.
Hordeum bulbosum L.
„ comosum Presl.
„ crinitum Desf.
„ cylindricum Murr.
„ distichum L.
„ Gussoneanum Parl.
„ jubatum L.
„ murinum L.
Koeleria crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirsuta D. C.
„ splendens Pers. var. canescens Ven.
Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis argentea Link.
Lolium canadeuse Michx.
„ perenne L.
„ remotum Schr.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ exasperata Roem. & Schult.
„ Magnolii Gren. & Godr.
„ nutans L.
„ penicillaris Boiss & Bal.
„ picta C. Koch.
„ transsylvanica Schur.
„ uniflora Retz.
Milium efusum L.
„ nigricans R. & P.
Molinia coerulea Moench.
„ „ „ var. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr.
Nardus stricta L.
Panicum altissimum Jacq.
„ atro-purpureum Desv.
„ bulbosum H. B. K.
„ californicum Benth.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ colonum L.

Panicum coloratum L.
„ compressum Biv.
„ Crus galli L.
„ „ „ „ var. maior.
„ esculentum A. Br.
„ Figarei Tod.
„ frumentaceum Roxb.
„ glabrum Gaud.
„ macrourum Trin.
„ milliaceum L. var. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Kcke.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke.
„ oryzoides Sw.
„ paludosum Roxb.
„ sanguinale L.
„ tuberculiflorum Steud.
„ Wightii Nees.
Paspalum racemosum Lam.
„ tenellum Willd.
Pennisetum longistylum Hochst.
„ „ „ var. violaceum.
„ macrourum Trin.
„ orientale Bieb.
Phalaris angusta Hort.
„ arundinacea L.
„ „ „ var. picta Hort.
„ brachystachys Link.
„ canariensis L.
„ minor. Retz.
„ nodosa Murr.
„ paradoxa L.
„ truncata Guss.
„ tuberosa L.
Phleum alpinum L.
„ asperum Will.
„ Boehmeri Will.
„ graecum Boiss & Heldr.
„ Michelii Alef.
„ parnassicum Boiss & Heldr.
Phleum pratense L.
„ „ „ var. nodosum L.
„ tenue Schrad.
Poa abyssinica Jacq.
„ alpina L.
„ „ „ var. vipipara.
„ annua L.
„ badensis Hke.
„ compressa L.
„ costata Schum.
„ firmula Host.
„ nemoralis L.
„ „ „ var. rigidula.
„ „ „ „ saxatilis.
„ nevadensis Vasey.
„ palustris L.
„ pannonica Kern.
„ pratensis L.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ versicolor Bess.
Polypogon maritimus Willd.
Secale cereale L.
„ perenne Guss.
Sesleria autumnalis F. Schultz.
„ calcaria Opiz.
„ cylindrica D. C.
„ elongata Host.
„ robusta Sch. N. & K.
„ uliginosa Opiz.
Setaria ambigua Guss.
„ germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B. var. breviseta.
„ „ „ „ „ lobata.
„ „ „ „ „ longiseta.
„ „ „ „ „ moharia.
„ japonica Pynaert.
„ macrostachya H. B. K.
„ persica P. B.
„ verticillata Beauv.
„ viridis Beauv.
„ vulpiseta Roem. & Schult.
Sorghum arundinaceum Scop.
„ Houtteanum Pers.
„ nigrum Roem. & Schult.
„ saccharatum Pers.
„ vulgare Pers.
„ „ „ var. Arduini Jacq.

Sorghum vulgare Pers. var. japonicum.
„ „ „ „ usorum Nees.
Spartina cynosuroides Roth.
Stipa Aristella L.
„ Calamagrostis Wahlenb.
„ capillata L.
„ formicarum Delile.
„ gigantea Lag.
„ Grafiana Stev.
„ juncea Sibth.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ sibirica Lam.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
„ Tirsa Stev.
Trisetum pratense Pers.
Triticum Aegilops Beauv.
„ amyleum Ser.
„ caninum Schr.
„ Cienfuegos Lag.
„ glaucum Desf.
„ imbricatum Bieb.
„ pungens D. C.
„ repens L.
„ sibiricum Willd.
„ Spelta L.
„ trichophorum Link.
„ turgidum L.
„ villosum Link.
Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L.
„ „ „ var. alba.
„ „ „ „ americana.
„ „ „ „ Cinquantino.
„ „ „ „ Curagua.
„ „ „ „ cryptosperma.
„ „ „ „ dulcis Kcke.
„ „ „ „ gracillima Koern.
„ „ „ „ hirta Bonaf.
„ „ „ „ japonica.
„ „ „ „ Maratten.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ Novoboracensis.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ pignoletto.
„ „ „ „ Razgrad.
„ „ „ „ Romania.
Zea mais L. var. saccharata fr. lilacino.
„ „ „ „ Sadovo, Bulgarien.
„ „ „ „ Sekler.
„ „ „ „ translucens.
„ „ „ „ tuscana.
„ „ „ „ xanthornis.
„ „ „ „ Jellow.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
„ compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
„ filiformis L.
„ glaucus Ehrh.
„ lamprocarpus Ehrh.
„ pauciflorus R. Br.
„ supinus Moench.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ „ „ „ var. brunnea.
„ campestris D. C.
„ maxima D. C.
„ multiflora Lej.
„ pallescens Bess.
„ spicata D. C.
„ sudetica Presl.
„ vernalis D. C.

Irideae.

Crocus speciosus Bieb.
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Iris arenaria Waldst. & Kit.
„ graminea L.
„ sibirica L.
„ versicolor L.
Sisyrinchium anceps Cav.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ atropurpureum Waldst.
„ atroviolaceum Boiss.
„ Cepa L.
1. Holland.
2. James.
3. parva, lutea (Bohemia).
4. Zittauer gelb.
„ coeruleum Pall.
„ fistulosum L.

Allium globosum Red.
„ Kochii Lange.
„ montanum Schmidt.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ planifolium Bc.
„ Porrum L. hiemale (Erfurt).
„ „ „ „ (Florentia).
„ sphaerocephalum L.
„ stipitatum Regel.
„ vineale L.
Anthericum Liliago L.
„ ramosum L.
Bellevalia aleppica Boiss.
Bulbine annua Willd.
„ bulbosa Haw.
„ semibarbata Haw.
Camassia esculenta Lindl.
Colchicum autumnale L.
„ Cupani Guss.
Fritillaria armena Boiss.
„ citrina Baker.
„ Meleagris L.
Funkia japonica Hort.
Gagea Liotardi Schult.
Hyacinthus amethystinus L.
„ azureus Baker.
Lilium bulbiferum L.
Merendera sobolifera Fisch.
Muscari alpinum J. Gay.
„ atlanticum Boiss. & Reut.
„ botryoides D. C.
„ comosum Mill.
„ praecox.
„ racemosum Med.
Ornithogalum umbellatum L.
Puschkinia libanotica Zucc.
Scilla sibirica Andr.
Tulipa armena Boiss.

Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amaranthus caudatus L.
„ retroflexus L.
„ silvestris Desf.
Celosia argentea L.
„ cristata L.
Celosia cristata L. var. nana, atropurpurea.
„ plumosa Hort. var. pyramidalis Hort.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
„ incarnata L.
Vincetoxicum officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.
„ glanduligera Royle.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Link & Otto var. alba.
Begonia semperflorens Link & Otto (Vernon).

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria Tsch.
Anchusa italica Retz.
„ leptophylla R. S.
„ ochroleuca Bieb.
„ officinalis L.
„ osmanica Vel.
„ procera Bess.
„ sempervirens L.
„ stylosa Bieb.
Borrago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth. var. gymnandra.
„ minima L.
„ minor L.
„ retorta Sibth.
Cynoglossum Columnae Bivona.
„ furcatum Wall.
„ linifolium L.
„ officinale L.
„ viridiflorum Willd.
Echinospermum consanguineum Fisch & Mey.
„ heteracanthum Ledeb.
„ Redowskii Lehm.
Echium creticum L.
„ plantagineum L.
„ rubrum Jacq.

Echium violaceum L.
„ vulgare L.
Krynitzkia barbigera A. Gray.
Lithospermum arvense L.
„ distichum Orteg.
„ latifolium Michx.
„ officinale L.
„ sibiricum Lehm.
„ tenuifolium L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis caespitosa Schultz.
„ hispida Sch.
„ intermedia Link.
„ palustris Lam.
„ stricta Sk.
„ versicolor Sm.
Nonnea nigricans D. C.
„ palleus Petr.
„ rosea Lk.

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.
„ stricta Miq.
Campanula abietina Griseb & Schenk.
„ alliariaefolia Willd.
„ Aucheri A. D. C.
„ azurea Soland.
„ barbata L.
„ bononiensis L.
„ cordata Peterm.
„ eximia Vendl.
„ Hostii Baumg.
„ latifolia L.
„ „ „ var. macrantha Fisch.
„ linifolia Scop.
„ media L.
„ Pallasiana Roem & Schult.
„ primulaefolia Brot.
„ pusilla Haenke.
„ Rapunculus L.
„ rapunculoides L.
„ Reuteriana Boiss & Bal.
„ Scheuchzeri Vill.
„ trachelium L.
Hedraeanthus graminifolius A. D. C.
Jasione humilis Loisel.
Phyteuma nigrum Lehm.
„ Scheuchzeri Alt.
„ spicatum L.
Specularia castellana Lange.
„ Speculum D. C.
Symphyandra Hoffmani P.

Capparideae.

Cleome Candelabrum Sims.
„ pungens Willd.

Caprifoliaceae.

Diervilla canadensis Willd.
Sambucus nigra L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma coronaria L.
„ Flos-jovis L.
„ Githago L.
Alsine Gerardi Wahlenb.
„ graminifolia Gm.
„ laricifolia Crantz.
„ verna Bartl.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium chloraefolium Fisch. & Mey.
„ pensylvanicum Hornem.
„ purpurascens Fenzl.
„ triviale Link.
Dianthus alpestris Sternberg.
„ arenarius L.
„ atrorubens All.
„ caesius Sm.
„ calocephalus Boiss.
„ campestris Bieb.
„ Caryophyllus L.
„ chinensis L. Imperialis fl. pl.
„ cruentus Vis.
„ deltoides L.
„ frigidus Zucc.
„ giganteus Urv
„ Hellwigii Borb.
„ hybridus Schmidt.
„ inodorus (L).
„ liburnicus Bartl & Vendl.
„ monspessulanus L.
„ Mussini Hornem.
„ Seguierii Will.
„ silvaticus Hoppe.

Dianthus stellaria Stark.
„ Sternbergii Sibth.
„ suavis Willd.
„ superbus L.
„ tristis Velen.
„ versicolor Fisch.
„ virgineus L.
Gypsophila altissima L.
„ compacta Hort.
„ dichotoma Bess.
„ elegans Bieb.
„ fastigata L.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ perfoliata Boiss.
„ saligna Schrad.
Heliosperma monachorum Vis & Panč.
„ quadrifidum Rchb.
Kohlrauschia velutina Reichb.
Lychnis Coeli-rosa Desr.
Melandryum eriocalycinum Boiss.
„ noctiflorum Fries.
„ macrocarpum Willk.
„ pratense Roehl.
„ silvestre Roehl.
Saponaria officinalis L.
Silene caucasica Boiss.
„ flavescens Waldst. & Kit.
„ gigantea L.
„ inflata Sm.
„ italica Pers.
„ Muscipula L.
„ nemoralis Waldst. & Kit.
„ nutans L.
„ petraea Waldst. & Kit.
„ rubella L.
„ sicula Cyrilli.
„ tatarica Boiss.
„ Thorei Duf.
„ tincta Friv.
„ transsilvanica Schur.
„ viridiflora L.
Spergula arvensis L.
„ „ „ var. maxima Weihe.
„ „ „ „ sativa.
„ pentandra Bor.
Spergularia marginata Bor.
„ rubra J. & C. Presl.

Tunica velutina Guss.
Vaccaria pyramidata Medic var. grandiflora Jaub.
„ parviflora Moench.
Viscaria purpurea Wimm.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
Beta maritima L.
„ patula Ait.
„ scutellaris.
„ vulgaris L. var. altissima.
„ „ „ „ „ (Chotětov).
„ „ „ „ „ (orig. Klein-Wanzleben).
„ „ „ „ „ (verb. Klein-Wanzleben).
„ „ „ „ „ (Meté).
„ „ „ „ „ (Schreiber's Elite).
„ „ „ „ „ (Schreiber's Specialität).
„ „ „ „ „ Wohanka's zuckerreiche.
„ „ „ „ „ Wohanka's ertragreichste.
„ „ „ „ brasiliensis Hort.
„ „ „ „ cicla (Eckendorfer)
„ „ „ „ „ (Eckendorfer gelbe).
„ „ „ „ „ (Eckendorfer weisse).
„ „ „ „ „ (Olivenförmige weisse).
„ „ „ „ „ (Mammut).

Beta vulg. L. var. cicla (oliven förmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ „ „ (Leutewitzer runde gelbe).
„ „ „ „ „ (Leutewitzer runde rote).
„ „ „ „ „ (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ „ „ (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ „ „ (Erfurter Flaschen lange dicke gelbe).
„ „ „ „ „ (Erfurter Flaschen lange dicke weisse).
„ „ „ „ „ (Oberdorfer gelbe).
„ „ „ „ „ (Oberdorfer rote).
„ „ „ „ „ (Erfurter Modell).
„ „ „ „ rubra (Salatrube).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ graveolens Willd.
„ hybridum L.
„ opulifolium Schrad.
„ polyspermum L.
„ Vulvaria L.
Salsola Kali L.
Schizotheca patula Čel.
Spinacia oleracea L. var. inermis.
„ „ „ „ spinosa.

Cistineae.

Cistus salvifolius L.
Helianthemum chamaecistus Mill.
„ levandulaefolium Mill.
„ vulgare Gaertn.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.

Compositae.

Achillea magna L.
„ Millefolium L.
„ setacea W. R.
„ sudetica Opiz.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ cinerea Panč.
„ cotula L.
„ Fussii Gris.
„ macedonica Boiss.
„ mixta L.
„ montana L.
„ parnassica Nym.
„ ruthenica Bieb.
„ tinctoria L.
Arnica montana L.
„ sachalinensis A. Gray.
Arnoseris pusilla Gaertn.
Artemisia sacrorum Ledeb.
Aster alpinus L.
Asteriscus aquaticus Schl.
Barkhausia amplexicaulis Coss. & Dur.
Calendula algarbiensis Boiss.
„ officinalis L.
Calliopsis bicolor Reichb.
Carduus acanthoides L.
„ nutans L.
„ pycnocephalus L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
„ atropurpurea Waldst & Kit.
„ carniolica Host.
„ Cyanus L.
„ eryngioides Lam.
„ gigantea Sch.
„ jacea L.
„ Kotschyana Heuff.

Centaurea lusitanica Boiss & Reut.
„ margaritacea Tenore.
„ montana L.
„ nigra L.
„ nigrescens Willd.
„ orientalis L.
„ rupestris L.
„ scabiosa L.
„ stricta Waldst.
„ vallesiaca Jord.
„ uniflora L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ caucasicum Willd.
„ cinerariaefolium Vis
„ coronarium L.
„ corymbosum L.
„ macrophyllum Wdst.
„ niveum Lag.
„ segetum L.
„ tanacetum Karsch.
„ viscosum Desf.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
„ „ „culta(Badische walzenförmige.
„ spinosum L.
Cirsium acaule All.
„ arvense Scop.
„ canum All.
„ canum × acaule.
„ candicans W. K.
„ Dollineri Sch.
„ Erisithales Scop.
„ flavispinum Boiss.
„ odontolepis Boiss.
„ oleraceum Scop.
„ oleraceum × acaule.
„ „ × palustre.
„ pannonicum Gaud.
„ „ × acaule.
„ pyrenaicum DC.
„ Velenovskyi Vand.
Cnicus benedictus L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis aurantiaca.
„ biennis L.
„ dichotoma Boiss.
„ Dioscoridis L.
„ foetida L.
Crepis polymorpha Gilib.
„ pulchra Scop.
„ rubra L.
„ setosa Hall.
„ succisaefolia Tausch.
„ tectorum L.
„ virens Will.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Echinops cornigerus Schrad.
„ exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ niveus Wall.
„ Ritro L.
Elichrysum monstrosum Hort.
Erigeron alpinus L. var. grandiflorus.
„ canadensis L.
„ macranthus Nutt.
Eupatorium cannabinum L.
Felicia tenella Ness.
Filago arvensis L.
„ germanica L.
„ minima Fries.
Flaveria Contrayerba Pers.
Gailardia picta Sweet.
Galactites tomentosa Moench.
Gnaphalium arenarium L.
„ dioicum L.
„ luteo-album L.
„ uliginosum L.
Grindelia robusta Nutt.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr & Gr.
„ giganteus L.
„ occidentalis Riddell.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium alpinum L.
„ alpinum L. var. eximium.
„ amplexicaule L.
„ aurantiacum L.
„ auricula L. × pilosella.
„ barbatum Tausch.
„ boreale Fries.
„ bohemicum Fr.
„ Bornmülleri Freyn.
„ caesium Fries.
„ calenduliflorum Backh.
„ candicans Tausch.
„ cerinthoides Sm.
„ crinitum Sibth & Sm.
„ crocatum Fries.

Hieracium cymosum L.
„ decipiens Monn.
„ dovreuse Fries.
„ eximium Backh.
„ foliosum Waldst. & Kit.
„ glaucum All.
„ graniticum Schulz.
„ inuloides Tausch.
„ Heldreichii Boiss.
„ laevigatum Willd.
„ longifolium Hornem.
„ nigrescens Willd.
„ obscurum Reichb.
„ pannosum Boiss.
„ pilosella × obscurum.
„ prenanthoides Will.
„ rigidum Hartm.
„ riphaeum Uechtritz.
„ rubrum Peter.
„ rupiculum Fries.
, saxatile Rchb.
„ Schmidtii Tsch.
„ setigerum Tausch.
„ silvaticum L.
„ stoloniflorum Wimm.
„ sudeticum Sternb.
„ tridentatum Fr.
„ villosum L.
Hypochoeris arachnoides Poir.
„ glabra L.
„ maculata L.
„ pinnatifida Cyrilli.
„ radicata L.
„ uniflora Vill.
Inula Helenium L.
„ macrocephala Boiss&Kotschy
Jurinea spectabilis Fisch & Mey.
Lactuca altaica Fisch & Mey.
„ augustana All.
„ Dregeana DC.
„ perennis L.
„ quercina L.
„ sativa L. var capitata (dura).
„ sativa L. var capitata.
„ sativa L. var. hiberna.
„ viminea Presl.
„ virosa L.
Lappa amplissima Kotschy.
„ edulis Sieb.
Lappa maior Gaertn.
„ tomentosa Lmk.
Lampana communis L.
Leontodon autumnalis L.
„ hastilis L.
„ incanus Schrank.
„ Salzmani Ball.
Leucanthemum maximum DC.
Ligularia sibirica Cass.
Madia sativa Molin.
Matricaria Chamomilla L.
„ disciformis DC.
„ globifera Fenzl.
„ inodora L.
Mulgedium alpinum Less.
„ Plumieri DC.
Onopordon heteracanthum C. A. Meey.
„ tauricum Willd.
Picris japonica Thunb.
„ pauciflora Willd.
„ pilosa Delile.
Ptarmica speciosa DC.
Pyrethrum carneum Bieb.
„ Parthenium Sm.
„ roseum Bieb.
„ Thihatchewii Hort.
Rhagadiolus edulis W.
Rhaponticum cynaroides Less.
Rudbeckia californica A Gray.
„ maxima Nutt.
Scorzonera angustifolia L.
„ cana O. Hoffm.
„ hispanica L.
„ humilis L.
Senecio abrotanifolius L.
„ alpestris DC.
„ aquaticus Hill.
„ campestris DC.
„ diversifolius Wall.
„ erucaefolius L.
„ nebrodensis L.
„ squalidus L.
„ vernalis Waldst. & Kit.
„ vulgaris L.
Serratula centauroides L.
„ radiata Bieb.
Silphium connatum L.
Solidago alpestris W. K.
„ sparsiflora A Gray.

Sonchus asper All.
„ laevis All.
„ palustris L.
Tagetes erecta L.
„ patula L. var. nana fl. pl.
„ patula L. var. pulchra fl. pl.
„ pulchra Hort. fl. pl.
„ signata Bartl. var. pumila.
Taraxacum erythrospermum Andrz.
Telekia speciosa Baumg.
Tragopogon balcanicus Velen.
„ Cupani Guss.
„ dubius Scop.
„ maior Jacq.
„ porrifolius L.
Tussilago Farfara L.
Urospermum picroides Desf.
Ursinia anthemoides Gaertn.
Xeranthemum annuum L.
„ creticum Presl.
„ cylindraceum Sm.
„ inapertum Willd.
Xanthium Strumarium L.
Zinnia Haageana Regel.
„ pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus aegypticus L.
„ tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe. (Linum usitatissimum).
„ Epithymum Murr. (Trifolium pratense.)
„ glomerata Choisy. (Solidago canadensis.)
„ Gronovii Willd. (Medicago sativa, Trifolium pratense).
„ japonica Choisy. (Aster.)
„ lupuliformis Krock. (Salix amygdalina.)
„ maior DC. (Urtica dioica.)
„ racemosa Mart. (Trifolium pratense, Medicago sativa.)
„ suaveolens Ser. (Medicago sativa).
Ipomoea blepharosepala Hochst.
„ coccinea L.
„ congesta R. Br.
Ipomoea curassavica Balb.
„ hereracea Jacq.
„ palmata Forsk.
„ purpurea Roth.
„ Schiedeaua Ham.
„ sibirica Pers.
„ superba G Don.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
Alyssum argenteum Vitm.
„ calycinum L.
„ repens Baum. Enum.
„ Wulfeniaunm Willd.
Arabis alpina L.
„ arenosa Scop.
„ caucasica Willd.
„ Gerardi Bess.
„ Holboellii Hornem.
„ muralis Bertol.
„ pendula L.
„ rosea DC.
„ sagittata DC.
„ stricta Huds.
„ sudetica Tausch.
Aubrietica Columnae Guss.
Barbarea stricta Andrz.
„ vulgaris R. Br.
Biscutella aurantiaca L.
„ auriculata L.
„ cichoriifolia Loisel.
„ hispida DC.
Brasica cernua Thunb.
„ japonica Sieb.
„ Napus L.
var. oleifera, annua.
1. Alti-sarsa.
2. Balcanora.
3. Bhunri-sarsa.
4. Naldra-sarsa.
5. Piarki-tori.
6. Janda-sarsa.
var. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.

Brasica oleracea L. var. acephala crispa.
„ „ „ „ capitata rubra.
„ „ „ „ gongylodes.
„ rapa L.
var. oleifera DC. annua.
1. Holland.
2. Schweden.
3. Thüringen.
4. Ungarn.
var. oleifera DC. biennis.
1. Awehl.
2. Holstein.
3. Schweden.
4. Thüringen.
5. Uckermarck.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ foetida Fries var. dentata Pers.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Capsela bursa pastoris Moench.
Cardaria Draba Desv.
Cochlearia glastifolia L.
, officinalis Andrz.
Crambe maritima L.
Diplotaxis muralis DC.
Draba aizoides L.
„ aurea Vahl.
„ borealis DC.
„ frigida Sauter.
„ incana L.
„ nemorosa L.
„ scandinavica Lindlom.
„ verna L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum angustifolium Rb.
„ cheiranthoides.
„ crepidiifolium Rb.
„ helveticum DC.
„ hieraciifolium L.
„ pulchellum Willd.
„ pumilum Gaud.
, repandum L.
„ rhaeticum DC.
Hesperis matronalis L.
„ tristis L.
Iberis Lagascana DC.
„ Forsterieri Jord.
Isatis littoralis Bess.
„ praecox Kit.
„ tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria biennis L.
„ rediviva L.
Malcomia africana Ait.
„ maritima RBr.
Matthiola bicornis DC.
Nasturtium amphibium RBr.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer Hort.
„ raphanistrum L.
„ sativus L. var. oleifer.
Rapistrum perenne All.
Roripa palustris Bess.
„ terrestris Fuss.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. var. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ juncea L.
„ nigra L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
„ laxiflorum Boiss.
Thlaspi alpestre L.
„ arvense L.
„ violascens Schott & Kotschy.

Cucurbitaceae.

Cucurbita Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Lagenaria vulgaris Ser.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ centauroides Roem & Schult.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.

Dipsacus appendiculatus Steud.
„ azureus Schrenk.
„ ferox Loisel.
„ fullonum Huds.
„ silvestris Mill.
Knautia magnifica Boiss-Orph.
„ orientalis L.
Scabiosa atropurpurea L. var. grandiflora fl. pb.
„ australis Wulf.
„ banatica Waldst. & Kit.
„ caucasica M. B.
„ Columbaria L.
„ gramuntia L.
„ holosericea Bertol.
„ lyrophylla Paul.
„ maritima L. var. atropurpurea.
„ ochroleuca L.
„ reversa Ledeb.
„ ucranica L.
Succisa pratensis Moench.
Trichera silvatica Schrad.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Ericaceae.

Erica Tetralix L.

Euphorbiacecae.

Euphorbia Cyparissias L.
„ exigua L.
„ helioscopia L.
„ Lathyris L.
„ Peplus L.
„ platyphylla L.
Mercurialis annua L.
Ricinus africanus Mill.
„ communis L.
„ „ „ var. cambogdensis.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ zanzibarensis Hort.
„ Gibsoni Mitsch.
„ „ „ var. mirabilis.
„ inermis Jacq.
„ japonicus Thunb.
„ metallicus Hort.
„ minor Mill.
„ sanguineus Hort.

Sibboldia cuneata Hornem.
„ procumbens L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
„ Cruciata L.
Swertia perennis L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L. Hérit.
„ Manescavi Coss.
Geranium collinum Steph.
„ columbinum L.
„ cristatum Stev.
„ dahuricum DC.
„ dissectum L.
„ nepalense Sweet.
„ pratense L.
„ pusillum L.
„ rotundifolium L.
„ Wallichianum D. Don.
Oxalis corniculata L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia bipinnatifida Mich.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Beuth.

Hypericineae.

Hypericum ascyron L.
„ Androsaemum L.
„ chinense Lam.
„ galioides Pursh.
„ hirsutum L.
„ montanum L.
„ perforatum L.
„ pulchrum L.
„ pyramidatum Ait.
„ quadrangulum L.
„ rumelicum Boiss.

Illecebraceae.

Scleranthus annuus L.
„ perennis L.

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys Schreb.
Ballota nigra L.
Betonica Alopecurus L.

Betonica grandiflora Willd.
„ officinalis L.
Calamintha Acinos Clairv.
„ Clinopodium Spenn.
Chaeturus fasciculatus Link.
„ marrubiastrum Rchb.
Dracocephalum austriacum L.
„ diversifolium Rupr.
„ Moldavica L.
„ nutans L.
„ peregrinum L.
„ Ruyschianum L.
„ stamineum K. K.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
„ latifolia Hoffm.
„ pubescens Bess.
„ Tetrahit L.
„ versicolor Curt.
Gardoquia betonicoides Lindl.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch & Mey.
Lamium amplexicaule L.
Leonurus capitatus Fresen.
„ Cardiaca L.
„ sibiricus L.
„ tataricus L.
Marrubium candidissimum L.
„ peregrinum L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L. var. piperascens.
„ crispa L.
„ gentilis Sm.
„ piperita L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. var. crispa.
„ viridis L.
„ viridis L. var. hortensis Wirtg.
Nepeta nuda L.
„ racemosa Lam.
Ocimum Basilicum L.
„ campechianum Mill.
„ carnosum Sim.
„ crispum Thunb.
„ gratissimum L.
Origanum majorana L.
Phlomis alpina Pall.
„ armeniaca Willd.
„ tuberosa L.
Pogostemon Patschouly Pellet.
Prunella alba Pall.
„ grandiflora Jacq.
„ laciniata L.
„ pyrenaica Philippe.
„ Webbiana Loud.
Salvia acaulis L.
„ hians Royle.
„ amarissima Orteg.
„ austriaca Jacq.
„ candicans Mart & Gal.
„ cleistogama De Bary&Paul.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.
„ glutinosa L.
„ Horminum L.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ pratensis L.
„ Sclarea L.
„ silvestris L.
„ ringens Sibth.
„ verbenata L.
„ verticillata L.
Satureja hortensis L.
„ montana L.
Scutellaria alpina L.
„ altissima L.
„ lupulina L.
„ orientalis L.
Sideritis hirsuta L.
„ hyssopifolia L.
„ montana L.
„ syriaca L.
Stachys annua L.
„ arvensis L.
„ aurea Benth.
„ Betonica Benth.
„ coerulea Burch.
„ germanica L.
„ lanata Jacq.
„ palustris L.
„ Parolinii Wiss.
„ recta L.
„ silvatica L.
Teucrium flavum L.
„ hircanicum L.
Thymus alpestris Tausch.
„ Scorodonia L.
„ angustifolius Pers.

Thymus Chamaedrys Fries.
„ serpyllum L.
„ vulgaris L.

Leguminosae.

Anthyllis Vulneraria L.
„ „ „ var. **rubriflora.**
Astragalus annularis Forsk.
„ asper Jacq.
„ baeticus L.
„ Cicer L.
„ danicus Retz.
„ edulis Dur.
„ glycyphylus L.
„ Onobrychis L.
„ verus Olivier.
Cicer arietinum L.
„ „ „ var. nigrum.
„ „ „ „ rotundum.
„ pinnatifidum Jaub & Spach.
Coronilla vaginalis Lam.
„ varia L.
Cytisus austriacus L.
„ capitatus Jacq.
„ nigricans L.
„ supinus Crantz.
„ uralensis Hort.
Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
„ Lablab L.
„ nankinensis Savi.
„ ornatus Wall.
„ tuberosus.
„ Zebra L.
Ervum abessinicum Hort.
„ Ervilia (L.)
„ monanthos Desv.
Galega officinalis L.
„ orientalis Lam.
„ persica Pers.
Genista ovata Waldst. & Kit.
„ sagittalis L.
„ tinctoria L.
Glycyrhiza echinata L.
Hyppocrepis comosa L.
Lathyrus alatus Tenore.
„ amphicarpos Gouan.
„ angulatus L.
„ articulatus L.
Lathyrus Cicera L.
„ Clymenum L.
„ erectus Lag.
„ heterophyllus L.
„ hirsutus L.
„ japonicus Willd.
„ latifolius L.
„ montanus Bernh.
„ niger Bernh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus DC.
„ odoratus L.
„ pisiformis L.
„ pratensis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ tingitanus L.
„ tomentosus Lam.
„ tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ var. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus conimbricensis Brot.
„ corniculatus L.
„ filicaulis Dur.
„ Jacobaeus L.
„ ornithopodioides L.
„ tenuifolius Presl.
„ uliginosus Schkühr.
Lupinus affinis L.
„ albus L.
„ angustifolius L.
„ angustifolius L. var. albus.
„ bicolor Lindl.
„ concinnus Agarth.
„ Cruchshauksii Hook.
„ densiflorus Benth.
„ Douglasii Agardh.
„ Dumonti Hort. var. superbus.
„ elegans L.
„ graecus Boiss. & Sprun.
„ grandiflorus Don.
„ Hilarianus Benth.

Lupinus hirsutus L.
„ linifolius Roth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ pubescens Benth.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
„ sulphureus Dougl.
„ Termis Forsk.
Medicago arabica L.
„ apiculata Willd.
„ denticulata Willd.
„ echinata DC.
„ Helix Willd.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ scutellata All.
„ sativa L.
„ sativa falcata.
„ Terebellum Willd.
Melilotus alba Desr.
„ altissima Thuill.
„ compacta Salzm.
„ indica All.
„ ruthenica Ser.
„ segetalis Ser.
„ speciosa Dur.
„ sulcata Desf.
Onobrychis Caput-galli Lam.
„ Crista-galli Lam.
„ sativa Lam.
Ononis hircina Jacq.
„ procurens Wallr.
„ spinosa L.
Ornithopus perpusillus L.
„ sativus L.
Orobus atropurpureus Desf.
„ niger. L.
„ vernus L.
Oxytropis pilosa DC.
Phaseolus cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. var. carneus.
„ lunatus L.
Phaseolus lunatus L. var. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L.
„ „ „ var. compressus Mus.
„ „ „ „ communis.
„ „ „ „ gonospermus Savi.
„ „ „ „ nanus L.
„ „ „ „ nigerrimus Juss.
„ „ „ „ oblongus Savi.
„ „ „ „ tuberosus.
Pisum quadratum Mill.
„ saccharatum Rchb.
„ sativum L.
„ „ „ var. abyssinicum.
„ „ „ „ Concentator L.
„ „ „ „ (Dickson's allerfrüheste).
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicumL.
Psoralea bituminosa L.
Sarothamus vulgaris Wimm.
Scorpiurus sulcata L.
Soja hispida Moench.
„ „ „ var. lutea.
„ „ „ „ nigra.
„ „ „ „ viridis Savi.
Tetragonolobus purpureus Moench.
„ Requienii Fisch & Mey.
„ siliquosus Roth.
Thermopsis lanceolata R Br.
Trigonella Balansae Boiss & Reut.
„ Besseriana Ser.

Trigonella coerulea Ser.
„ cretica Boiss.
„ ensifera Trautz.
„ Foenum-graecum L.
„ gladiata Stev.
„ glomerata Led. var. cilicica B. & R.
„ monspeliaca L.
„ polycerata L.
Trifolium agrarium Poll.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ arvense L.
„ aureum Poll.
„ fragiferum L.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ Lagrangei Boiss.
„ leucanthum Bieb.
„ libanoticum Ehrenb.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ ochroleucum Huds.
„ pannonicum L.
„ parviflorum Ehrenb.
„ pratense L.
„ „ „ var. pratorum.
„ „ „ „ quinquefolium.
„ procumbens L.
„ purpureum Loisel.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ rubens L.
„ striatum L.
„ tomentosum L.
„ trichocephalum Bieb.
Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ benghalensis L.
„ biennis L.
„ Bivonae Rafin.
„ calcarata Desf.
„ canescens Labill.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ cornigera Chaub.
Vicia Cracca L.
„ cuspidata Boiss.
„ disperma DC.
„ dumetorum L.
„ Faba L. var. agrorum Alef.
„ „ „ „ arabica Alef.
„ „ „ „ arcnata.
„ „ „ „ atra Alef.
„ „ „ „ Aqua dulce.
„ „ „ „ columbina Hort.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ equina Alef.
„ „ „ „ flabellata.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ megalosperma Alef.
„ „ „ „ megalosperma (Erfurter).
„ „ „ „ minuta Alef.
„ „ „ „ minor.
„ „ „ „ nitidissima Alef.
„ „ „ „ purpuriflora Alef.
„ „ „ „ sanguinea.
„ „ „ „ vernalis Hort.
„ „ „ „ Windsoriana.
„ „ „ „ violacea Alef.
„ ferruginea Bess.
„ Gerardi Vill.
„ globosa Retz.
„ grandiflora Scop.
„ grandiflora Scop. var. Kitaibeliana Schur.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ Loweana Steud.
„ ludoviciana Nutt
„ lutea L.
„ Michauxi Bieb.
„ Musquinez Bosc.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Cr.
„ peregrina L.
„ picta F. Mey.
„ pisiformis L.
„ sativa L.
„ „ „ var. dalecarliensis.

Vicia sativa L var. dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ thebanensis.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Th.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ spuria Rafin.
„ striata Bieb.
„ tetrasperma Moench.
„ villosa L.

Lineae.

Linum alpinum.
„ altaicum Fisch.
„ americanum L. var. album.
„ arboreum L.
„ angustifolium Huds.
„ austriacum L.
„ candidissimum V'Hout.
„ flavum L.
„ Lewisii Pursch.
„ multiflorum Lam.
„ perenne L.
„ sibiricum DC.
„ striatum Walt.
„ usitatissimum L.
1. var. crepitans.
2. „ flore albo, semperflorens.
3. „ hibernum.
4. „ hungaricum.

Linum usitatissimum L. (Böhmen).
„ „ „ (Erfurt).
„ „ „ (Ostindien).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Zeeland).
„ „ „ (Gelbsamiger).

Loaseae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Lythrarieae.

Olinia cymosa Thunb.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
„ indicum Sweet.
„ tiliaefolium Sweet.
Althaea officinalis L.
„ pallida W. R.
„ Froloviana Fisch.
„ sulphurea Boiss & Hohen.
„ trifida Cav.
Hibiscus Abelmoschus L.
„ Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thüringiaca L.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
Malva Alcea L.
„ limensis L.
„ moschata L.
„ oxyloba Boiss.
„ peruviana L.
„ rotundifolia Huds.
„ silvestris L.
Malvastrum capense Garcke.
Sida hirta Lam.
„ rhombifolia L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalappa L.

Onagrariae.

Epilobium alpinum L.
„ angustifolium L.
„ Fleischeri Hochst.
„ microphyllum A. Rich.
Gaura parviflora Dougl.
Gaudirium molle Spach.
Godetia gloriosa Hort.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ cruciata Nutt.
„ Lamarckiana Ser.
„ speciosa Nutt.

Orobanchaceae.

Orobanche caryophyllacea Sm. (Galium Mollugo).
„ cruenta Bertol. (Lotus corniculatus).
„ cumana Wallr. (Helianthus annuus).

Orobanche ramosa L. (Cannabis sativa.
„ rubens Wallr. (Medicago sativa).
„ speciosa DC. (Vicia Faba).

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sweet.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium maius L.
Corydalis cava Schweigg & Kort. fl. albo.
„ rosea Maxim.
„ sempervirens Pers.
„ vesicaria Pers.
Eschscholtzia californica Cham.
„ crocea Benth.
Fumaria officinalis L.
Glaucium elegans Fisch & Mey.
„ Fischeri Bernh.
„ luteum Scop.
„ phoeniceum Crrantz.
„ rubrum Sibth.
„ Serpieri Heldr.
Papaver album L.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ dubium L.
„ glaucum Boiss & Hausskn.
„ lateritium C. Koch.
„ macrostomum Boiss & Huet.
„ nudicaule L. album.
„ pilosum Sibth. & Sm.
„ Rhoeas L.
„ Rhoeas L. fl. pl.
„ somniferum L.
Roemeria hybrida DC.
„ refacta DC.

Phytolaccaceae.

Rivina humilis L.

Plantagineae.

Plantago alpina Vill.
„ arenaria W. & M.
„ Cynops L.
„ glareosa Kern.
„ kamtschatica Lk.
Plantago lanceolata L.
„ maior L.
„ maritima L.
„ media L.
„ montana Lam.
„ ovata Forsk.
„ Psyllium L.
„ pumila L.
„ Rugelii Dec.

Plumbagineae.

Armeria alpina Willd.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ vulgaris Willd.

Polemoniaceae.

Phlox Drumondi Hock.
Polemonium coeruleum L.
„ flavum Greene.
„ himalayense.

Polygonaceae.

Fagopyrum japonicum Hort.
„ marginatum L.
„ rotundatum Bab.
Polygonum Bistorta L.
„ Fagopyrum L.
„ „ „ var. argenteum.
„ „ „ „ amarginatum.
„ Fagopyrum L.
„ lapathifolium L.
„ Persicaria L.
„ tataricum Gaertn. var. secalinum.
„ tinctorium L.
Rheum officinale Baill.
Rumex Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ alpinus L.
„ aquaticus L.
„ crispus L.
„ domesticus Hartm.
„ Hydrolapathum Huds.
„ nepalensis Spreng.
„ Patientia L.
„ pulcher L.
„ salicifolius Weimm.
„ sanguineus L. var. viridis.

Rumex scutatus L.
„ stenophyllus Ledeb.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
„ linearifolia DC.
Claytonia perfoliata Donn.
Portulaca granditlora Hock.
„ oleracea L.
„ sativa How.
Talinum paniculatum Ruiz.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Lam.
Androsace elongata L.
„ septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Primula acaulis L. var. grandiflora Sims.
„ elatior Hill. var. mirabilis Čel.
„ officinalis L.
Soldanella montana Zipp.

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum L.
„ pyramidale Mill.
„ variegatum L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
„ Cupaniana Guss.
„ flammea Jacq.
Anemone narcissiflora L.
Aquilegia advena Regel.
„ atrata Koch.
„ atropurpurea Willd.
„ Bauhini Schott.
„ blanda v. Houtte.
„ Buergeriana Sieb &Zucc.
„ canadensis L.
„ caucasica Ledeb.
„ coerulea James.
„ dichroa Freyn.
„ flabellata Sieb & Zucc.
„ flavescens S. Wass.
„ lactiflora Kar. & Kit.
„ viridiflora Pall.
Caltha palustris L.
Clematis graveoleus Linott.
„ recta L.
Delphinium Ajacis. L.
barbatum Bunge.
„ bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ dictyocarpum DC.
„ elatum L.
„ fissum Waldst.
„ formosum Boiss & Huet.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ hybridum Steph.
„ Maackianum Regel.
„ mesoleucum Link.
„ Przewalskii Huth.
„ tricolor Bernh.
Nigella arvensis L.
„ damascena L.
„ Garidella Spenn.
„ sativa L.
Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
„ vernalis Mill.
Ranunculus acris L.
„ arvensis L.
„ brutius Tenore.
„ chaerophyllos L.
„ cordigerus Viv.
„ lanuginosus L.
„ lomatocarpus Fisch & Mey.
„ scleratus L.
„ serbicus Vis.
„ repens L.
„ trilobus Desf.
Thalictrum angustifolium L.
„ aquilegifolium L.
„ banaticum Rochel.
„ flavum L.
„ Jacquinianum Koch.
„ lucidum L.
„ minus L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

Reseda lutea L.
„ Luteola L.
„ odorata L.

Reseda Phyteuma L.
„ ramosissima Pourr.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium L.
„ odorata Mill.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Geum intermedium Ehr.
„ japonicum Thunb.
„ molle Vis. & Panč.
„ pyrenaicum Mill.
„ triflorum Presl.
„ urbanum L.
Photinia villosa DC.
Potentilla argentea L.
„ argyrophylla Wall.
„ atrosanguinea Sixta.
„ aurea L.
„ calabra Tenore.
„ canescens Bess.
„ chinensis Ser.
„ Hedrichii Dom.
„ Hockeriana Lehm.
„ inclinata Vil.
„ macrophylla Schur.
„ montenegrina Pantoč.
„ multifida L.
„ norvegica L.
„ ranunculoides Humb. & B.
„ recta L.
„ recta L. var. obočura.
„ recta L. var. opaca.
„ rupestris L.
„ sericea L.
„ supina L.
Poterium mauritanicum Boiss.
„ muricatum Spach.
„ Sanguisorba L.
Sanguisorba alpina Bunge.
Sorbus Hostii Heynk.
„ melanocorpa Heynk.
Spiraea Filipendula L.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
„ hexaphylla All.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst. & Kit.
„ odorata L.
„ orientalis Boiss.
„ tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
„ chlorostachy Fisch & Mey.
Galium anglicum Huds.
„ Asparine L.
„ Mollugo L.
„ ochroleucum Kit.
„ scabrifolium Boiss.
„ tricorne With.
„ Wirtgenii L.
„ verum L.
„ verum & Mollugo.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Saxifraga Aizoon Jacq.
„ caespitosa L.
„ granulata L.

Scrophulariaceaee.

Antirrhinum glutinosum Boiss.
„ latifolium Mill.
„ maius L.
„ Orontium L.
Calceolaria mexicana Benth.
Digitalis alba Schrank.
„ ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ eriostachya Bess.
„ ferruginea L.
„ lutea L.
„ nevosa Steud & Hochst.
„ purpurea L.
„ sibirica Lindl.
Linaria arvensis Desf.
„ cymbalaria Mill.
„ dalmatica Mill.
„ elatine Mill.
„ litoralis Willd.
„ minor Desf.
„ origanifolia DC.
„ purpurea Mill.
„ pyrenaica DC.
„ spuria Mill.
„ striata DC.
„ supina Desf.

Linaria vulgaris Mill.
Melampyrum arvense L.
Mimulus luteus L.
Pentastemon lavigatus Ait.
„ virgatus Q. Gray.
Rhinanthus alpinus Baumg.
„ maior Ehrh.
„ minor Ehrh.
„ villosus Pers.
Scrophularia betonicaefolia L.
„ dentata Royle.
„ libanotica Boiss.
„ variegata Bieb.
„ vernalis L.
Torenia Fournieri Linden.
Verbascum bombyciferum Boiss.
„ gnaphalodes Bieb.
„ grandiflorum Gueldenst.
„ Kanitzianum Simk & Walz.
„ Lagurus Fisch & Mey.
„ nigrum L.
„ phoeniceum L.
„ thapsus L.
Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ austriaca L.
„ belidioides L.
„ fruticulosa L.
„ hastata L.
„ hederaefolia L.
„ incana L.
„ longifolia L.
„ officinalis L.
„ orientalis Mill.
„ pallens Host.
„ persica Hort.
„ polita Fries.
„ prostrata L.
„ saxatilis Jacq.
„ spicata L.
„ spuria L.
„ triphyllos L.

Selagineae.

Dischisma ciliatum Choisy.
Globularia Willkommii Nym.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Datura Leichharrdtii F. Meell.
Datura Stramonium L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata L. & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ auriculata Bertolt.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hock.
„ paniculata L.
„ rustica L.
„ silvestris Speg &Comes.
„ solanifolia Walp.
„ Tabacum L.
„ sexana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.
Petunia hybrida Hort.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis peruviana L.
Salpiglossis variabilis Hort.
Solanum nigrum L.

Tiliaceae.

Corchorus pilobolus Link.
„ textilis Delile.
„ trilocularis L.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum maius L.
„ minus L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Ammi Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
„ segetum L.
Apium australe Thon.
„ graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bifora testiculata DC.
Bubon Galbanum L.
Bunium montanum Koch.
Bupleurum longifolium L.
„ multinerve DC.

Bupleurum rotundifolium L.
Caucalis daucoides L.
Carum buriacticum Turcz.
„ Carvi L.
„ Ridolfia Benth & Hook.
Cerefolium sativum Bess.
„ silvestre Bess.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ aureum L.
„ bulbosum L.
„ hirsutum L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
„ testiculatum L.
Daucus Carota L. (Unkraut).
Daucus Carota L. var. sativa (Speise-Karotte, Braunschweig).
Daucus Carota L. var. arvensis (Futtermöhre v. Saalfeld).
Daucus Carota L. var. arvensis (Futtermöhre rot).
Daucus Carota L. var. arvensis (Futtermöhre weiss).
Daucus pulcherrimus Willd.
Didiscus pilorus Benth.
Eryngium alpinum L.
„ campestre L.
, coeruleum Bieb.
„ eburneum Decne.
„ planum L.
„ Spina alba Vill.
Ferula galbaniflua Boiss & Buhse.
Heracleum giganteum L.
„ Montegazzianum Levier.
„ Sphondylium L.
„ Sphoudylium L. var. glabrum.
Imperatoria Ostruhion L.
Levisticum officinale Koch.
Meum athamanticum Jacq.
„ Mutellina Gaertn.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
„ „ „ serotinum.
Peucedanum graveolens Benth & Hook.
Peucedanum Oreoselinum Mönch.
Physocaulis nodosus Tausch.
Pimpinella magna L.
„ Saxifraga L.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Sanicula europaea L.
Scandix Balansae Reut.
„ brachycarpa Guss.
„ macrorhyncha C. A. Mey.
Seseli Carvifolia L.
„ coloratum Ehrh.
„ glaucum Jacq.
„ buchlormense Koch.
„ Libanotis Koch.
Sium lancifolium Bieb.
„ Sisarum L.
Zizia aurea Koch.

Urticaceae.

Cannabis himalayensis Hort.
„ indica Lam.
„ sativa L.
„ „ „ var. gigantea Voss.
„ „ „ (Bologna).
Humulus japonicus L.
Urtica dioica L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
„ macrosiphon Boiss.
Fedia scorpioides Dufr.
Valeriana supina L.
Valerianella auricula DC.
„ coronata DC.
„ Morisonii DC.
„ olitoria Pollich.
„ pumila DC.

Verbenaceae.

Verbena urticifolia L.

Violaceae.

Viola betonicifolia Sm.
„ canina L.
„ cornuta L.
„ dactyloides Roem & Schult.
„ elatior Fries.
„ heterophylla Poir.

„ lutea Vell.
„ montana Murr.
„ Munbyana Boiss & Reut.
„ olympica Boiss.
„ pumila Fries.
„ Riviniana Reichb.
„ silvestris Lam.
„ tricolor L. var. maxima.

Plantae vivae pro mutua commutatione

Aloë punctata Martinati.
Artemisia argentea Ait.
Centradenia floribunda Planch.
Convallaria japonica L.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia corallina Hort.
Yucca aloëfolia L.
Lippia filiformis Schrad.
Libonia floribunda C. Koch.
Mesembryanthemum aureum L.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ crassicaule Haw.
„ crassulinum Spreng.
„ echinatum Lam.
„ Ecklonis Sahn-Dyck.
„ formosum Haw.
Mesembryanthemum glaucum L.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl Zeyh.
„ spectabile Haw.
„ subincanum Haw.
„ tumidulum Haw.
„ violaceum DC.
Nephrolepis bostoniensis Hort.
„ elegantissima Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Pentstemon gentianoides Poir.
Pilea muscosa Lindl.
Pittosporum undulatum Don.
Plectranthus fructicosus.
Pogostemon Patschouly Pellet.
Rosmarinus officinalis L.
Sansevieria carnea Andr.
Santolina incana Lam.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ grandis Moore.
„ Martensii Spring.
Sempervivum barbatum L.
„ balsamiferum Webb. & Berth.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Tupistra squalidar Ker. Gawl.
Veronica Traversii Hook.

Tábor, in Bohemia I. die m. Januarii 1909.

PhC. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

K. Stehlík,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

QK73
.T32
T33

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

IV.

Delectus seminum plantarum
anno 1909 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L.

Amaryllidaceae.

Ixiolirion Pallasii Fisch & Mey.

Cyperaceae.

Carex adusta Hoock.
„ arenaria L.
„ aristata R. Br.
„ atrata L.
„ canescens L.
„ contigua Hoppe.
„ curvata Knaf.
„ cyperoides L.
„ dioica L.
„ distans L.
„ disticha Huds.
„ divulsa Good.
„ echinata Murr.
„ elongata L.
„ extensa Good.
„ flava L.
„ glauca Murr.
„ hordeiformis Thuill.
„ hordeistichos Vill.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ irrigua Sm.
„ lamprocarpa Čel.
„ lepidocarpa Tsch.
Carex leporina L.
„ multiflora Wahlenbg.
„ muricata L.
„ nubigena D. Don.
„ Oederi Ehrh.
„ panicea L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ pilulifera L.
„ Pseudo-cyperus L.
„ pulicaris L.
„ punctata Gaud.
„ remota L.
„ rhynchophysa Fisch. Mey & Avè-Lall.
„ riparia Curt.
„ rosea Schkuhr.
„ rupestris All.
„ Shortiana Dewey & Torr.
„ Schreberi Schrank.
„ secalina Wahlb.
„ sempervirens Willd.
„ supina Wahlb.
„ teretiuscula Good.
„ umbrosa Host.
„ vesicaria L.
„ vulgaris Fries.
„ vulpina L.
Eriophorum alpinum L.
„ polystachyum Roth.
Scirpus compressus Pers.

Scirpus Holoschoenus L.
„ lacustris L.
„ ovatus Roth.
„ palustris L.
„ uniglumis Link.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch var. aristata.
„ „ „ „ inermis.
„ fatua L.
„ nuda L. var. inermis.
„ „ „ „ aristata Bohemia).
„ „ „ „ „ (Germania).

Avena orientalis Schreb.
1. var. flava.
2. „ obtusata Al. alba (Hungaria).
3. „ a) pugnax Al.
b) „ „ (Polend).
4. „ a) tatarica (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
5. „ a) tristis Al. (Hungaria,
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.
1. var. a) aurea Kcke (Bourbon).
b) „ „ (Osetia, Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
2. „ brunnea Kcke.
3. „ grisea Kcke.
4. „ Krausei Kcke.
5. „ a) montana Alef
b) „ „ (Brauner begrannter).
6. „ mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt.
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Germania.
h) Hirsch.
i) Landa's Grün-Hafer.
j) Lapponia.
k) Leutewitz.
l) Ligovo.
m) Oderbuch.
n) Podolia.
o) Polonia.
p) Probstei.
r) Romania.
s) Silesia.
t) Triumf.
7. var. a) nigra Krause (Étampes).
b) „ „ (Fennia).
c) „ „ (Kylbergensis).
8. „ a) praegravis Langethal (Australia).
b) „ Langethal (Germania).
c) „ Langethal (Scotia).
d) „ Langethal (Willkommen).
9. „ a) setosa Kcke.
b) „ „ (Brauner borstiger).
10. „ a) trisperma Schübler, aristata.
b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum distichum L.
1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
a) Altona.
b) Dania.
c) Imperial.
d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
a) Bavaria.
b) Bestehorn.
c) Chevalieri.
d) Chile.
e) giganteum.

Hordeum distichum L.

f) Hierosolyma.
g) Landa's Porter.
h) Philadelphia.
i) Phoenix.
j) Probstei.
k) Nolč's Imperial Typ A.
l) „ „ „ B.
m) „ „ „ C.
n) „ Bohemia Gerste.
o) „ boehmische früheste.

8. „ spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
b) „ „ (himalayense).
c) „ „ (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
b) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
a) Italia.
b) Marocco.
c) Mandschuria.
d) Norvegia.
e) Peru.
f) Rimpaui.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke. (florentinum).
b) „ Kcke. (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

„ Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂

a) album, aristatum, tectum, distichum.
b) album, furcatum, nudum, distichum.
c) album, furcatum, hexastichum, tectum.
d) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
e) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.

a) Brandeburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssimicum Wittmack.

Triticum compactum Host.

1. var. clavatum Alef.

Triticum compactum Host.
2. var. creticum Mazz.
Blé Herison sans barbes.
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
5. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.
1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ Bauhini Alef. (Roter sammtiger.)
4. „ brunneum Alef.
5. „ campylodon Kcke.
6. „ cladurum Alef.
7. „ farrum Bayle.
8. „ Fuchsii Kcke.
9. „ Krausei Alef.
10. „ liguliforme Kcke.
11. „ macrantherum Kcke.
12. „ pycnurum Alef.
13. „ rufum Schübl (Roter, Sommer).
14. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.
a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.
1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke. (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelas Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum monococcum L.
1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.
1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause (Hispania).
4. „ chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.
1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.
a) Běloturka (guber. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.
1. var. gentile Kcke. (Normandie).
2. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).
3. „ megapolitanum Kcke.
4. „ pseudocervinum Kcke.

Triticum vulgare L.
1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl.
a) Chrestenseni.
b) Victoria.
4. „ a) caesium Alef.
b) „ „ (Blauer, Sommer).
5. „ coeruleo-velutinum Kcke.

Triticum vulgare L.
6. var. erythrospermum Kcke.
   a) aristatum.
   b) Petali.
   c) Salermo.
7. var. ferrugineum Alef.
   a) Hunderttägig.
   b) Umea.
8. „ graecum Kcke.
9. „ a) Hostianum Clem.
   b) „ Weisser Sammtiger Gramen.
10. „ leucospermum Kcke.
11. „ lutescens Alef. (Küstendil).
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).
13. „ muticum Bayle.
   a) Australia.
   b) Brandenburg.
   c) California.
   d) Heine's W.
   e) Noë's W.
   f) Schlandstaedt.
   g) Slané (Bohemia).
14. var. pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L. gigantea.

Hordeum hexastichum L.
1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum.
   b) „ Chrestenseni perlatum.
3. „ Chrestenseni.

Hordeum tetrastichum L.
1. Alberti.
2. Chrestenseni.
3. Groeningense.
4. luteum.
5. Mammuth.

Hordeum tetrastichum L. var. lu‑ulinum.

Hordeum tetrastichum L. var. nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.
1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Schlanstaedt.
5. Thüringen (Imperial).
6. Hyperbel.
7. Louisenhof-Square-head.
8. Montagner R.
9. Champagner R.
10. Dania.
11. Helsingfors.
12. Rossia.
13. Wechselroggen v. Zborow.
14. Zeelander Original.
15. Prof. Heinrich- R. (novum mundi miraculum).
16. Bestehorn's R.
17. Chrestensen's R. giganteum.
18. Chrestensen's Doppelroggen.
19. Victoria (vom Harz).
20. Riesen-Staudenroggen.
21. Bahlsen's-Elite R.
22. Bahlsen's »Ascania«.
23. Jubiläum's R.
24. Vaněk's »Mammuth« R.
25. Landa's »Hannibal« R.
26. Chrestensen's Triumph R.
27. Vaněk's Excelsior R.
28. Vaněk's König's R.
29. Bahlsen's Imperial.
30. Trispermum.
31. Colossal-hybridum.
32. St. Joannis.
33. Altpaleschkener R.
34. Hadmersleben.
35. Buhlendorf.

Secale cereale L. × Triticum vulgare.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.

Triticum dicoccum Schr.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.
„ „ „ var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. bengalense aristatum.
5. dasyanthum.
6. erubescens aristatum.
7. rubrum.
8. velutinum aristatum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum.

1. var. graecum (Korinthus).
2. „ dinura Al. (Helena) Al.
3. „ compositum (velutinum).

Triticum vulgare L.

var. aristatum Schübl.

1. Blé de Champagne.
2. Chrestensen's Goliath-W.
3. Don W.

var. erythrospermum Kcke:

1. Chrestensen's Square head.
2. Bestehorn's W.
3. Kis-Tür (Hungaria).
4. Horford's Michigan bronce.

var. ferrugineum Al.:

1. Rimpau's W. (Germania).

var. muticum Bayle:

1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen
3. Kujava.
4. White Chiddam.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph. Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red. pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomir Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoba.
21. Grösster Goldweizen.
22. Reichmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land-Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. »Nordstrand« (rubrum).
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastard-weizen.
38. Besseler's Nro 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Hallet's Genealogw.
43. Spalding's prolific.
44. Browick red.
45. Blé de Bordeaux.
46. Bristol.
47. Dattelweizen (Vilmorin).
48. Lamend.
49. Bestehorn's Dividendenw.
50. Annenw.
51. Kingshybrid.
52. Red King scott.
53. Red Mary gold.
54. Browick red.
55. Teverson.
56. Cimbal's Centenar.
57. Prinz Albert.
58. Spalding v. Hundisburg.
59. Pearl red Chaff.
60. Schwedischer Stammw.
61. Regent.
62. Wittmack.
63. Cimbal's Fürst Hatzfeld.
64. Helsingfors.
65. Golden rough chaff red.
66. Schariff's Square head, Orig.
67. Besseler's Square head.
68. Heine's kurzer Square head.
69. „ langer Square head.
70. Kirsche's Square head.

Triticum vulgare L.
71. Mette's „ „
72. Strube's „ „
73. Breustedt's langer Square head.
74. „ kurzer „ head.
75. Andebeck Square head.
76. Leutewitz „ „
77. Brauner „ „
78. Chrestensen's weisspelziger Square head.
79. Chrestensen's rotspelziger Square head.
80. Englischer brauner Square head.
81. v. Načeradec.
82. Bore-Svalöf.
83. Extra Svalöf Square head.
84. Egyptischer Mumien »Excelsior«.
85. Original Schiriffw.
86. Landa's roter Wechselw.
87. Landa's »Gigantea«.
88. Böhmischer roter Wechselw.
89. Imperial Kolbenw.
90. Schwedischer Originalw.
91. Chrestensen's Dividendenw.
92. Brandenburger Braunährenw.
93. Bahlsen's »Gigantea«.
94. Branisch's »Gigantea«.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macrura Jaub & Spach.
„ ovata L.
„ speltoides Tsch.
„ squarrosa L.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.

Agrostis alpina Scop.
„ canina L.
„ capillaris All.
„ interrupta L.
„ nebulosa Boiss & Reut.
„ rupestris All.
„ Spica-venti L.
„ stolonifera L.
„ „ „ var. gigantea Gaud.

Agrostis verticillata Vill.
„ vulgaris With.

Aira bottnica Wahlenbg.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ mollis Schreb.

Alopecurus agretis L.
„ arundinaceus Poir.
„ castellanus Boiss & Reut.
„ fulvus Sm.
„ pratensis L.

Andropogon argenteus D. C.
„ Gryllus L.*
„ Ischaemum L.

Anthoxanthum gracile Biv.
„ Puellii Lec. & Lam.

Arrhenatherum avenaceum P. B.
„ bulbosum Presl.

Atropis distans Grieseb.

Avena bromoides Gouan.
„ caryophyllea Weber.
„ desertorum Less.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis L.

Briza maxima L.
„ media L.

Bromus albidus Murr.
„ arvensis L.
„ brachystachys Horn.
„ brizaeformis Fisch.
„ canadensis Michx.
„ caprinus Kern.
„ erectus Huds.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ inermis Leyss.
„ laxus Reichb.
„ patulus Mert & Koch.
„ macranthes Meyen.
„ madritensis L.
„ mollis L.
„ racemosus L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ „ „ grossus Koch.
„ squarrosus L.
„ sterilis L.

Bromus tectorum L.
Calamagrostis arundinacea Roth.
„ epigeios Roth.
„ Halleriana D. C.
Catabrosa aquatica Beauv.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gray.
Chloris elegans H. B. & K. Nov.
Cinna mexicana Beauv.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens Beauv.
Crypsis aculeata Ait.
Cynosurus echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis altaica Bess.
„ Aschersoniana Graeb.
„ glomerata L.
„ hispanica Roth.
Eleusine oligostachya Link.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Wahl.
„ glaucifolius Mühl.
„ hordeiformis Desf.
„ Hystrix L.
„ mexicanus Cav.
„ philadelphicus L.
„ propinquus Fresen.
„ sabulosus M. Bieb.
„ virginicus L.
Eragrostis amabilis Wight & Arn.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ maior Host.
„ minor Host.
„ nigra Nees.
„ pilosa P. B.
Festuca alpina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ Beckeri Hack.
„ borealis Mert & Koch.
„ bromoides Gray.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ duriuscula Jacq.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ Myurus L.
Festuca ovina L. v. glauca Schrad.
„ „ „ „ hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičiana H. M. & J.
„ psammophila Hackel.
„ Pseudovina Hackel.
„ pulchella Schrad.
„ rhoetica Suter.
„ rigida Kunth.
„ rubra L.
„ „ „ var. fallax.
„ „ „ „ heterophylla.
„ spectabilis Jan.
„ tenuifolia Roth.
„ vaginata Waldst & Kit.
„ varia Haenke.
„ violacea Gaud.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria Michauxii Kunth.
Hordeum distichum L.
„ cylindricum Murr.
„ jubatum L.
„ murinum L.
„ secalinum Schreb.
Koeleria alpicola Gren & Godr.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirsuta D. C.
„ rupicola Boiss & Reut.
„ splendens Pers. var. canescens Ven.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lolium canadense Michx.
„ multiflorum Lam.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ exasperata Roem & Schult.
„ nebrodensis Parl.
„ transsylvanica Schur.
Molinia coerulea Moench.
„ „ „ var. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr.

Nardus stricta L.
Panicum altissimum Jacq.
„ bulbosum H. B. K.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ colonum L.
„ Crus galli L.
„ „ „ „ var. maior.
„ Figarei Tod.
„ frumentaceum Roxb.
„ glabrum Gaud.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ milliaceum L. var. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Kcke.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke.
„ oryzoides Sw.
„ paludosum Roxb.
„ sanguinale L.
„ tuberculiflorum Steud.
„ Wightii Nees.
Paspallum tenellum Willd.
Pennisetum longistylum Hochst. var. violaceum.
Phalaris arundinacea L.
„ „ „ var. picta Hort.
„ canariensis L.
„ minor Retz.
Phleum asperum Will.
„ Boehmeri Will.
„ cuspidatum Willd.
„ Michelii Alef.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ tenue Schrad.
Poa abyssinica Jacq.
„ alpina L.
„ annua L.
„ badensis Hke.
„ bulbosa L.
Poa caesia Sm.
„ compressa L.
„ firmula Host.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ var. rigidula.
„ „ „ „ saxatilis.
„ nevadensis Vasey.
„ palustris L.
„ pumila Host.
„ pannonica Kern.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.
„ versicolor Bess.
Sclerochloa dura Beauv.
Sesleria calcaria Opiz.
„ uliginosa Opiz.
Setaria ambigua Guss.
„ germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ „ „ var. breviseta
„ „ „ „ lobata.
„ „ „ „ longiseta.
„ japonica Pynaert.
„ macrostachya H. B. K.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis Beauv.
„ vulpiseta Roem. & Schult
Sorghum vulgare Pers. var. Arduini Jacq.
„ „ „ „ usorum Nees.
Stipa Aristella L.
„ Calamagrostis Wahlenb.
„ calatajeronensis Tineo.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
„ juncea Sibth.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
Trisetum distichophyllum Beauv.
Triticum caninum Schr.
„ glaucum Desf.
Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L.
„ „ „ var. americana.

Zea mais L. var. Cinquantino.
„ „ „ „ Curagua.
„ „ „ „ Kečider.
„ „ „ „ Kelsey.
„ „ „ „ multicolor Kcke.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ Novoboracensis.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ praecox.
„ „ „ „ racemosa.
„ „ „ „ Razgrad.
„ „ „ „ Romania.
„ „ „ „ saccharata fr flavo.
„ „ „ „ saccharata fr lilacino.
„ „ „ „ Sekler.
„ „ „ „ Jellow.

Irideae.

Gladiolus palustris Gaud.
Iris anglica Hort.
„ arenaria Waldst & Kit.
„ cristata Ait.
„ Pseudacorus L.
„ sibirica L.
„ versicolor L.
Sisyrinchium anceps Cav.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
„ compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
„ filiformis L.
„ Gerardi Loisel.
„ glaucus Ehrh.
„ lamprocarpus Ehrh.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ campestris D. C.
„ multiflora Lej.
„ pallescens Bess.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atropurpureum Waldst.
„ atroviolaceum Boiss.
Allium azureum Ledeb.
„ baicalense Willd.
„ Cepa L.
1. argentea.
2. James.
3. Holland.
4. Madeira.
5. parva, lutea (Bohemia
6. Zittauer gelb.
7. Zittauer roth.

Allium coeruleum Pall.
„ fistulosum L.
„ globosum Red.
„ hymenorrhizum Ledeb.
„ Kochii Lange.
„ Libani Boiss.
„ Ledebourianum Schult.
„ montanum Schmidt.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens Sibth & Sm.
„ striatum Regel.
„ Victorialis L.
„ vineale L.
Anthericum Liliastrum L.
Bellevalia aleppica Boiss.
Colchicum Cupani Guss.
Eremurus Tauricus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
„ oranensis Pomel.
„ pallidiflora Schrenk.
Hyacinthus amethystinus L.
„ ciliatus Cyrill v. aureus.
Lilium bulbiferum L.
„ Martagon L.
Muscari alpinum J. Gray.
„ atlanticum Boiss & Reut.
„ botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ praecox Siehe.
„ racemosum Mill.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Scilla italica L.
Tulipa armena Boiss.
„ biflora Pall.
„ Billietiana Jord.
„ retroflexa Hort.
„ Sprengeri Baker.
„ viridiflora Hort.
Veratrum nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amaranthus bullatus Bess.
„ caudatus L.
„ chlorostachys Willd.
„ esculentus Bess.
„ hypochondriacus L.
„ paniculatus L.
„ paniculatus L. v. sanquineus L.
„ retroflexus L.
„ sanquineus Vell.
„ silvestris Desf.
Chamissoa pyramidalis Moq.

Aroideae.

Arum maculatum L.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
„ incarnata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.
„ glanduligera Royle.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Link. v. rosea.
Begonia semperflorens Link v. rubra.

Borraginaceae.

Anchusa italica Retz.
„ officinalis L.
„ osmanica Vel.
Borrago officinalis L.
Cerinthe aspera Rth. v. gymnandra.
Cynoglossum Columnae Bivona.
„ furcatum Wall.
„ linifolium L.
„ officinale L.
„ montanum L.
Echinospermum consanguineum Fisch. & Mey.
Eritrichium strictum Decne.
Lithospermum arvense L.
„ officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis stricta Lk.
Paracaryum coelestinum Benth & Hook.
Symphytum orientale L.

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.
„ stricta Miq.
Campanula abietina Griseb & Schenk.
„ alliariaefolia Willd.
„ cordata Peterm.
„ glomerata L.
„ linifolia Scop.
„ macrantha Boiss.
„ media L.
„ Pallasiana Roem v. Schult.
„ rapunculoides L.
„ sarmatica Ker & Gawl.
„ trachelium L.
Hedraeanthus tenuifolius A. D. C.
Phyteuma nigrum Lehm.
„ Scheuchzeri Alt.
„ spicatum L.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
Podanthum anthericoides Janka.
Specularia Speculum D. C.
Symphyandra Hofmanni P.
Wahlenbergia lobelioides Link.

Caprifoliaceae.

Sambucus glauca Nutt.

Caryophylleae.

Agrostemma bicolor Lindl.
„ coronaria L.
„ Flos-jovis L.
„ Githago L.
Alsine banatica Bluff. & Fingh.
„ fastigata Bab.
„ grandiflora Crantz.
„ graminifolia Gm.
„ Jacquini Koch.

Alsine verna Bartl.
Arenaria caucasica Adans.
„ grandiflora L.
„ holosteoides Edgew.
„ serpyllifolia L.
Cerastium Boissieri Gren.
„ chloraefolium Fisch & Mey.
„ dichotomum L.
„ moesiacum Frivald.
„ perfoliatum L.
„ purpurascens Fenzl.
„ tomentosum L.
„ triviale Link.
Dianthus alpestris Sternberg.
„ arenarius L.
„ atrorubens All.
„ caesius Sm.
„ campestris M. Bieb.
„ Caryophyllus L.
„ caucasicus Bieb.
„ deltoides L.
„ fragrans Bieb.
„ frigidus Zucc.
„ giganteus Arv.
„ Hedewigi Borb.
„ hybridus Schmidt.
„ liburnicus Bartl & Wendl.
„ monspessulanus L.
„ pallens Siebth & Sm.
„ Pančičii Velen.
„ petraeus Waldst & Kit.
„ plumarius L.
„ silvaticus Hoppe.
„ stellaria Stark.
„ versicolor Fisch.
Gypsophila altissima L.
„ Gmelini Bunge.
„ libanotica Boiss.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ perfoliata Boiss.
„ Rokejeka Delile.
„ saligna Schrad.
„ Saxifraga L.
Heliosperma pudibundum Griseb.
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.
Lychnis alpina L.
„ chalcedonica L.
„ coronaria Desr.
Lychnis lapponica Sieb.
Melandryum album Garcke.
„ macrocarpum Willk.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ rubrum Garcke.
„ Zawadskii A. Br.
Saponaria lutea L.
Silene Atocion Murr.
„ alpestris Jacq.
„ Boissieri J. Gray.
„ caucasica Boiss.
„ cerastoides L.
„ colorata Poir.
„ conoidea L.
„ echinata Otth.
„ inflata Sm.
„ integripetala Bory & Chaub.
„ italica Pers.
„ pendula L.
„ petraea Waldst. & Kit.
„ pulchra Torr & Gray.
„ quinquevulnera L.
„ oxyodonta C. & W. Barbey.
„ Sartorii Boiss & Heldr.
„ stricta L.
„ tatarica Pers.
„ Thorei Duf.
„ transsilvanica Schur.
„ venosa Aschers.
Spergula arvensis L.
„ „ „ var. maxima Weihe.
„ „ „ „ sativa.
„ laxiflora Bart.
„ pentandra Bor.
„ rubra Presl.
Tunica graminea Boiss
„ Saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Celastrineae.

Euonymus latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad
Atriplex hortensis L.
„ littoralis L.
„ sibirica L.

Beta maritima L.
„ patula Ait.
„ trigyna W. K.
„ vulgaris L. var. altissima.
„ „ „ „ „ (Chotětov).
„ „ „ „ „ (Meté).
„ „ „ „ „ (Schreiber's Elite).
„ „ „ „ „ (Schreiber's Specialität).
„ „ „ „ „ Wohanka's zuckerreiche).
„ „ „ „ „ Wohanka's ertragreichste).
„ „ „ „ brasiliensis Hort.
„ „ „ „ cicla (Eckendorfer).
„ „ „ „ „ (Eckendorfer weisse).
„ „ „ „ „ Olivenförmige weisse).
„ „ „ „ „ (oliven förmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ „ „ Leutewitzer runde rote).
„ „ „ „ „ (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ „ „ (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ „ „ (Erfurter Flaschen lange dicke gelbe).
„ „ „ „ „ Oberdorfer gelbe).

Beta vulgaris L. var. cicla (Erfurter Modell).
„ „ „ „ rubra (Salatrube).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ californicum S. Wats.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ virgatum Thunb.
„ Vulvaria L.
Hablitzia tamocides M. Bieb.
Kochia hyssopifolia Schrad.
„ scoparia Schrad.
Salsola rosacea L.
Schizotheca patula Čel.
Spinacia oleracea L. var. inermis.
„ „ „ „ spinosa.

Cistineae.

Cistus salvifolius L.
Helianthemum alpestre Reichb.
„ chamaecistus Mill.
„ „ „ v. purpureum.
„ laevandulaefolium Mill.
„ pilosum Mill.
„ salicifolium Mill.
„ variabile Mill.

Compositae.

Achillea Aizoon Griseb.
„ clypeolata Sibth & Sm.
„ magna L.
„ tanacetifolia All.
Achyrachaena mollis Schau.
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia artemisiaefolia Willd.
„ latifolia.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ cotula L.
„ nobilis L.

Anthemis ruthenica M. B.
„ tinctoria L.
Arnica foliosa Nutt.
„ montana L.
„ sachaliensis A. Gray.
Arnoseris pusilla Gaertn.
Artemisia salsoloides Willd.
Aster alpinus L.
„ chinensis L.
„ „ „ var. alba.
„ Linosyris Bernh.
Baeria coronaria Gray.
Barkhausia alpina D. C.
Brachycome iberidifolia Benth.
Burrielia chrysostoma Torr. & Gray.
Calendula Cristagalli Viv.
„ maritima Guss.
„ officinalis L.
Callichroa platyglossa Fisch. & Mey.
Calliopsis bicolor Reichb.
Carduus lampedusanus Lojac.
„ nutans L.
„ pycnocephalus L.
Carlina acaulis Lam.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea americana Spreng.
„ aurea Aly.
„ axillaris Willd.
„ carniolica Host.
„ Cyanus L.
„ „ „ v. coelestina.
„ flammea D. C.
„ gigantea Sch.
„ lusitanica Boiss & Reut.
„ macrocephala Puschk.
„ orientalis L.
„ rupestris L.
„ strobilacea Scop.
Chamaemelum inodorum Viv.
Chrysanthemum atratum L.
„ carinatum Schousb.
„ cinerariaefolium Vis.
„ corymbosum L.
„ macrophyllum Waldst.
„ Myconis L.
„ roseum M. B.
„ segetum L.
„ viscosum Desf.
Cichorium Intybus L.
„ „ „ culta (Badische walzenförmige).
Cirsium anglicum D. C.
„ canum × acaule.
„ flavispinum Boiss.
„ heterophyllum Hill.
„ lanceolatum Hill.
„ oleraceum Scop.
„ „ × acaule.
„ pannonicum Gaud.
„ pyrenaicum D. C.
„ scleranthum Bieb.
„ Tapeineri Rgl.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Crepis Dioscoridis L.
„ grandiflora Tausch.
„ pulchra L.
„ rigida Waldst & Kit.
„ rubra L.
„ setosa Hall.
„ tectorum L.
„ virens Vill.
Crupina vulgaris Cass.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dysodia Porophyllum Cav.
Echinops bannaticus Rochel.
„ exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ niveus Wall.
„ sphaerocephalus L.
Erigeron acris C. B. Clarke.
„ canadensis L.
„ alpinus L. v. grandiflorus.
„ macranthus Nutt.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.
„ germanica L.
„ minima Fries.
Gailardia picta Sweet.
Geropogon glabrum L.
Gnaphalium arenarium L.
„ luteo-album L.
„ uliginosum L.
Guizotia oleifera D. C.
Hagioseris galilaea Boiss.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr & Gr.

Helichrysum monstrosum Hort.
Helipterum Humboldtianum D. C.
Hieracium amplexicaule L.
„ aurantiacum L.
„ barbatum Tausch.
„ Bornmüelleri Freyn.
„ brevifolium Tausch.
„ crinitum Sibth & Sm.
„ dovrense Fries.
„ echioides Lumnitz.
„ glaucum All.
„ grandidentatum Čel.
„ graniticum Schulz.
„ gymnocephalum Griseb.
„ longifolium Hornem.
„ pallidum Biv.
„ pannosum Boiss.
„ praealtum Gochm.
„ rigidum Hartm.
„ saxatile Rchb.
„ Schmidtii Tsch.
„ strictum Fries.
„ tridentatum Fries.
„ umbellatum L.
„ villosum L.
Hypochoeris aetnensis Benth.
„ arachnoides Poir.
„ glabra L.
„ maculata L.
„ radicata L.
„ uniflora Vill.
Inula Helenium L.
Iva xathifolia Nutt.
Kalbfussia Salzmanni Sch.
Lactuca angustana All.
„ perennis L.
„ quercina L.
„ sagittata Waldst & Kit.
„ sativa L. v. capitata.
„ „ „ „ hiberna.
„ tatarica C. A. Mey.
„ virosa L.
Lagoseris bifida Koch.
Lappa edulis Sieb.
„ tomentosa Link.
Lapsana communis L.
„ grandiflora Bieb.
„ Lasthenia glabrata Lindl.
Layia glandulosa Hook & Arn.
Lepidophorum repandum D.C.

Leontodon alpinus Vill.
„ autumnalis L.
„ caucasicus Fisch.
„ incanus Schrank.
„ pyrenaicus Gouan.
Leontopodium alpinum Cass.
„ himalayanum D. C.
Ligularia macrophylla D. C.
„ sibirica Cass.
Lindheimera texana A. Gray.
Madaria elegans D. C.
Madia dissitiflora Torr & Gray.
„ sativa Molina.
„ stellata Fisch & Mey.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
„ Lagascae Koch.
Microseris Douglasii Sch.
Moscharia pinnatifida Rniz & Pav.
Notobasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
„ vulgare Desf.
„ tingitanum Desf.
Picris hieracioides L.
„ Sprengeriana Poir.
Prenanthes alba L.
Pyrethrum carneum M. Bieb.
„ Parthenium Sm.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
„ stellatus D. C.
Rhaponticum pulchrum Fisch & Mey
Rudbeckia californica A. Gray.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scorzonera hispanica L.
„ angustifolia L.
Senecio elegans L. v. nana.
„ fluviatilis Wallr.
„ Fuchsii C. C. Gmel.
„ Gallicus Chaix.
„ Jacobaea L.
„ nemorensis L.
„ vernalis Walldst & Kit.
„ vulgaris L.
Seriola aethnensis L.
Serratula coronata L.
„ glauca Ledeb.
„ rhapontica D. C.
Solidago alpestris W. K.
„ sparsiflora A. Gray.
„ Virgaurea L.

Sonchus asper All.
„ laevis All.
„ tenerrimus L.
Tagetes patula L. var. nana fr. pl.
„ „ „ „ pulchra „ „
„ signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum erythrospermum Andrz.
Tragopogon balcanicum Velen.
„ glaber Hill.
„ longirostris Bischoff.
„ pusillus Bieb.
„ Tommasinii Sch.
Xanthium Strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta arvensis Bayer. (Trifolium pratense.)
„ Epilinum Weihe. (Linum usitatissimum.)
„ glomerata Choisy. (Solidago canadensis.)
„ lupuliformis Krock. (Salix amygdalina.)
„ maior D. C. (Urtica dioica.)
„ racemosa Mart. (Trifolium pratense, Medicago sativa.)
Ipomoea hederacea Jacq.
„ purpurea Roth.

Cruciferae.

Aethionema arabicum Andrz.
„ Buxbaumii D. C.
Alyssum calycinum L.
„ incanum L.
„ montanum L.
„ orientale Ard.
„ repens Baumg.
„ Wulfenianum Willd.
Arabis alpina L.
„ caucasica Willd.
Biscutella erigerifolia D. C.
Brasica Napus L. var. oleifera, annua
1. Balcanora.
2. Bhunri-sarsa.
3. Janda-sarsa.
Brasica nigra Koch.
„ rapa L. var. oleifera D. C. annua.
1. Holland.
2. Schweden.
3. Thüringen.
4. Ungarn.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Capsela bursa pastoris Moench.
Cheiranthus Senoneri Heldr & Sart.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis Dum.
Crambe abyssinica Hochst.
„ maritima L.
Draba aizoides L.
„ aurea Wahl.
„ borealis D. C.
„ bronchialis D. C.
„ frigida Sauter.
„ incana L.
„ Joannis Host.
„ verna L.
Eruca sativa Mill.
Erucaria allepica Gaertn.
Erysimum angustifolium Rb.
„ canescens Roth.
„ cheiranthoides L.
„ crepidifolium Rb.
„ helveticum D. C.
„ repandum L.
„ strictum Nett.
Goldbachia laevigata D. C.
Heliophila amplexicaulis L.
Hesperis matronalis L.
„ tristis L.
Hirschfeldia incana Lowe.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
Iberis Forestieri Jord.
„ intermedia Guss.
„ nigricans Fisch.
„ odorata Boiss.
Isatis alpina All.
„ canescens D. C.
„ littoralis Bess.

Isatis praecox Kit.
„ tinctoria L.
Lepidium incisum Roth.
„ latifolium L.
„ Menziesii D. C.
„ sativum L.
Matthiola bicornis D. C.
Neslia paniculata Desf.
Notoceras canariense R. Br.
Ochthodium aegyptiacum D. C.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer Hort.
„ raphanistrum L.
„ sativus L.
„ „ „ var. niger D. C. rotundus annus.
„ „ „ var. hiemalis.
„ „ „ var. hiemalis (Erfurt).
„ „ „ var. hiemalis oleiferus L.
Rapistrum perenne All.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ „ „ var. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ nigra L.
Sisymbrium Irio L.
Soria syriaca Desv.
Succowia balearica Medic.
Thlaspi arvense L.
„ ceratocarpum Murr.
„ Huetii Boiss.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Cucurbita Pepo L. Mammuth.
„ „ „ oviformis.
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Ecbalium Elaterium A. Rich.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ centauroides Roem & Schult.
Cephalaria leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.
Dipsacus atratus Hook.
„ azureus Schrenk.
„ ferox Loisel.
„ laciniatus L.
„ silvestris Mill.
Pterocephalus plumosus Coult.
Scabiosa arvensis L.
„ atropurpurea L. v. grandiflora.
„ caucasica M. Bieb.
„ ochroleuca L.
„ prolifera L.
„ suaveolens Desf.
„ ucranica L.

Droseraceae.

Drosera rotundifolia L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia falcata L.
„ helioscopia L.
„ Lathyris L.
„ Peplus L.
„ platyphylla.
„ Ipecacuanha L.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
„ asclepiadea L.
„ Cruciata L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L' Hérit.
„ gruinum Willd.
Geranium albiflorum Ledeb.
„ carolinianum L.
„ collinum Steph.
„ columbinum L.
„ dahuricum D. C.
„ dissectum L.
„ nepalense Sweet.
„ palustre L.
„ pusillum L.
„ pyrenaicum Burm.
„ rotundifolium L.
„ tomentosum Thunb.
„ Wallichianum D. Don.
Oxalis corniculata L.

Hydrophylleae.

Cosmanthus viscidus D. C.
Eutoca viscida Benth. var. albida.
Phacelia bipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ fimbriata Michx.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericineae.

Hypericum chinense Lam.
„ humifusum L.
„ perforatum L.
„ pyramidatum Ait.
„ rumelicum Boiss.

Illecebraceae.

Scleranthus annuus L.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Betonica grandiflora Willd.
„ officinalis L.
Calamintha acinos Clairo.
„ Clinopodium Spenn.
Chaiturus marrubiastrum Rchb.
Dracocephalum canescens L.
„ Moldavica L.
„ peltatum L.
„ Ruprechti Regel.
„ thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ pyrenaica Bartl.
„ Tetrahit L.
„ versicolor Spenn.
Cardoquia betonicoides Lendl.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch & Mey.
„ peltata Fisch & Mey.
Lamium album L.
„ purpureum L.
Lavandula vera D. C.
Leonurus Cardiaca L.
Nepeta cyanea Stev.
„ granatensis Boiss.
„ Mussini Spreng.
„ nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Phlomis alpina Pall.
„ armeniaca Willd.
„ tuberosa L.
Prunella australasica Moric.
„ grandiflora Jacq.
„ pyrenaica Phylippe.
„ Webbiana Loud.
„ vulgaris L.
Salvia acaulis L.
„ Aethiopis Brot.
„ austriaca Jacq.
„ Bertolonii Vis.
„ gigantea Desf.
„ glutinosa L.
„ Horminum L.
„ longiflora Ruiz. & Pav.
„ napifolia Jacq.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ pratensis L.
„ silvestris L.
„ verticillata L.
Satureia hortensis L.
„ montana L.
Scutellaria japonica Morr.
„ orientalis L.
Stachys alpina L.
„ annua L.
„ arvensis L.
„ aurea Benth.
„ cassia Boiss.
„ germanica L.
„ heraclea All.
„ lanata Jacq.
„ palustris L.
„ Parolinii Viss.
Thymus alpestris Tausch.
„ angustifolius Pers.
„ Chamaedrys Fries.
„ humifusus Bernh.
„ serpyllum L.
„ vulgaris L.

Leguminosae.

Astragalus asper Jacq.
„ baeticus L.
„ Cicer L.
„ danicus Retz.
„ glycyphyllus L.

Astragalus gummifer Labill.
„ illyricus Bernh.
„ maximus Willd.
„ Onobrychis L.
„ sulcatus L.
Caragana pygmaea D. C.
Cicer arietinum L.
„ „ „ var. nigrum.
„ „ „ „ rotundum.
„ pinnatifidum Jaub & Spach.
Coronilla varia L.
„ variabilis Lamk.
Cytisus austriacus L.
„ capitatus Jacq.
Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
Ervum abessinicum Hort.
„ Ervilia L.
„ monanthos Desf.
Galega officinalis L.
Genista ovata Waldst & Kit.
„ sagittalis L.
Hedysarum altaicum Fisch.
„ multijugum Maxim.
„ obscurum L.
Lathyrus albus A. Gray.
„ alatus Tenore.
„ Aphaca L.
„ articulatus L.
„ Bauhini Genty.
„ Cicera L.
„ Clymenum.
„ hirsutus L.
„ montanus Bernh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ pisiformis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ tingitanus L.
„ tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ (var. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus edulis L.
„ corniculatus L.
Lupinus affinis Agardh.
„ albus L.
„ angustifolius L.
„ „ „ v. albus.
„ Cruckshauskii Hook.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandiflorus Don.
„ Hilarianus Benth.
„ hirsutus L.
„ linifolius Roth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
„ sulphureus Dougl.
„ Termis Forsk.
Medicago apiculata Willd.
„ arabica L.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ Helix Willd.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ sativa L.
„ scutellata All.
„ Terebellum Willd.
Melilotus alba Desr.
„ dentata Pers.
„ officinalis Lam.
„ segetalis Sér.
„ sulcata Desf.
Onobrychis aequidentata Urv.
„ Caput-galli Lam.
„ Crista-galli Lam.
„ sativa Lam.
Ononis hircina Jacq.
„ procurens Wallr.
„ spinosa L.
Ornithopus perpusillus L.
„ sativus L.
Orobus niger L.
„ vernus L.

Oxytropis foetida D. C.
„ Hallerii Bunge.
„ pilosa D. C.
Phaca alpina L.
Phaseolus cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. var. carneus.
„ lunatus L.
„ „ „ var. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L.
„ „ „ var. compressus Mus.
„ „ „ var. communis.
„ „ „ „ gonospermus Savi.
„ „ „ „ nanus L.
„ „ „ „ nigerrimus Juss.
„ „ „ „ oblongus Savi.
„ „ „ „ tuberosus.
Pisum arvense L.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Rchb.
„ sativum L.
„ „ „ var. Concentator L.
„ „ „ „ (Dickson's allerfrühe-ste).
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.
Pocockia cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
Soja hispida Moench.
„ „ „ var. lutea.
„ „ „ „ nigra.
Tetragonolobus purpureus Moench.
„ Requienii Fisch & Mey.
Trifolium agrarium Poll.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ arvense L.
„ elegans Savi.
„ glomeratum L.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ Lupinaster L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ pannonicum L.
„ parviflorum Ehrenb.
„ pratense L.
„ procumbens L.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ striatum L.
Trigonella coerulea Ser.
„ Foenum graecum L.
„ monspeliaca L.
Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ biennis L.
„ calcarata Desf.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ cornigera Chaub.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ Faba L. var. dura.
„ „ „ „ „ maior.
„ „ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ grandiflora Scop.
„ „ „ var. Kitaibeliana.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii M. Bieb.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Crantz.

Vicia picta F. Mey.
„ pisiformis L.
„ sativa L.
„ „ „ dalecarliensis.
„ „ „ dura.
„ „ „ leucosperma.
„ „ „ thebanensis.
„ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ striata M. Bieb.
„ tenuifolia Roth.
„ tetrasperma Moench.
„ unijuga A. B.
„ varia Host.
„ villosa Roth.

Lineae.

Linum alpinum L.
„ americanum L. var. album.
„ angustifolium Huds.
„ austriacum L.
„ candidissimum V'Hout.
„ Lewisii Pursch.
„ perenne L.
„ sibiricum D. C.
„ striatum Walt.
„ usitatissimum L.
1. var. crepitans.
2. „ flore albo, semperflorens.
3. „ hibernum.
4. „ hungaricum.
Linum usitatissimum L. (Böhmen).
„ „ „ (Erfurt).
„ „ „ (Ostindien).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Zeeland).
„ „ „ (Gelbsamiger).

Lythrarieae.

Olinia cymosa Thunb.

Malvaceae.

Abutilon Regnellii Miq.
Hibiscus Abelmoschus L.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
Malva Alcea L.
„ crispa L. var. rubra Hort.
Sida rhombifolia L.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalappa L.

Oleaceae.

Syringa Josikaea Jacq.

Onagrariaceae.

Clarkia elegans Poir fr. pleno. Hort.
Epilobium angustifolium L.
„ Dodonaei Vill.
„ hirsutum L.
„ microphyllum A. Rich.
Godetia gloriosa Hort.
„ grandiflora Lindl.
„ Lady Satin Rox.
„ purpurea G. Don.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ rhizocarpa Spreng.

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk (Vicia Faba).
„ cruenta Bertol (Lotus corniculatus).
„ cumana Wallr. (Helianthus annuus).
„ ramosa L. (Cannabis sativa).

Papaveraceae.

Adlumia cirhosa Rafin var. purpurea.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium majus L.
Corydalis rosea Maxim.
Escholtzia californica Cham.
Glaucium luteum Scop.
„ phoeniceum Crantz.
Papaver album L.
„ arenarium Bieb.

Plantago media L.
„ montana Lam.
„ saxatilis M. Bieb.

Plumbagineae.

Armeria alpina Willd.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ plantaginea Willd.
„ splendens Boiss.
„ vulgaris Willd.
Statice serbica Nym.

Polemoniaceae.

Collomia heterophylla Hook.
Gilia capitata Sims.
„ grandiflora A. Gray.
„ tenuiflora Benth.
„ tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
„ himalayense Hook.

Polygonaceae.

Polygonum convolvulus L.
„ Fagopyrum L.
„ „ „ argenteum.
„ „ „ emarginatum.
„ „ „ var. marginatum.
„ japonicum Hort.
„ lapathifolium L.
„ orientale L.
„ Persicaria L.
„ rotundatum Bab.
„ tataricum Gaertn.
„ „ „ var. secalinum.
„ tinctorium L.
Rheum officinale Baill.
„ Rhaponticum L.
„ undulatum L.
Rumex Acetosella L.
„ alpinus L.
„ aquaticus L.
„ crispus L.
„ Patientia L.
„ sanguineus L.
Rumex stenophyllus Ledeb.
„ vesicarius L.

Primulaceae.

Anagalis arvensis L.
„ coerulea Lam.
Androsace lactiflora Hort.
„ maxima L.
„ septentrionalis L.
Lysimachia ciliata L.
„ japonica Thunb.
„ vulgaris L.
Naumburgia thyrsiflora Reichb.
Primula officinalis L.
„ spectabilis Tratt.

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum L.
„ pyramidale Mill.
„ variegatum L.
Adonis aestivalis L.
„ Cupaniana Guss.
„ flammea Jacq.
Anemone narcissiflora L.
„ silvestris L.
Aquilegia advena Regel.
„ atrata Koch.
„ Bauhini Schott.
„ blanda v. Houtte.
„ Buergeriana Sieb & Zucc.
„ canadensis L.
„ cariophyloides L.
„ chrysantha A. Gray.
„ coerulea James.
„ flabellata Sieb & Zucc.
„ fragrans Benth.
„ lactiflora Kar-Kir.
„ olympica Boiss.
„ rhodosepala.
„ viridiflora Pallas.
Caltha palustris L.
Clematis recta L.
Delphinium Ajacis L.
„ barbatum Bunge.
„ Consolida L.
„ dictyocarpum D. C.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ elatum.

Delphinium Mackianum Regel.
„ mesoleucum Link.
„ Requienii D. C.
„ Skinneri.
Eranthis hiemalis Salisb.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
„ damescena L.
„ integrifolia Regel.
„ sativa L.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ triternata Pall.
Pulsatila grandis Wender.
Ranunculus acris L.
„ arvensis L.
„ brutius Tenore.
„ chaerophyllus L.
„ cordigerus Viv.
„ Cymbalaria Pursch.
„ illyricus L.
„ parviflorus L.
„ pensilvanicus L.
„ serbicus Vis.
„ sceleratus L.
„ Schraderianus Fisch & Mey.
„ trachycarpus Fisch & Mey.
„ trilobus Desf.
Thalictrum aquilegiaefolium L.
„ bulgaricum Velen.
„ minus L.

Resedaceae.

Reseda lutea L.
„ Luteola L.
„ odorata L.
„ Phyteuma L.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium L.
„ odorata. Mill.
Alchemilla pilosa Ledeb.
Comarum palustre L.
Cydonia japonica Pers.
„ Maulei T. Moore.
Geum japonicum Thunbg.
„ macrophyllum Willd.
Geum molle Vis & Panč.
„ pyrenaicum Mill.
„ rubellum Fisch & Mey.
„ triflorum Presl.
„ urbanum L.
Potentilla alpestris L.
„ atrosanquinea Sixta.
„ calabra Tenore.
„ chinensis Ser.
„ Hookeriana Lehm.
„ macrophylla Schur.
„ montenegrina Pantoč
„ multifida L.
„ opaca L.
„ pimpinelloides L.
„ ranunculoides H. & B.
„ recta L.
„ sericea L.
„ Wrangeliana Fisch & Avé-Lall.
Poterium Magnolii Spach.
„ Sanguisorba L.
„ spinosum L.
Sibbaldia cuneata Hornem.
Sorbus Aucuparia L.
„ melanocarpa Heynh.
Spiraea Filipendula L.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
„ orientalis Boiss.
„ longiflora Waldst. & Kit.
Crucianella aegyptiaca L.
Galium album Forsk.
„ anglicum Huds.
„ Aparine L.
„ tricorne With.
Rubia cordifolia L.
„ Olivierii A. Rich.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ptelea trifoliata L.

Saxifragaceae.

Heuchera Richardsoni R. Br.
Parnassia palustris L.
Saxifraga caespitosa L.
„ penduliflora Bast.
„ sibirica L.

Scrophulariaceae.

Collinsia bartsiaefolia Benth.
„ bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
„ eriostachya Bess.
„ ferruginea L.
„ orientalis Donn.
„ sibirica Lindl.
„ viridiflora Lindl.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria anticaria Boiss & Reut.
„ arvensis Desf.
„ dalmatica Mill.
„ elatine Mill.
„ minor Desf.
„ multipunctata Hoffmg. & Link.
„ purpurea Mill.
„ pyrenaica D. C.
„ reticulata Desf.
„ spuria Mill.
„ triphylla Mill.
„ vulgaris Mill.
Lophospermum scandens D. Don.
Melampyrum arvense L. (Triticum vulgare.)
Mimulus cupreus Regel v. nanus Hort.
„ hybridus Hort.
„ „ „ tigrinus duplex Hort.
Nemesia floribunda Lehm.
„ pubescens Benth.
„ strumosa Benth.
Rhinanthus villosus Pers. (Triticum vulgare.)
Verbascum Blattaria Vell.
„ bombyciferum Boiss.
„ floccosum Waldst & Kit.
„ lychnitis L.
„ phlomoides L.
„ phoeniceum L.
„ nigrum L.
„ sinuatum L.
„ speciosum Schrad.
„ thapsus L.
Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ austriaca L.
„ bellidioides L.
Veronica fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ incana L.
„ longifolia L.
„ orientalis Mill.
„ persica Hort.
„ polita Fries.
„ praecox All.
„ saxatilis Jacq.
„ spicata L.
„ spuria L.
„ Teucrium L.
„ triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.

Solanaceae.

Browalia demissa L.
„ azurea Hort.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura inermis J. Jord.
„ Leichhardtii F. Murell.
„ quercifolia H. B. & K.
„ Stramonium L.
Hyoscyamus aureus L.
„ chloranthus Vender.
„ niger L.
Lycopersicum Humboldtii Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata L. & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ auricula Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.
„ rustica L.
„ silvestris Speg & Comes.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.
Petunia hybrida Hort.
„ nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
„ Francheti Mast.

Physalis peruviana L.
„ angulata L.
Salpiglossis variabilis Hort.
Saracha viscosa Link.
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.
Solanum Besserianum Weinm.
„ miniatum Bernh.
„ nigrum L.
„ „ „ v. villosum.
„ racemiflorum Dun.

Thymeleaceae.

Daphne Mezereum L. fr. albo.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum maius L.
„ minus L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica elata Velen.
Apium australe Thon.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
Astrantia maior.
Bubon Galbanum L.
Bupleurum falcatum L.
„ rotundatum L.
Carum buriacticum Turcz.
„ Carvi L.
Caucalis daucoides.
Cerefolium sativum Bess.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ bulbosum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium eburneum Decne.
„ coeruleum Bieb.
„ spinalba Vill.
Ferula thyrsiflora Sibth & Sm.
Hasselquistia cordata Jacq.
Heracleum persicum Desf.
„ Sphondylium L.
Laserpitium hispidum M. Bieb.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum scoticum L.
Meum athamanticum Jacq.
„ Mutellina Gaertn.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Pastinaca sativa L.
„ selmoides Vis.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum austriacum Koch.
„ palustre Moench.
„ ruthenicum M. Bieb.
Pimpinella anisum L.
„ peregrina L.
Prangos thapsioides D. C.
Scandix Pecten Veneris L.
„ persica Mart.
Selinum Carvifolia L.
Seseli crassifolium Hort.
„ elatum L.
„ glaucum Jacq.
Silaus alpestris Bess
„ flavescens Bernh.
„ pratensis Bess.
Sium lancifolium M. Bieb.
„ Sisarum L.
Smyrnium apifolium Willd.
Thysselinum palustre Hoffm.
Trinia Kitaibelii M. Bieb.
„ vulgaris D. C.

Urticaceae.

Cannabis gigantea Voss.
„ himalayana Hort.
„ indica Lam.
„ sativa L.
Urtica pentandra Roxb.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Fedia scorpioides Dufr.
Valerianella auricula D. C.
„ coronata D. C.
„ Morisonii D. C.
„ olitoria Pollich.

Verbenaceae.

Verbena hybrida & Hort.

Violaceae.

Viola betonicifolia Sm.
„ dactyloides Roem & Schultz.

Viola macedonica Boiss & Reutt.
„ montana Murr.
„ Munbyana Boiss & Reut.
„ olympica Boiss.
„ Patrinii Ging.
Viola pinnatifida All.
„ polychroma Kern.
„ primulifolia L.
„ suavis Bieb.
„ tricolor L. v. arvensis.

Semina plantarum sponte nascentium.

I. Bohemia.

Anemone narcisiflora L.
Dentaria bulbifera L.
Empetrum nigrum L.
Festuca silvatica L.
Gnaphalium supinum L.
Hieracium alpinum L.
„ umbellatum L.
Homogyne alpina Cass.
Luzula sudetica D. C.
Mulgedium alpinum Less.
Primula elatior Hill.
Pulsatilla alpina Schrank.
Ranunculus aconitifolius L.
Rhinanthus alpinus Lam.
Sagina procumbens Hook.
Taraxacum alpestre D. C.
Thesium alpinum L.

II. Tirolia.

Quercus Ilex L.

III. Bulgaria.

(Legit. cl. V. Stříbrný.)

A. Spontanea.

Althaea cannabina L.
Alyssum minutum Schlecht.
Carduus globifer Velen.
„ rhodopeus Velen.
Celsia roripifolia Halascy.
Centaurea iberica Trevir.
„ ovina Pall.
„ stereophylla Bess.
„ Stříbrnyi Velen.
Cerastium banaticum Kit.
Chaerophyllum aureum L.
„ balcanicum Velen.
„ trichophyllum Boiss.
Chamaepeuce afra D. C.
Cirsium appendiculatum Griseb.
„ siculum Spreng.
Dianthus capitatus D. C.
„ pallens Sibth & Sm.
„ Vandasii Velen.
„ Velenovskyi Borb.
Digitalis viridiflora Lindl.
Erysimum cuspidatum M. B.
Euphorbia esuloides Velen.
„ nuda Velen.
„ virgata Waldst & Kit.
Ferulago confusa.
Heracleum ternatum Velen.
Hypericum Montbretii Spach.
Hypochoeris maculata L.
Isatis praecox Kit.
Lavatera thuringiaca L.
var. bulgarica Velen.
Linaria dalmatica Mill.
var. grandiflora.
Nonnea atra D. C.
Onobrychis gracilis Bess.
Opopanax orientale Boiss.
Pastinaca hirsuta Panč.
Peucedanum macedonicum Janka.
Salvia nutans L.
„ virgata Ait.
Scabiosa hispidula Boiss.
„ ochroleuca L.
var. rhodopea Velen.
Scabiosa ucranica L.
Silene juvenalis Delile.
„ Škorpili Velen.

Tragopogon rumelicum Velen.
Verbascum orientale Frivald.

B. Culta.

Curcubita Pepo.
a) Lutea, maxima, edulis.
b) vulgaris, alba, edulis.
c) alba.
d) nigra.

Cucamis Melo.
„ citrullus.
a) Minimus, dulcissimus.
b) vulgaris.
c) praecox.
d) rossicus.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus esculentus L.
Sesamum indicum L.
Solanum Melongena L.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Aconium polychrysum.
Aloë arborea Medic.
„ distans Haw.
„ punctata Martinati.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb.
Beaucarnea tuberculata.
Begonia discolor Ait.
„ nelumbiifolia Cham & Schlecht.
„ semperflorens Link & Otto var. rosea.
Brachychiton Horsfeldii Soland.
Coleus Blumei Benth.
„ Persooni Benth.
Convallaria japonica L.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia coralina Hort.
„ gracilis Lindl.
Dyckia sulphurea C. Koch.
Elodea canadensis Michx.
Elodea densa Car.
Euonymus japonicus L. v. macrophyllus fol. var.
Gasteria scaberrima.
Lippia filiformis Schrad.
Libonia floribunda C. Koch.
Lavandula vera D. C.
Lemna minor L.
„ trisulca L.

Mesembryanthemum aureum L.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ crassicaule Haw.
„ crassulinum Spreng.
„ echinatum Lam.
„ Ecklonis Sahn-Dyck.
„ formosum Haw.
„ glaucum L.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl Zeyh.
„ spectabile Haw.
„ subincanum Haw.
„ tumidulum Haw.
„ violaceum D. C.
Mikania Guaco Humb et Bonpl.
Nephrolepsis bostoniensis Hort.
„ elegantissima Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Pentstemon gentianoides Poir.
Pilea muscosa Lindl.

Peperomia metallica Lindl & Rod.
Palisota Barteri Hook.
Polypodium Lingua.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Plectranthus fruticosus..
Sansevieria carnea Andr.
„ zeylanica Willd.
Santolina incana Lam.
Saxifraga sarmentosa L.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ grandis Moore.
„ Martensii Spring.
Sempervivum barbatum L.
„ balsamiferum Webb & Berth.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Tupistra squalidar Ker Gawl.
Veronica Traversii Hook.
Zingiber Zerumbet Rosc.
Sedum Stahli.
Streptocarpus hybr. Goliath Hook.

Filices.

Hemionitis palmata L

Tábor in Bohemia, 1. die m. Januarii 1910.

PhC. **Ad. Kutín,**
horti botanici assistens.

Prof. Dr. **Fr. Bubák,**
horti botanici moderator.

Fr. Hofman,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

Frank, Tábor.

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

QK73 .T32 T33

V.

Delectus seminum plantarum

anno 1910 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L.

Cyperaceae.

Carex adusta Hoock.
„ arenaria L.
„ atrata L.
„ canescens L.
„ caucasica Stev.
„ cephalophora Muhl.
„ contigua Hoppe.
„ curvata Knaf.
„ cyperoides L.
„ echinata Murr.
„ elongata L.
„ extensa Good.
„ dioica L.
„ distans L.
„ divulsa Good.
„ festiva Dewey.
„ folliculata L.
„ frigida All.
„ glauca Murr.
„ Halleriana Asso.
„ hordeistichos Vill.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ irrigua Sm.
„ japonica Thunb.
„ lamprocarpa Čel.
Carex leporina L.
„ Linkii Willd.
„ mirabilis Host.
„ multiflora Wahlenbg.
„ nardifolia Wahlenbg.
„ nubigena D. Don.
„ Oederi Ehrh.
„ pallescens L.
„ panicea L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ praecox Jacq.
„ Pseudo-cyperus L.
„ pulicaris L.
„ remota L.
„ riparia Curt.
„ rosea Schkuhr.
„ Schreberi Schrank.
„ secalina Wahlenbg.
„ sempervirens Willd.
„ Shortiana Dewey & Torr.
„ silvatica Huds.
„ sparganioides Muhl.
„ teretiuscula Good.
„ variabilis L. H. Bailey.
„ vesicaria L.
„ vulpinoidea Michx.
Cyperus flavescens L.
„ fuscus L.
„ Paramatta Ball.
Eriophorum alpinum L.

Scirpus Holoschoenus L.
„ lacustris L.
„ palustris L.
„ uniglumis Link.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch. var. aristata.
„ „ „ „ inermis.
„ fatua L.
„ nuda L. var. inermis.
„ „ „ „ aristata (Bohemia).
„ „ „ „ „ (Germania).

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ obtusata All. alba (Hungaria).
3. „ a) pugnax Al.
   b) „ „ (Polend).
4. „ a) tatarica (Germania).
   b) „ (Rossia).
   c) „ (Selchov).
5. „ a) tristis Al. (Hungaria).
   b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke (Bourbon).
   b) „ „ (Osetia, Caucasus).
   c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ a) montana Alef.
   b) „ „ (Brauner begrannter).
7. „ mutica Alef.
   a) Anglia.
   b) arenaria.
   c) Barnstaedt.
   d) Belgium.
   e) Caucasus.
   f) Fennia.
   g) Hirsch.
   h) Landa's Grün-Hafer.
   i) Lapponia.
   j) Leutewitz.
   k) Ligowo.
   l) Oderbuch.
   m) Podolia.
   n) Polonia.
   o) Probstei.
   p) Romania.
   r) Silesia.
   s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
   b) „ „ (Fennia).
   c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langethal (Australia).
   b) „ Langethal (Germania).
   c) „ Langethal (Scotia).
   d) „ Langethal (Willkommen).
10. „ a) setosa Kcke.
    b) „ „ (Brauner borstiger).
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
    b) „ Schübler, inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
   a) Altona.
   b) Dania.
   c) Imperial.
   d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.

Hordeum distichum L.

7. „ nutans Schübl.
 a) Bavaria.
 b) Bestehorn.
 c) Chevalieri.
 d) Chile.
 e) giganteum.
 f) Hierosolyma.
 g) Landa's Porter.
 h) Melonen Gerste.
 i) Philadelphia.
 j) Phoenix.
 k) Probstei.
 l) Nolč's Imperial Typ A.
 m) „ „ „ B.
 n) „ „ „ C.
 o) „ Bohemia Gerste.
 p) „ böhmische früheste.
8. „ spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
 b) „ „ himalayense).
 c) „ „ (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
 b) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
 a) Italia.
 b) Marocco.
 c) Mandschuria.
 d) Norvegia.
 e) Peru.
 f) Rimpaui.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
 b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke. (florentinum).
 b) „ Kcke. (oryzoides).
5. var. leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
 b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂

a) album, aristatum, tectum, distichum.
b) album, furcatum, nudum, distichum.
c) album, furcatum, hexastichum, tectum.
d) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
e) nigrum, aristatum, hexastichum.

Cecale cereale L.

a) Brandeburg.
b) giganteum.

Secale cereale L.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.
1. var. clavatum Alef.
2. „ creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen)
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.
1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ Bauhini Alef. (Roter samtiger).
4. „ brunneum Alef.
5. „ campylodon Kcke.
6. „ cladurum Alef.
7. „ farrum Bayle.
8. „ Fuchsii Kcke.
9. „ Krausei Alef.
10. „ liguliforme Kcke.
11. „ macrantherum Kcke.
12. „ pycnurum Alef.
13. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
14. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.
a) Blé de Medeah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.
1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. var. campylodon Kcke. (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelan Alef. (Ohio)).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.
1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.
1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause (Hispania).
4. „ chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
b) velutinum (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.
1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.
a) Běloturka (guber. Saratow.)

Triticum turgidum L.
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.
1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).
4. „ megapolitanum Kcke.
5. „ pseudocervinum Kcke.

Triticum vulgare L.
1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl.
a) Chrestenseni.
b) Victoria.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ a) caesium Alef.
b) caesium Alef. (Blauer Sommer).
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
a) aristatum.
b) Petali.
c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
a) Hunderttägig.
b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ a) Hostianum Clem.
b) Hostinum Clem. (Weisser Sammtiger Gramen).
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).
13. „ muticum Bayle.
a) Australia.
b) Brandenburg.
c) California.
d) Heine's W.
e) Noë's W.
f) Schlandstaedt.
g) Slané (Bohemia).
14. „ pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.
a) gigantea.
b) Sibiria.
1. var. a) aurea Kcke (Mönchhafer).
b) aurea Kcke. (Ardtii).

Hordium hexastichum L.
1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum.
b) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ Chrestenseni.

Hordeum tetrastichum L.
1. Alberti.
2. Chrestenseni.
3. Groeningense.
4. luteum.
5. Mammuth.
1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale cereale L.
1 bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna. montanum.
4. Schlanstaedt.
5. Thüringen (Imperial).
6. Hyperbel.
7. Louisenhof-Square-head.
8. Montagner R.
9. Champagner R.
10. Dania.
11. Helsingfors.
12. Rossia.
13. Wechselroggen v. Zborow.
14. Zeelander Original.
15. Prof. Heinrich- R. (novum mundi miraculum.)
16. Bestehorn's R.
17. Chrestensen's R. giganteum.
18. Chrestensen's Doppelroggen.
19. Victoria (vom Harz).
20. Riesen-Staudenroggen.
21. Bahlsen's-Elite R.
22. Bahlsen's »Ascania«.
23. Jubiläum's R.
24. Vaněk's »Mammuth« R.
25. Landa's »Hannibal« R.
26. Chrestensen's Triumph R.
27. Vaněk's Excelsior R.

Secale cereale L.
28. Vaněk's König's R.
29. Bahlsen's Imperial.
30. Trispermum.
31. Colossal-hybridum.
32. St. Joannis.
33. Altpaleschkener R.
34. Hadmersleben.
35. Bühlendorf.

Secale cereale L. × Triticum vulgare.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.

Triticum compactum Host. var sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

Triticum dicoccum Schr. var. tricoccum Schübl.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. v. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.
1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. dasyanthum.
6. erubescens aristatum.
7. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.
1. var. graecum (Korinthus).
3. „ centigrammum.
3. „ compositum (velutinum).
4. „ dinura Al. ((Helena).
5. „ jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
6. var. jodura Al. (Roter sammetiger W.)
7. „ mirabile Kcke (Ihrwetter).
8. „ mirabile Kcke. (Roter sammetiger Wunderweizen).

Triticum vulgare L.

var. alborubrum Kcke
1. Heine's Molds red prolific..
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner Kolben W.

var. aristatum Schübl.
1. Blé de Champagne.
2. Chrestensen's Goliath-W.
3. Don W.

var. cyanothrix Kcke.

var. erythrospermum Kcke.
1. Chrestensen's Square head.
2. Bestehorn's W.
3. Kis-Tur (Hungaria).
4. Horford's Michigan bronce.

var. ferrugineum Al.
1. Rimpau's W. (Germania).

var. muticum Bayle.
1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red. pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomir Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoba.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Coldene Perle.
24. Svalöf.

Tricitum vulgare L.

25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land-Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. »Nordstrand« (rubrum).
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's Nro. 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Hallet's Genealogw.
43. Spalding's prolific.
44. Browick red.
45. Blé de Bordeaux.
46. Bristol.
47. Dattelweizen (Vilmorin).
48. Lamend.
49. Bestehorn's Dividendew.
50. Annenw.
51. Kingshybrid.
52. Red King scott.
53. Red Mary gold.
54. Browick red (rubrum).
55. Teverson.
56. Cimbal's Centenar.
57. Prinz Albert.
58. Spalding v. Hundisburg.
59. Pearl red Chaff.
60. Schwedischer Stammw.
61. Regent.
62. Wittmack.
63. Cimbal's Fürst Hatzfeld.
64. Helsingfors.
65. Golden rough chaff red.
66. Besseler's Square head.
67. Schariff's Square head, Orig.
68. Heine's kurzer Square head.
69. Heine's langer Square head.
70. Kirsche's Square head.
71. Mette's Square head.
72. Strube's Square head.
73. Breustedt's langer Square h.
74. Breustedt's kurzer Square h.
75. Andebeck Square head.
76. Leutewitz Square head.
77. Brauner Square head.
78. Chrestensen's weisspelziger Square head.
79. Chrestensen's rotspelziger Square head.
80. Englischer brauner Square h.
81. v. Načeradec.
82. Bore-Svalöf.
83. Extra Svalöf Square head.
84. Original Schiriffw.
85. Landa's roter Wechselw.
86. Landa's »Gigantea«.
87. Böhmischer roter Wechselw.
88. Imperial Kolbenw.
89. Schwedischer Originalw.
90. Chrestensen's Dividendenw.
91. Bahlsen's »Gigantea«.
92. Branisch's »Gigantea«.

var. pyrothrix Al.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macrura Jaub & Spach.
„ ovata L.
„ speltoides Tsch.
„ squarrosa L.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.

Aegopogon pusillus Beauv.

Agrostis alba L. v. maior Gaud.
„ alpina Scop.
„ canina L.
„ capillaris All.
„ nebulosa Boiss & Reut.
„ Spica-venti L.
„ stolonifera L.
„ stolonifera L. var. gigantea Gaud.
„ vulgaris With.

Aira bottnica Wahlenbg.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ mollis Schreb.

Alopecurus agrestis L.
„ castellanus Bois & Reut.
„ fulvus Sm.
„ nigricans Hornem.
„ pratensis L.
Andropogon argenteus D. C.
„ Gryllus L.
„ Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
„ **ovatum Lag.**
„ Puellii Lec & Lam.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
Atropis distans Grieseb.
Avena argentea Willd.
„ bromoides Gouan.
„ desertorum Less.
„ geminiflora Kunth.
„ Ludoviciana Dur.
„ planiculmis Schrad.
„ praecox Beauv.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis. L.
„ sulcata J. Gay.
Boissiera bromoides Hochst & Steud.
Brachypodium japonicum Miq.
„ pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
„ media L.
„ minor L.
„ rufibarba Boiss.
„ virens L.
Bromus albidus Murr.
„ arduennensis Dum.
„ arvensis L.
„ brachystachys Hornem.
Bromus caprinus Kern.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ Hughi Tode.
„ inermis Leyss.
„ lanatus L.
„ laxus Reichb.
„ madritensis L.
„ macranthes Meyen.
„ marginatus Steud.
„ maximus Desf.
Bromus mollis L.
„ patulus M.-K.
„ racemosus L.
„ rubens L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ serotinus B.
„ squarrosus L.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
„ unioloides H. B. & K. Nov.
„ wolgensis Willd.
Calamagrostis arundinacea Roth.
„ epigeios Roth.
„ Halleriana D. C.
„ lanceolata Roth.
„ montana D. C.
„ Nuttaliana Steud.
Catabrosa aquatica Beauv.
Chloris barbata Swart.
„ petraea Sw.
Cinna mexicana Beauv.
Corynephorus canescens P. B.
Crypsis aculeata Ait.
„ alopecuroides Schrad.
Cynosurus cristatus L.
„ echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis altaica Bess.
„ Aschersoniana Graeb.
„ glomerata L.
„ hispanica Roth.
Dactyloctenium mucronatum Willd.
Desmazeria sicula Dum.
Diarrhena americana Beauv.
Digitaria aegyptiaca Willd.
Diplachne serotina Link.
Erharta panicea Sm.
Eleusine oligostachya Lk.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Wahl.
„ glaucifolius Mühl.
„ Hystrix L.
„ mexicanus Cav.
„ propinquus Fresen.
„ philadelphicus L.
„ sabulosus M. Bieb.
„ virginicus L.

Eragrostis capillaris Nees.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ maior Host.
„ minor Host.
„ nigra Nees.
„ pilosa P. B.
Festuca alpina L.
„ amesthystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ Beckeri Hack.
„ borealis Mert & Koch.
„ bromoides Gray.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ duriuscula Jacq.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ longiseta Heg.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ ovina L. v. glauca Schrad.
„ ovina L. v. hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičii Haenkl.
„ Pančičiana H. M. & J.
„ pannonica Wulf.
„ pectinella Delile.
„ pratensis Huds.
„ spectabilis Jam.
„ Pseudovina Hackel.
„ pulchella Schrad.
„ pumila Chaix.
Gastridium australe Beauv.
„ lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria nemoralis Uechtr & Koern.
Hierochloë borealis Roem & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
„ mollis L.
Hordeum bulbosum L.
„ crinitum Desf.
„ cylindricum Murr.
„ jubatum L.
„ maritimum With.
Hordeum murinum L.
„ secalinum Schreb.
Koeleria alpicola Gren & Godr.
„ brachystachya D. C.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ gracilis Pers.
„ glauca D. C.
„ hirsuta D. C.
„ rupicola Boiss & Reut.
„ splendens Presl.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lepturus cylindricus Trin.
„ pannonicus Kunth.
Lolium canadense Michx.
„ multiflorum Lam.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ strictum Presl.
„ temulentum L.
Melica ciliata L.
„ exasperata Roem & Schult.
„ nebrodensis Parl.
„ transsilvanica Schur.
Milium effusum L.
„ nigricans Ruiz & Pav.
„ Thomasii Duby.
Molinia coerülea Moench.
„ coerulea Moench. var. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr.
Nardurus Lachenalii Godr.
„ tenellus Fries.
Nardus stricta L.
Panicum bulbosum H. B. & K. Nov.
„ californicum Benth.
„ capillare L.
„ colonum L.
„ Crus-galli L.
„ Crus-galli L. v. maior.
„ glabrum Gaud.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ milliaceum L. var. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.

Panicum milliaceum L. var. nigrum. Kcke.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke
„ paludosum Roxb.
„ sanguinale L.
Paspalum tenellum Willd.
Pennisetum longistylum Hochst v. violaceum
Phalaris aquatica L.
„ arundinacea L.
„ arundinacea L. var. picta Hort.
„ brachystachys Link.
„ canariensis L.
„ coerulescens Desf.
„ minor Retz.
„ nodosa Murr.
„ paradoxa L.
„ truncata Guss.
Phleum alpinum L.
„ arenarium L.
„ asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ Michelii All.
„ pratense L.
„ pratense L. v. nodosum L.
„ tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Poa abyssinica Jacq
„ alpina L.
„ annua L.
„ badensis Hke.
„ bulbosa L.
„ caesia Sm.
„ compressa L.
„ firmula Host.
„ iberica Fisch Mey & Avè-Lall.
„ Jacquini Schrad.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ nemoralis L. v. rigidula.
„ nemoralis L. v. saxatilis.
„ palustris L.
„ pratensis L.
Poa pannonica Kern.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.
„ versicolor Bess.
Polypogon elongatus H. B. &K. Nov.
„ maritimus Willd.
„ monspeliensis Desf.
Schismus marginatus P. Beauv.
Sclerochloa dura P. Beauv.
Sesleria autumnalis Schultz.
„ elongata Host.
„ robusta Schott.
„ uliginosa Opiz.
Setaria germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ italica P. B. v. breviseta.
„ italica P. B. v. lobata Kcke.
„ italica P. B. v. longiseta.
„ japonica Pynaert.
„ macrostachya H. B. & K. N.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
„ vulpiseta Roem & Schult.
Sorghum halapense Pers.
Stipa Aristella L.
„ Calamagrostis Wahlenbg.
„ calatajeronensis Tineo.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
„ juncea Sibth.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
„ tortilis Desf.
„ viridula Trin.
Tricholaena grandiflora Hochst.
Trisetum distichophyllum Beauv.
„ pratense Pers.
Triticum caninum Schr.
„ glaucum Desf.
„ imbricatum.
„ violaceum Hornem.
Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L. v. Cinquantino.
„ „ „ „ japonica.

Zea mais L. v. Nanerottolo.
„ „ „ „ Sekler.

Irideae.

Gladiolus palustris Gaud.
Iris arenaria W. & K.
„ cristata Ait.
„ sibirica L.
„ versicolor L.
Sisyrinchium anceps Cav.

Juncaceae.

Juncus compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
„ glaucus Ehr.
„ lamprocarpus Ehr.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ squarrosus L.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ erecta Desv.
„ Forsteri D. C.
„ maxima D. C.
„ multiflora Lej.
„ Sieberi Tausch.
„ sudetica Presl.

Liliaceae.

Allium acuminatum Hook.
„ ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atroviolaceum Boiss.
„ atropurpureum Waldst.
„ azureum Ledeb.
„ baicalense Willd.
„ fallax Schult.
„ fistulosum L.
„ flavum L.
„ globosum Red.
Allium hymenorrhizum Ledeb.
„ Kochii Lange.
„ Ledebourianum Schult.
„ Libani Boiss.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens Sibth & Sm.
„ planifolium B. C.
„ Scorodoprasum L.
„ sphaerocephalum L.
„ stellatum Fras.
„ stipitatum Regel.
„ vineale L.
Anthericum graminifolium Willd.
„ Liliastrum L.
Bellevalia aleppica Boiss.
„ romana Sweet.
Bulbocodium vernum L.
Colchicum autumnale L.
„ Cupani Guss.
„ montanum L.
Eremurus Bungei Baker.
„ himalaicus Baker.
„ Tauricus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia ovata Spreng.
Hyacinthus amethystinus L.
„ azureus Baker.
„ ciliatus Cyrill v. aureus.
Lilium bulbiferum L.
„ canadense L.
„ croceum Chaix.
„ Martagon L.
Muscari atlanticum Boiss & Reut.
„ botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ praecox Siehe.
„ racemosum Mill.
Scilla hyacinthoides L.
Tulipa Clusiana D. C.
„ Sprengeri Baker.
Veratrum album L.
„ nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus albus L.
„ Caracu Jacq.
„ caudatus L.
„ flavus L.
„ hypochondriacus L.
„ retroflexus L.
„ sanguineus Vel.
„ silvestris Desf.
„ speciosus Sims.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Digera arvensis Forsk.

Aroideae.

Arum maculatum L.
Calla palustris L.

Asclepiadeae.

Asclepias incarnata L.
„ purpurascens L.
„ speciosa Torr.
Vincetoxicum nigrum Moench.
„ officinale Moench.

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria Tsch.
Anchusa asperrima Delile.
„ italica Retz.
„ ochroleuca Bieb.
„ officinalis L.
„ osmanica Vel.
„ paniculata Ait.
„ procera Bess.
„ sempervirens L.
„ stylosa Bieb.
Borrago caucasica Fisch.
„ officinalis L.
Cerinthe maior L.
„ minor L.
Cynoglossum cheirifolium L.
„ Columnae Bivona.
„ Heynei G. Don.
„ linifolium L.
„ officinale L.
„ viridiflorum Willd.
Echinospermum consanguineum Fisch & Mey.
„ deflexum Lehm.
Echium plantagineum L.
„ pustulatum Lehm.
„ rubrum Jacq.
„ vulgare L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum latifolium Michx.
„ officinale.
Macrotomia echinoides Boiss.
Mertensia sibirica G. Don.
Myosotis alpestris F. W. Schmidt.
„ azorica F. W. Schmidt.
„ hispida Schlechl.
„ propinqua Fisch & Mey.
Nonnea nigricans DC.
„ rosea Link.
Onosmodium carolinianum Torr.
Solenanthus mollissimus DC. & A. D. C.

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.
„ stricta Miq.
Campanula abietina Griseb & Schenk.
„ alliariaefolia Willd.
„ alpina Jacq.
„ amabilis Leichtl.
„ barbata L.
„ Baumgartenii Becker.
„ cordata Peterm.
„ latifolia L.
„ macrantha Boiss.
„ Pallasiana Roem & Schult.
„ persicifolia L.
„ primulaefolia Brot.
„ pulcherrima Schrank & Zeyh.
„ rapunculoides L.
„ sarmatica Ker-Gawl.
„ Scheuchzeri Lodd.
„ Trachelium L.
Phyteuma campanuloides M. Bieb.
„ Carestiae Biroli.

Phyteuma nigrum Lehm.
„ Scheuchzeri All.
„ spicatum L.
„ serratum Viv.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
Podanthum anthericoides Janka.
Specularia castellana Lange.
„ Liebemanniana Lg.
„ Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides Link.

Capparidaceae.

Cleome arborea A. B. & K. N.
Polanisia graveolens Rafin.

Caryophylleae.

Agrostemma coronaria L.
„ Flos-Jovis L.
„ Githago L.
Alsine graminifolia Gm.
Arenaria grandiflora L.
„ serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
„ Boissieri Gren.
„ chloraefolium Fisch & Mey.
„ dichotomum L.
„ inflatum Link.
„ pensilvanicum Hook.
„ perfoliatum L.
„ purpurascens Fenzl.
„ tomentosum L.
„ triviale Link.
Dianthus arenarius L.
„ barbatus L.
„ caesius Sm.
„ calocephalus Boiss.
„ campestris M. Bieb.
„ capitatus D. C.
„ caucasicus Bieb.
„ cinnabarinus Sprun.
„ fragrans Bieb.
„ giganteus Urv.
„ Levieri Beib.
„ liburnicus Bartl-Wendl.
„ monspessulanus L.
„ neglectus Loisel.
„ plumarius L.
Dianthus rupicolus Bivona.
„ superbus L.
„ versicolor Fisch.
„ virgineus L.
Gypsophila altissima L.
„ arenaria W. & K.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ trichotoma Wender.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis chalcedonica L.
Melandryum album Garcke.
„ macrocarpum Willk.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ silvestre Roehl.
Silene Atocion Murr.
„ catholica Ait.
„ conica L.
„ conoidea L.
„ disticha Willd.
„ fuscata Link.
„ gigantea L.
„ italica Pers.
„ longicaulis Pourr.
„ maritima With.
„ orientalis Mill.
„ pulchra Torr & Gray.
„ rubella L.
„ Schweinfurthii Rohrb.
„ sedoides Jacq.
„ sericea All.
„ Thorei Duf.
„ tincta Frivald.
„ transilvanica Schurr.
Saponaria depressa Bivona.
„ persica Boiss.
Spergula arvensis L.
„ „ „ var. maxima Weihe.
„ „ „ var. sativa.
Tunica graminea Boiss.
„ rhodopea Velen.
„ velutina Fisch & Mey.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
Viscaria alpina G. Don.
„ sinuata Poir.
„ utriculata Lam.
„ vulgaris Roehl.

Celastrineae.

Euonymus latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
Atriplex hortensis L.
„ littoralis L.
„ nummularia Lindl.
Axyris amaranthoides L.
Beta maritima L.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigyna W. K.
„ vulgaris L. v. altissima (Chotětov).
„ „ „ v. altissima (orig. Klein-Wanzleben).
„ „ „ v. altissima (verb. Klein-Wanzleben).
„ „ „ v. altissima (Meté).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Elite)
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Specialität).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's zukkerreiche).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's ertragreichste).
„ „ „ v. altissima brasiliensis.
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer rote).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer gelbe).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer weisse).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige weisse).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla (Mammut-, lange rote).
Beta vulgaris L. v. cicla (Leutewitzer runde gelbe).
„ „ „ v. cicla (Leutewitzer runde rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Flaschen lange dicke gelbe).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Flaschen lange dicke rote).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer gelbe).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Modell).
„ „ „ v. cicla rubra (Salatrübe).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ anthelminticum L.
„ auricomum Lindl.
„ Botrys L.
„ chilense Schrad.
„ cristatum F. Muell.
„ ficifolium Sm.
„ foliosum Aschers.
„ hybridum L.
„ maritimum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ virgatum Thunb.
„ Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
„ intermedium Schweig.
„ Marschalii Stev.
„ nitidum Kit.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Eochylaena tomentosa R. Br.
Halogetum monandrus C. A. Mey.
Kochia hyssopifolia Schrad.
„ scoparia Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
Obione sibirica Fisch.
Petrosimonia brachiata Bunge.

Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.
„ Soda L.
Schizotheca patula Čel.
Seidlitzia florida Bunge.
Spinacia oleracea L. var. inermis.
Spinacia oleracea L. var. spinosa.
Teloxys aristata Moq.

Cistineae.

Helianthemum alpestre Reichb.
„ apenninum Boiss.
„ chamaecistus Mill.
„ grandiflorum D. C.
„ lavandulaefolium Mill.
„ montanum Vis.
„ pilosum Mill.
„ roseum Mill.
„ sanguineum Lag.
„ variabile Spach.
„ violaceum Lange.
„ villosum Thib.

Compositae.

Achillea ligustica All.
„ magna L.
„ pectinata Willd.
„ Ptarmica L.
„ speciosa Henckel.
„ sudetica Opiz.
Achyrachaena mollis Schau.
Ageratum mexicanum Sims.
Alfredia cernua Cass.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis Aizoon Griseb.
„ arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ Bourgei Boiss & Reut.
„ cinerea Panč.
„ cotula L.
„ nobilis L.
„ parnassica Nym.
„ rigescens Willd.
„ ruthenica M. B.
„ tinctoria L.
Arnica Chamissonis Less.
„ foliosa Nutt.
„ sachaliensis A. Gray.
Aronicum carpathicum Schur.
Artemisia Mutellina S. G. Gmel.
„ sacrorum Ledeb.
Aster alpinus L.
„ brumalis Nees.
„ chinensis L.
„ horizontalis Desf.
„ humilis Fisch.
„ leucanthemus Rafin.
„ pumilus Fisch.
„ versicolor Willd.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
Bidens grandiflora Balb.
„ leucantha Willd.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum speciosissimum Ard.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Reichb.
„ grandiflora.
Carduus acanthoides L.
„ nutans L.
„ pycnocephalus L.
Carlina longifolia Rchb.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea aurea Aly. var. alabrata D. C.
„ carniolica Host.
„ calocephala Willd.
„ Cyanus L.
„ flammea D. C.
„ gigantea Sch.
„ Kotschyana Heuff.
„ macrocephala Puschk.
„ montana L.
„ orientalis L.
„ radiata M. B.
„ Scabiosa L.
„ stricta Waldst & Kit.
„ sulphurea Willd.
„ uniflora L.
Chamaemelum inodorum Viv.
„ Oreades Boiss.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ caucasicum Pers.
„ cinerariaefolium Vis.

Chrysanthemum corymbosum L.
„ Leucanthemum L.
„ macrophyllum Waldst.
„ niveum Lag.
„ segetum L.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
„ Intybus L. culta (Badische walzenförmige).
Cirsium anglicum D. C.
„ canum Bieb.
„ discolor Spreng.
„ eriophorum Scop.
„ ferox D. C.
„ heterophyllum Hill.
„ horridum Lag.
„ lanceolatum Hill.
„ oleraceum Scop.
„ pannonicum Gaud.
„ Topeineri Rgl.
Cladanthus arabicus Cass.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis lanceolata L.
Crepis biennis L.
„ blattarioides Vill.
„ grandiflora Tausch.
„ lacera Tenore.
„ pulchra L.
„ rigida Waldst & Kit.
„ tectorum L.
„ virens Vill.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Echinops bannaticus Rochel.
„ cornigerus D. C.
„ exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ niveus Wall.
„ sphaerocephalus L.
Endoptera aspera D. C.
„ Dioscoridis D. C.
Erigeron acris C. B. Clarke.
„ alpinus L. var. grandiflorus Hoppe.
„ armeriifolius Turcz.
„ aurantiacus Regel.
„ canadensis L.
„ macranthus Nutt.
Erigeron speciosus D. C.
Eupatorium aromaticum L.
„ cannabinum L.
Filago arvensis L.
„ germanica L.
Gailardia picta Sweet.
Geropogon glabrum L.
Grindelia robusta Nutt.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr & Gray.
Helichrysum monstrosum Hort.
Heliopsis laevis Pers.
„ scabra Dun.
Hieracicum amplexicaule L.
„ anthracinum D. C.
„ argutum Nutt.
„ aurantiacum L.
„ balcanum Uechtr.
„ barbatum Tausch.
„ bohemicum Fries.
„ Bornmüelleri Freyn.
„ cerinthoides Sm.
„ collinum Willd.
„ cottianum Arv.
„ cretense B. H.
„ crinitum Sibth & Sm.
„ crocatum Bunge.
„ cymosum L.
„ decipiens Monn.
„ dovrense Fries.
„ foliosum W. K.
„ glaucum All.
„ gymnocephalum Griseb.
„ intybaceum Jacq.
„ longifolium Hornem.
„ murorum L.
„ pallidum Biv.
„ pannosum Boiss.
„ praealtum Gochm.
„ prenanthoides Vill.
„ pumilum Jacq.
„ reticulatum Lindeb.
„ rupicum All.
„ saxatile Rchb.
„ strictum Fr.
„ tridentatum Fries.
„ villosum L.
Hypochoeris glabra L.
„ radicata L.

Inula Conyza D. C.
„ Helenium L.
„ macrocephala Boiss & Kotschy..
„ salicifolia Gueldenst.
Jurinea spectabilis Fisch & Mey.
Lactura angustana L.
„ sativa L. var. capitata.
„ sativa L. var. capitata dura.
„ Scariola L.
„ virosa L.
Lappa edulis Sieb.
„ Kotschyi Hort.
„ maior Gaertn.
„ minor Hill.
„ nemorosa Koern.
„ tomentosa Link.
Lapsana communis L.
„ grandiflora Bieb.
Leontodon alpinus Vill.
„ caucasicus Fisch.
„ incanus Schrank.
„ proteiformis Vill.
„ pyrenaicus Gouan.
„ squamosus Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
„ „ „ v. himalayanum D. C.
Leucanthemum maximum D. C.
Ligularia macrophylla D. C.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
Microlonchus salmanticus D. C.
Onopordon Acanthium L.
„ heteracanthum C. A. Mey.
„ tauricum Willd.
Picris hieracioides L.
„ laciniata Vis.
„ stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes alba L.
Ptarmica speciosa D. C.
Pyrethrum carneum M. B.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
„ Tchihatchewii Hort.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhaponticum cynaroides Less.
Rudbeckia californica A. Gray.
„ maxima Nutt.
„ moschata Lodd.
„ superba Hort.
Scorzonera angustifolia L.
„ cana O. Hoffm.
„ hispanica L.
„ tuberosa Pall.
„ villosa Scop.
Senecio alpestris D. C.
„ aquaticus Hill.
„ elegans L. v. nana Hort.
„ Fuchsii C. C .Gmel.
„ Jacobaea L.
„ nemorensis L.
„ vernalis Waldst. & Kit.
„ vulgaris L.
Serratula gigantea Desf.
„ radiata M. B.
„ rhapontica D. C.
„ tinctoria L.
Solidago alpestris W. K.
„ sparsiflora A. Gray.
„ Virgaurea L.
Sonchus asper All.
„ laevis All.
„ palustris L.
Tagetes patula L.
„ patula L. v. nana fl. pl.
„ signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum erythrospermum Andrz.
Telekia speciosa Baumg.
Tragopogon brevirostris D. C.
„ longirostris Bischoff.
„ maior Jacq.
„ pusillus Bieb.
„ Tommasinii Sch.
Troximon grandiflorum A. Gray.
Tussilago Farfara L.
„ Kablikiana Čel.
Urospermum picroides F. M. Schmidt.
Ursinia speciosa D. C.
Xanthium Strumarium L.
Xanthocephalum gymnospermoides Benth & Hook.
Xeranthemum annuum L.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet.
Convolvulus libanoticus Boiss.
„ Scammonia L.
„ undulatus Cav.
Cuscuta lupuliformis Krock (Salix amygdalina).
„ maior D. C. (Urtica dioica, Humulus lupulus).
Ipomoea hederacea Jacq.
„ palmata Forsk.
„ purpurea Roth.
„ versicolor Meisn.
Jacquemontia montana Meisn.
„ violacea Choisy.
Nolana prostrata L.
Pharbitis hispida Choisy.

Crassulaceae.

Sedum atropurpureum Turcz.
„ aureum Wirgt.
„ Cepaea L.
„ collinum Willd.
„ dasyphyllum L.
„ latifolium Bertol.
„ laxiflorum D. C.
„ purpurascens Koch.
„ Rhodiola D. C.
„ rupestre L.
Sempervivum arachnoideum L.
„ californicum Hort.
„ patens Griseb & Schenk.
„ pumilum Bieb.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
„ saxatile R. Br.
Alyssum Arduini Fritsch.
„ argenteum Vitm.
„ calycinum L.
„ desertorum Stapf.
„ incanum L.
„ orientale Ard.
„ repens Baumg.
„ saxatile L.
„ Střibrnyi Velen.
„ Wulfenianum Willd.

Arabis alpina L.
„ blepharophylla Hook & Arn.
„ caucasica Willd.
„ Gerardi Bess.
„ Hornungiana Schur.
„ japonica Rgl.
„ muralis Bertol.
„ pendula L.
„ pumila Jacq.
„ rosea D. C.
„ stricta Huds.
„ suecica Fries.
„ Turrita L.

Aubrietia Columnae Guss.
„ graeca Griseb.

Barbarea bracteosa Guss.

Biscutella apula L.
„ cichoriifolia Loisel.
„ ciliata D. C.
„ erigerifolia D. C.
„ raphanifolia Poir.

Brassica japonica Sieb.
„ laevigata Lag.
„ Napus L. v. oleifera biennis.
1) Biewitz.
2) Böhmen.
3) Holland.
4. Holstein.
5) humilis.
6) Kanada.
7) Schweden.
8) Uckermarck.

Brassica rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1) Awehl.
2) Holstein.
3) Schweden.
4) Thüringen.
5) Uckermarck.

Brassica oleracea L. v. acephala crispa.

Braya supina Koch.

Bunias orientalis L.

Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ sativa Grantz.

Capsella bursa pastoris Moench.

Cardamine chenopodifolia Pers.
„ impatiens L.
Cardaria Draba Desv.
Carpoceras sibiricum Link.
Cheiranthus mutabilis L' Herit.
„ Senoneri Held.
Chorispermum hyssopifolium L.
Cochlearia anglica L.
„ officinalis L.
Conringia clavata Boiss.
„ orientalis Dum.
Crambe hispanica L.
„ maritima L.
Descurainia tanacetifolia Prantl.
Diplotaxis muralis D. C.
Draba borealis D. C.
„ bronchialis D. C.
„ incana L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Reichb.
„ Pollichii Schimp. & Spenn.
Erysimum angustifolium Rb.
„ cheiranthoides L.
„ cheiriflorum Wallr.
„ cuspidatum D. C.
„ repandum L.
„ strictum Nett.
Goldbachia laevigata D. C.
Heliophila amplexicaulis L.
„ crithmifolia Willd.
„ pilosa Lam.
Hesperis sibirica L.
Iberis amara L.
„ Lagascana D. C.
„ odorata Boiss.
Isatis alpina All.
„ canescens D. C.
„ littoralis Bess.
„ lusitanica Brot.
„ tinctoria L.
Lepidium sativum L.
„ stylatum Lag. & Rodr.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia africana Ait.
Mathiola bicornis D. C.
Moricandia hesperidiflora D. C.
Neslia paniculata Desf.
Notoceras canariense R. Br.
Ochtodium aegyptiacum D. C.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer Hort.
„ raphanistrum L.
„ sativus L.
„ „ v. niger D. C. rotundus annuus.
„ „ v. hiemalis.
„ „ v. hiemalis (Erfurt).
„ „ v. hiemalis oleiferus L.
Rapistrum perenne All.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. v. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ juncea L.
„ nigra L.
Sisymbrium hirsutum Lag.
„ persicum Schrad.
„ strictissimum L.
Syrenia angustifolia Reichb.
Thlaspi arvense L.
„ bellidifolium Griseb.
„ ceratocarpum Murz.
„ Huetii Boiss.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Cyclanthera pedata Schrad.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.
Dipsacus atratus Hook.
„ fullonum L.
„ silvestris Mill.
Scabiosa amoena Jacq.
„ balcanica Velen.
„ banatica Waldst. & Kit.
„ caucasica M. B.
„ holosericea Bertol.
„ prolifera L.
„ stellata L.

Scabiosa triniaefolia Frivald.
„ ucranica L.

Ericaceae.

Erica Tetralix L.
Rhododendron ferrugineum L.
„ hirsutum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia exigua L.
„ falcata L.
„ graeca Boiss & Sprunn.
„ Ipecacuanha L.
„ Myrsinites L.
„ oblongata Griseb.
„ Peplus L.
„ platyphylla L.
„ pterococca Brot.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
„ asclepiadea L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L' Hérit.
„ gruinum Ait.
Geranium albanum Bieb.
„ albiflorum Ledeb.
„ collinum Steph.
„ dissectum L.
„ ibericum Cav.
„ molle L.
„ nepalense Sweet.
„ platypetalum Fisch & Mey.
„ pusillum L.
„ sanguineum L.
„ silvaticum L.
„ Wallichianum D. Don.
Impatiens cristata Wall.
„ tricornis Lindl.
Oxalis corniculata L.

Globulariaceae.

Globularia trichosantha Fisch & Mey

Hydrophylleae.

Cosmanthus viscidus A. D. C.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia bipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.
„ viscida Torr.
Whitlavia grandiflora Harv.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ chinense L.
„ hircinum Poir.
„ humifusum L.
„ perforatum L.
„ pyramidatum Ait.
„ quadrangulum L.
„ rumelicum Boiss.

Illebraceae.

Scleranthus annuus.
„ perennis L.

Labiatae.

Ballota hispanica Benth.
„ nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Willd.
„ hirsuta L.
„ officinalis L.
Calamintha Acinos Clairo.
„ Clinopodium Spenn.
Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
„ nutans L.
„ peregrinum L.
„ thymiflorum L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ Tetrahit L.
Cardoquia betonicoides Lindl.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica F. M.
Leonurus sibiricus L.
„ villosus Desf.
Marrubium candidissimum L.
„ leonuroides Desr.
„ vulgare L.

Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
„ gentilis Sm.
„ hortensis Wirtg. v. viridis.
„ piperita L.
„ suavis Guss.
„ viridis L.
Monarda Kalmiana Pursch.
„ Russeliana Nutt.
Nepeta latifolia D. C.
„ Mussini Spreng.
„ nuda L.
„ racemosa Lam.
Origanum pulchrum Boiss & Heldr.
„ smyrnaeum L.
„ vulgare L.
Orthosiphon stamineus Benth.
Phlomis alpina Poll.
„ armeniaca Willd.
„ tuberosa L.
Prunella australasica Moric.
„ elongata Dougl.
„ grandiflora Jacq.
„ incisa Link.
„ laciniata L.
„ Webbiana Loud.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh.
Salvia acaulis L.
„ albo coerulea Linden.
„ austriaca Jacq.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.
„ glutinosa L.
„ hians Royle.
„ Horminum L.
„ lanceolata Brouss.
„ mellifera Greene.
„ nilotica Murr.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ pratensis L.
„ Przewalskii Maxim.
„ ringens Siebth & Sm.
„ Sclarea L.
„ Sibthorpii Sibth.
„ silvestris L.
Satureia hortensis L.
„ marifolia Caruel.
„ montana L.
Scutellaria albida L.
„ altissima L.
„ baicalensis Georgi.
„ commutata Guss.
„ macrantha Fisch.
„ minor Huds.
„ orientalis L.
„ splendens Link.
„ versicolor Nutt.
Sideritis hirsuta L.
„ hyssopifolia L.
„ scordioides L.
„ syriaca L.
Stachys alpina L.
„ annua L.
„ arenaria Vahl.
„ arvensis L.
„ germanica L.
„ heraclea All.
„ iberica Bieb.
„ inflata Benth.
„ lanata Jacq.
„ palustris L.
„ sibirica Link.
„ silvatica L.
Thymus comosus Heuff.
„ serpyllum L.
„ trassilvanicus Schur.

Leguminosae.

Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ cassubicus Jord.
„ Cicer L.
„ depressus L.
„ Glycyphyllus L.
„ illyricus Benth.
„ maximus Willd.
„ purpureus Lam.
„ sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
Cicer arietinum L. v. nigrum.
Cicer arieticum L. v. rotundum.
Coronilla vaginalis Lamk.
„ varia L.
Cytisus austriacus L.
„ capitatus Jacq.
„ hirsutus L.

Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
„ tuberosus Lam.
Ervum abessinicum Hort.
„ Ervilia L.
„ Tenorii Steud.
Galega bicolor Boiss & Hauesk.
„ officinalis L.
Genista ovata Waldst, & Kit.
„ sagittalis L.
Hedysarum altaicum Fisch.
„ coronarium L.
„ obscurum L.
Hymenocarpus circinatus Savi.
„ radiatus Link.
Lathyrus alatus Tenore.
„ Aphaca L.
„ articulatus L.
„ Cicera L.
„ cirrhosus Ser.
„ Clymenum L.
„ coccineus All.
„ Gorgoni Parl.
„ heterophyllus L.
„ hirsutus L.
„ montanus Bernh.
„ niger Bernh.
„ Nissolia L.
„ numidicus Batt.
„ Ochrus D. C.
„ odoratus L.
„ pisiformis L.
„ platyphyllus Retz.
„ pratensis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ tingitanus L.
„ tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus corniculatus L.
„ edulis L.
Lotus Jacobaeus L.
„ tenuifolius Presl.
„ uliginosus Schk.
Lupinus affinis Agardh.
„ albus L.
„ angustifolius L.
„ angustifolius L. var. albus.
„ Cruckshauskii Hook.
„ cryptanthus Schult.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ Hilarianus Benth.
„ hirsutus L.
„ linifolius Roth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ reticulatus Desr.
„ sulphureus Dougl.
„ Termis Forsk.
Medicago apiculata Willd.
„ arabica L.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ Helix Willd.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ scutellata All.
„ Terebellum Willd.
Melilotus altissima Thuill.
„ coerulea Auct.
„ elegans Salzm.
„ segetalis Ser.
„ suaveolens Ledeb.
„ sulcata Desf.
Onobrychis arenaria D. C.
„ Caput-Galli Lam.
„ Crista-Galli Lam.
„ petraea Desv.
„ sativa Lam.
Ononis hircina Jacq.
„ spinosa L.
Ornithopus compressus L.
„ perpusillus L.
„ sativus L.

Orobus niger L.
„ vernus L.
Phaseolus cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. var. carneus.
„ lunatus L. var. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L.
„ „ „ var. communis.
„ „ „ var. gonospermus Savi.
„ „ „ var. nanus L.
„ „ „ „ oblongus Savi.
„ „ „ „ tuberosus.
Pisum arvense L.
„ quadratum Mill.
„ sativum L.
„ „ „ var. Concentator L.
„ „ „ „ Dickson's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
Sesbania aculeata Poir.
Soja hispida Moench var. nigra.
Tetragonolobus purpureus Moench.
„ Requienii Fisch & Mey.
„ siliquosus Roth.
Trifolium agrarium Poll.
„ alexandrinum L.
„ arvense L.
„ elegans Savi.
„ glomeratum L.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
Trifolium olympicum Hornem.
„ pannonicum L.
„ parviflorum Ehrenb.
„ pratense L.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ rubens L.
„ spadiceum L.
„ striatum L.
Trigonella calliceras Fisch.
„ corniculata L.
„ cretica Boiss.
„ Foenum graecum L.
„ monspeliaca L.
Vicia americana Muhl.
„ amphicarpa Dorthes.
„ angustifolia Roth.
„ Bivonea Rafin.
„ calcarata Desf.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ cornigera Chaub.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ dumetorum L.
„ Faba L. var. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ gracilis Loisel.
„ grandiflora Scop.
„ „ „ var. Kitaibeliana.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ Loweana Steud.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii M. Bieb.
„ Narbonensis L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta F. a M.
„ pisiformis L.
„ sativa L.
„ „ „ dalecarliensis.
„ „ „ dura.
„ „ „ leucosperma.
„ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.

Vicia sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. Bieb.
„ tetrasperma Moench.
„ unijuga A. B.
„ varia Host.
„ villosa Rotr.
Vigna glabra Savi.
„ retusa Valp.

Linaceae.

Linum americanum L. var. album.
„ arboreum L.
„ asiaticum Mart.
„ austriacum L.
„ corymbiferum Desf.
„ grandiflorum Desf.
„ humile L.
„ Mülleri Moris.
„ nervosum W. & K.
„ perenne L.
„ regale Kunth.
„ sibiricum D. C.
„ striatum Wall.
„ usitatissimum L.
1. crepitans.
2. hibernum.
3. hungaricum.
„ usitatissimum L. (Pirna).
„ „ „ (Pskoff).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Gelbsamiger).
„ venosum W. & K.

Lythrarieae.

Lythrum flexuosum Lag.

Malvaceae.

Althaea apterocarpa Fenzl.
„ Froloviana Fisch.
„ officinalis L.
Anoda acerifolia Cav.
Hibiscus Trionum L.
„ vesicarius Cav.
Lavatera phoenicea Vent.
„ thuringiaca L.
Malachra alceaefolia Jacq.
„ radiata L.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
„ trifida Cav.
Malva aegyptia L.
„ brasiliensis Desr.
„ Durieui Spach.
„ gangetica L.
„ glomerata Hort.
„ maritima Lam.
„ nicaeënsis All.
„ rotundifolia Huds.
„ silvestris L.
Napaea dioica L.
Sida incarnata Spreng.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalappa L.

Onagrariaceae.

Clarkia elegans Poir.
Epilobium adnatum Griseb.
„ alsinifolium Vill.
„ angustifolium L.
„ collinum C. C. Gmel.
„ cupreum Lange.
„ Lanceolatum Sebast & Mauri.
„ microphyllum A. Rich.
„ montanum L.
„ nutans F. W. Schmidt.
„ parviflorum Schreb.
„ tetragonum L.
Godetia grandiflora Lindl.
„ rubicunda Lindl.
Kneiffia gracilis Bartl.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ cruciata Nutt.
„ Lamarkiana Ser.
„ pumila L.
„ speciosa Nutt.

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk (Vicia Faba).
„ cruenta Bertol (Lotus corniculatus).

Papaveraceae.

Bocconia japonica Hort.
Chelidonium laciniatum Mill.
„ maius L.
Corydalis glauca Pursh.
„ rosea Maxim.
Eschscholzia Douglasii Benth.
Glaucium Fischeri.
„ phoeniceum Crantz.
„ Serpieri Heldr.
Papaver apulum Tenore.
„ arenarium Bieb.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ dubium L.
„ Hookerii Baker.
„ macrostomum Boiss & Huet.
„ orientale L.
„ Rhoeas L.
„ setigerum D. C.
„ somniferum L.
„ „ „ flore pleno.
„ „ „ var. Danebrog Michx.
„ „ „ var. Haageanum Alef.
„ „ „ var. monstrosum Hort.
„ „ „ var. opiiferum.
„ „ „ var. roseum.
„ umbrosum Hort.
Roemeria refracta D. C.

Plantagineae.

Plantago alpina Vill.
„ arenaria W. & K.
„ argentea Chaix.
„ Cynops L.
„ gentianoides Sm.
„ lanceolata L.
„ maior L.
„ maritima L.
„ maxima Jacq.
„ media L.
„ montana Lam.
„ Psyllium L.
„ saxatilis M. Bieb.
Plantago serpentina Vill.
„ stricta Schousb.

Plumbagineae.

Armeria alpina Willd.
„ boetica Boiss.
„ cassubica Boiss.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ allioides Boiss.
„ plantaginea Willd.
„ splendens Boiss.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
„ heterophylla Hook.
Gilia grandiflora A. Gray.
„ parviflora Spr.
„ tenuiflora Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
„ grandiflorum Benth.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Polygonum aviculare L.
„ Bistorta L.
„ Fagopyrum L.
„ „ „ argenteum.
„ „ „ emarginatum.
„ japonicum Hort.
„ lapathifolium L.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ rotundatum Bab.
„ tataricum Gaertn.
„ „ „ var. secalinum.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.

Rumex Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ alpinus L.
„ altissimus Wood.
„ crispus L.
„ domesticus Hartm.
„ Hydrolapathum Huds.
„ nivalis Hegetsch.
„ obtusifolius L.
„ Patientia L.
„ pulcher L.
„ sanguineus L.
„ stenophyllus Ledeb.
„ salicifolius Weinm.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schrch.
Androsace elongata L.
„ lactiflora Hort.
„ maxima L.
Lysimachia japonica Thunb.
„ punctata L.
„ quadrifolia L.
Primula deorum Velen.
„ flagellicaulis Kern.
„ leucophylla Pax.
„ Paxii W.
„ media Peterm.
„ officinalis Jacq.
„ suaveolens Bertol.

Ranunculaceae.

Aconitum lycoctonum L.
„ Stoerkianum Reichb.
„ variegatum.
Adonis flammea Jacq.
Anemone borealis Richards.
„ Bungeana Pritz.
„ decapetala Ard.
„ Hudsoniana Richards.
„ narcissiflora L.
„ pennsilvanica L.
„ silvestris L.
„ virginiana L.
Aquilegia advena Regel.
„ atrata Koch.
„ atropurpurea Willd.
„ aurea Janka.
„ Bauhini Schatt.
Aquilegia blanda v. Houtte.
„ Buergeriana Sieb & Zucc.
„ californica A. Gray.
„ canadensis L.
„ caryophylloides L.
„ coerulea James.
„ flabellata Sieb & Zucc.
„ flavescens S. Wats.
„ fragrans Benth.
„ Haenkeana Koch.
„ lactiflora Kar-Kir.
„ nivea Baumg.
„ olympica Boiss.
„ rhodosepala.
Clematis recta L.
Delphinium Ajacis L.
„ barbatum Bunge.
„ bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ dictyocarpum D. C.
„ elatum L.
„ exaltatum Ait.
„ fissum Waldst & Kit.
„ formosum Boiss. & Huet.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ japonicum L.
„ Maackianum Regel.
„ mesoleucum Link.
„ orientale J. Gay.
„ Przewalskii Huth.
„ Requienii D. C.
„ Skinneri.
„ tirolense Kern.
„ tricolor Benth.
Nigella aristata Siebth & Sm.
„ arvensis L.
„ corniculata D. C.
„ damascena L.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ peregrina Mill.
„ triternata Pall.
Pulsatilla vernalis Mill.
Ranunculus acris L.
„ anemonaefolius D. C.
„ Broteri Freyn.
„ brutius Tenore.
„ caucasicus Bieb.
„ chaerophyllus L.

Ranunculus cortusaefolius Willd.
„ cornutus D. C.
„ millefoliatus Vahl.
„ ophioglossifolius Willd.
„ polyanthemus L.
„ pygmaeus Wahlenb. v. kamchaticus.
„ repens L.
„ sceleratus L.
„ serbicus Vis.
„ trilobus Desf.
„ velutinus Tenore.
Thalictrum alpinum L.
„ aquilegiaefolium.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ kemense Fries.
„ lucidum L.
„ maius Jacq.
„ medium Jacq.
„ saxatile D. C.
„ sibiricum L.

Resedaceae.

Reseda fruticulosa L.
„ glauca L.
„ Jacquini Reichb.
„ lutea L.
„ Luteola L.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium L.
„ leucantha Kunze.
„ odorata Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
Geum album J. F. Gmel.
„ biflorum Brot.
„ coccineum Siebth & Sm.
„ hispidum Fries.
„ japonicum Thunbg.
„ macrophyllum Willd.
„ pallidum Fisch & Mey.
„ pyrenaicum Mill.
„ rivale L.
„ rubellum Fisch & Mey.
„ triflorum Presl.
„ urbanum L.
Potentilla adscharica Sommier & Levier.
Potentilla alpestris L.
„ andicola Benth.
„ atrosanguinea Sixta.
„ calabra Tenore.
„ elegans Schlecht.
„ formosa D. Don.
„ geoides Bieb.
„ Hookeriana Lehm.
„ maculata Fries.
„ montenegrina Pantoč.
„ nivea L.
„ pimpinelloides L.
„ pulcherrima Lehm.
„ ranunculoides H. & B.
„ recta L.
„ rupestris L.
„ salisburgensis Haenke.
„ sericea L.
„ viscosa Donn.
„ Wrangeliana Fisch & Avè-Lall.
„ tanacetifolia Willd.
„ taurica Willd.
Poterium agrimonifolium Cav.
„ Magnolii Spach.
„ microphyllum Jord.
„ Sanguisorba L.
„ spinosum L.
Sanguisorba alpina Bunge.
„ carnea Fisch.
Sibbaldia cuneata Hornem.
Sorbus Hostii Heynh.
Spiraea filipendula L.

Rubiaceae.

Asperula hexaphylla All.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst & Kit.
„ montana Waldst & Kit.
„ odorata L.
Crucianella angustifolia L.
„ gilanica Trin.
„ graeca Boiss.
Galium album Forsk.
„ Aparine L.
„ silvaticum Lam.
„ tricorne With.
„ verum L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ruta angustifolia L.
„ chalepensis L.
„ corsica D. C.
„ divaricata Salzm.
„ graveolens Kcke.
„ montana Mill.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
„ cylindrica Dougl.
„ divaricata Fisch.
„ glabra Willd.
„ Richardsoni R. Br.
„ sanguinea Englm.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga androsacea L.
„ caespitosa L.
„ cochlearis Reichb.
„ notata Schott.
„ rhaetica A. Kern. var. purpurea.

Scrophulariaceae.

Alonsoa linifolia Roezl.
Antirrhinum maius L. v. grandiflorum.
„ Orontium L.
Chelone barbata Cav.
Digitalis ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ eriostachya Bess.
„ ferruginea L.
„ Fontanesii Steud.
„ gloxinioides Carr.
„ grandiflora Lam.
„ lutea L.
„ nervosa Steud & Hochst.
„ nevadensis K.
„ orientalis Lam.
„ purpurea L.
„ sibirica Lindl.
„ viridiflora Lindl.
Hebenstreitia alba Jacq.
„ dentata L.
„ parviflora E. Mey.
„ tenuifolia E. Mey.
Linaria albifrons Spreng.
„ alpina Mill.
Linaria anticaria Boiss & Reut.
„ aparinoides F. G. Dietr.
„ Elatine Mill.
„ litoralis Willd.
„ maroccana Hook.
„ minor Desf.
„ purpurea Mill.
„ pyrenaica D. C.
„ spuria Mill.
„ triphylla Mill.
„ vulgaris Mill.
Mimulus cupreus Regel.
Pentastemon laevigatus Ait.
„ procerus Dougl.
„ Richardsonii Dougl.
„ roseus G. Don.
Rhinanthus villosus Pers. (Triticum vulgare.)
Scrophularia mellifera Ait.
„ vernalis L.
Verbascum australe Schrad.
„ glabratum Frivald.
„ nigrum L.
„ plicatum Siebth & Sm.
„ pulverulentum Vill.
„ sinuatum L.
„ speciosum Schrad.
Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ azurea Link.
„ Beccabunga L.
„ Biebersteinii Richt.
„ caucasica M. Bieb.
„ crassifolia Wierzb.
„ excelsa Desf.
„ fruticosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ incana L.
„ maritima L.
„ officinalis L.
„ persica Hort.
„ petraea Stev.
„ polita Fries
„ Ponae Gouan.
„ praecox All.
„ pulchella Bast.
„ saxatilis Jacq.
„ saxifraga Scop.
„ spicata L.
„ spuria L.

Veronica triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura Bertolonii Parl.
„ chalybaea Koch.
„ ferox L.
„ Leichhardtii F. Muehl.
„ quercifolia H. B. & K. Nov.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyosciamus niger L.
Nicotiana affinis Hort.
„ alata L. & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ attenuata Torr.
„ Auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.
„ rustica L.
„ silvestris Speg & Comes.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.
Nicandra physaloides Gärtn.
Petunia hybrida Hort.
„ nyctaginiflora Juss.
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.
Solanum nigrum L.
„ racemiflorum Dun.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum A. Gray.
„ maius L.
„ minus L.

Umbelliferae.

Anethum graveolens L.
Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
„ officinalis Hoffm.
Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
„ maior L.
Bupleurum longifolium Falk.
„ rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Cerefolium sativum Bess.
„ silvestre Bess.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ aureum L.
„ bulbosum L.
Conium divaricatum Boiss & Orph.
„ maculatum L.
Coriandrum melphitense Tenore-Guss.
„ sativum L.
Daucus carota L.
„ „ „ v. alba.
„ hispanicus D. C.
Eryngium coeruleum Bieb.
„ eburneum Decne.
Ferula thyrsiflora Sieb & Sm.
Foeniculum dulce Mill.
„ officinale All.
Heracleum auritum Bischoff.
„ Sphondylium L.
„ „ „ v. glabrum.
„ ternatum Velen.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium hispidum M. B.
„ prutenicum L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum discolor Ledeb.
„ scoticum L.
Lophosciadium meifolium D. C.
Meum athamanticum Jacq.
„ Mutellina Gaertn.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe peucedanifolia Pollich.
Pastinaca lucida L.
„ sativa L.
„ urens Req.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum Cervaria Cusson.
„ Oreoselinum Moench.
„ verticillatum Spreng.
Pimpinella magna L.
„ Saxifraga L.

Rumia taurica Hoffm.
Scandix Pecten Veneris L.
Selinum Carvifolia L.
Seseli petraeum M. Bieb.
Sium lancifolium M. Bieb.
„ Sisarum L.
Smyrnium apiifolium Willd.
Trinia vulgaris D. C.
Zizia aurea Koch.

Urticaceae.

Cannabis gigantea Vass.
„ himalayana Hort.
„ indica Lam.
„ sativa L.
Humulus japonicus Sieb & Zucc.
Urtica dioica L.
„ Dodartii L.
„ gracilis Ait.
„ maior Kanitz.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

'edia scorpioides Dufr.
Valeriana exaltata Mikan.
Valeriana officinalis L.
Valerianella auricula.
„ coronata D. C.
„ incana Dufr.
„ plagiostephana Fisch & Mey.
„ radiata Dufr.
„ tridentata Betcke.
„ turgida Betcke.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. a K. Nov.
„ hastata L.
„ paniculata Lam.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola betonicifolia Sm.
„ bicolor Gilib.
„ dactyloides Roem & Schultz.
„ macedonica Boiss & Reut.
„ pinnata L.
„ pinnatifida All.

Semina plantarum sponte nascentium.

(Bohemia.)

Alsine verna Bartl.
Campanula rotundifolia L.
Epipactis latifolia All.
Filago germanica L.
„ minima Fr.
Galium rotundifolium L.
Helianthemum vulgare Gärtn.
Jasione montana L.
Parnassia palustris L.
Pirola rotundifolia L.
„ umbellata L.
Ramischia secundiflora Opic.
Trifolium aureum Poll.
„ minus Relhan.
Verbascum thapsus L.
Viscaria vulgaris Röhl.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Aloë arborea Medic.
„ distans Haw.
„ punctata Martinati.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb.
Beaucarnea tuberculata.
Begonia discolor Ait.
Begonia nelumbiifolia Cham & Schlecht.
„ semperflorens Link & Otto.
Brachychiton Horsfeldii Soland.
Coleus Blumei Benth.
„ Persooni Benth.
Convallaria japonica L.

Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia corallina Hort.
„ gracilis Lindl.
Dyckia sulphurea C. Koch.
Euonymus japonicus L. v. macrophyllus fol. var.
Gasteria scaberrima.
Libonia floribunda C. Koch.
Lavandula vera D. C.
Lemna mimor L.
Mesembryanthemum aureum L.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ crassicaule Haw.
„ crassulinum Spreng.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl & Zeyh.
„ spectabile Haw.
Mesembryanthemum subincanum. Haw.
„ violaceum D. C.
Mikania Guaco Humb & Bonpl.
Nephrolepis bostoniensis Hort.
„ elegantissima Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Pilea muscosa Lindl.
Peperomia metallica Lindl & Rod.
Palisota Barteri Hook.
Polypodium Lingua.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Sansevieria carnea Andr.
„ zeylanica Willd.
Santolina incana Lam.
Saxifraga sarmentosa L.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ grandis Moore.
„ Martensii Spring.
Sempervivum barbatum L.
„ balsamiferum Webb & Berth.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Tupistra squalida Ker. Gawl.
Veronica Traversii Hook.
Zingiber Zerumbet Rosc.
Sedum Stahlii.
Streptocarpus hybr. Goliath Hook.

Tábor in Bohemia, 15. die m. Januarii 1911.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

J. Svoboda,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

FRANK, TABOR.

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

QK73 .T32 T33

VI.
Delectus seminum plantarum
anno 1911 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Cyperaceae.

Carex atrata L.
„ canescens L.
„ cephalophora Muhl.
„ cyperoides L.
„ dioica L.
„ distans L.
„ disticha Huds.
„ divulsa Good.
„ echinata Murr.
„ elongata L.
„ festiva Dewey.
„ folliculata L.
„ frigida All.
„ glauca Murr.
„ hordeiformis Wahl.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ lamprocarpa Čel.
„ leporina L.
„ Linkii Willd.
„ Michelii Host.
„ multiflora Wahlenb.
„ muricata L.
„ pallescens L.
„ panicea L.
„ paniculata L.
Carex paradoxa Willd.
„ praecox Jacq.
„ Pseudo-cyperus L.
„ riparia Curt.
„ rosea Schrk.
„ secalina Wahl.
„ sempervirens Willd.
„ silvatica Huds.
„ sparganioides Muhl.
„ supina Wahl.
„ teretiuscula Good.
„ vesicaria L.
„ vulpina L.
„ vulpinoidea Michx.
Cyperus alternifolius L.
„ flavescens L.
„ fuscus L.
„ Paramatta Ball.
„ vegetus Willd.
Eriophorum alpinum L.
Scirpus Holoschoenus L.
„ palustris L.
„ uniglumis Link.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch.

Mo. Bot. Garden
1912

Avena fatua L.
„ nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ obtusata All. alba (Hungaria).
3. „ a) pugnax Al.
b) „ „ (Polend).
4. „ a) tatarica (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
5. „ a) tristis Al. (Hungaria).
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke. (Bourbon).
b) „ „ (Osetia Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ montana Alef.
7. „ mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt.
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Hirsch.
h) Landa's Grün-Hafer.
i) Lapponia.
j) Leutewitz.
k) Ligowo.
l) Oderbuch.
m) Podolia.
n) Polonia.
o) Probstei.
p) Romania.
r) Silesia.
s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
b) „ „ (Fennia).
c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langethal (Australia).
b) praegravis Langethal (Germania).
c) „ Langethal (Scotia).
d) „ Langethal (Willkommen).
10. „ setosa Kcke.
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
a) Altona.
b) Dania.
c) Imperial.
d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
a) Bavaria.
b) Bestehorn.
c) Chevalieri.
d) Chile.
e) giganteum.
f) Hierosolyma.
g) Landa's Porter.
h) Melonen Gerste.
i) Philadalphia.
j) Phoenix.
k) Probstei.
l) Nolč's Imperial Typ A.
m) „ „ „ B.
n) „ „ „ C.
o) „ Bohemia Gerste.
p) „ böhmische frühe ste.
8. „ spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
a) „ „ (himalayense).

Hordeum hexastichum L.
c) parallelum Kcke. (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
a) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.
1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
a) Italia.
b) Marocco.
c) Mandschuria.
d) Norvegia.
e) Peru.
f) Rimpaui.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).
b) „ Kcke (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.
a) album, furcatum, nudum, distichum.
b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.
a) Brandeburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.
1. var. clavatum Alef.
2. „ a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
b) creticum Mazz. (Palermo).
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.
1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ Bauhini Alef. (Roter sammtiger).
4. „ brunneum Alef.

Triticum dicoccum Schrk.
5. var. campylodon Kcke.
6. „ cladurum Alef.
7. „ farrum Bayle.
8. „ Fuchsii Kcke.
9. „ Krausei Alef.
10. „ liguliforme Kcke.
11. „ macrantherum Kcke.
12. „ pycnurum Alef.
13. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
14. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.
a) Blé de Medéah /Vilmorin).
a) Blé de Medéah (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.
1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke. (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelan Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Tricitum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.
1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.
1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. var. chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.
1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.
a) Běloturka (gub. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.
1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.
1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestenseni.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ caesium Alef.
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
a) aristatum.
b) Petali.
c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
a) Hunderttägig.
b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ Hostianum Clem.
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).

Triticum vulgare L.
13. var. muticum Bayle.
 a) Australia.
 b) California.
 c) Heine's W.
 d) Noë's W.
 e) Schlandstaedt.
 f) Slané (Bohemia).
14. „ pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.
 a) gigentea.
 b) Sibiria.
1. var. a) aurea Kcke. (Mönchhafer).
 b) aurea Kcke. (Ardtii).
2. „ grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum hexastichum L.
1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum (ertragreichste).
 b) giganteum Chrestenseni (verbesserte).
 c) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ luteum.
4. „ nigrum.

Hordeum tetrastichum L.
 a) Alberti.
 b) Chrestenseni.
 c) Groeningense.
 d) luteum.
 e) Mammuth.
1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.
1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
15. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's- R.
18. Chrestensen's-R. giganteum.
19. Chrestensen's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harz).
21. Riesen-Staudenroggen.
22. Landa's Hannibal R.
23. Colossal- hybridum.
24. Buhlendorf.
25. Altpaleschkener R.
26. Hadmersleben.
27. Trispermum.
28. Wasa.
29. St. Johannis.
30. Nyland.
31. Schlaraffen-Roggen.
32. Zeelander Original.
33. Hungaria.
34. Mährischer Stauden-R.
35. Mumien-R.
36. Bric.
37. Petkuss.
38. Rügenscher R.
39. Hessischer Garde du Corps.
40. Correns Stauden-R.
41. Hispanicum.
42. Suecicum.
43. Banaticum.
44. Schlanstaedt, giganteum.
45. Champagner Stauden-R.
46. Alpinum.
47. März.
48. Romanum.
49. Montagner Degenerirter Riesen R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.

Triticum compactum Host. var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

„ dicoccum Schr. var. nigrum (Amidonnier).

„ dioccum Schr. var. tricoccum Schübl.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Tristicum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. coeruleum Al. (Kolben W.).
6. erubescens aristatum.
7. rubrum.
8. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. var. centigrammum.
2. „ compositum (velutinum).
3. „ „ (Mirakel).
4. „ dinura Al. (Helena).
5. „ gentile Al. (Blé poulard blanc lisse on carré).
6. „ grecum (Korinthus).
7. „ jodura Al. (Blauer sammetiger W.).
   „ jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.).
   „ jodura Al. (Paines Defiance).
   „ jodura Al. (Riwet's Grannen-W.).
   „ jodura Al. (Schottischer rauher Winter W.).
7. „ melanatherum Kcke. (Petanielle noir de Nice).
8. var. mirabile Kcke. (Ihrwetter)
   „ „ „ (Schwarzer sammetiger Wunderweizen).
9. „ pseudo-cervinum Kcke.

Triticum vulgare L.

var. alborubrum Kcke.
1. Heine's Molds red prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red chaff de Dantzick.

var. aristatum Schübl.
1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square-head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Fuchs W.
12. Golden Cross.
13. Japonischer W.
14. Johnson's W.
15. Nouette de Lausanne.
16. Russischer W.
17. Schwarzer persischer W.
18. Robert's W.

var. cyanothrix Kcke.

var. erythrospermum Kcke.
1. Bestehorn's W.
2. Chrestensen's Square-head.
3. Horfords Michigan bronce.
4. Kis-Tur (Hungaria).

var. ferrugineum Al.
1. Rimpau's-W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerirter W.

var. **muticum Bayle.**
1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam Wheat.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.

Triticum vulgare L.

8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomir Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoba.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. Probsteier.
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's No. 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Spalding's prolific.
43. Browick red.
44. Bestehorn's Dividendenw.
45. Red Mary gold.
46. Browick red rubrum.
47. Schariff's Square head, Orig.
48. Besseler's Square head.
49. Kirsche's Square head.
50. Mette's Square head.
51. Strube's Square head.
52. Breustedt's kurzer Square h.
53. Anderbeck Square head.
54. Leutewitz Square head.
55. Bore-Svalöf.
56. Extra Svalöf Square head.
57. Original Schiriffw.
58. Böhmischer roter Wechselw.
59. North Allerton.
60. Johns Winter Sive.
61. Juli-W.
62. Lammas.
63. Aleph.
64. Richelle blanc de Naples.
65. Rouge inversable.
66. Hallet's red Nursery.
67. Massey.
68. Hunter's White Wheat.
69. Smogger-W.
70. R: manella.
71. Talavera.
72. Horfords Winter Perl.
73. Kaiser-W.
74. Ungarischer roter.
75. Chiddam weisser Urbst.
76. Hybridi inversable.
77. Schilf-W.
78. Amerik. Willits.
79. Preis von Oxford.
80. Urtoba.
81. Marenil.
82. Frankensteiner W.
83. De Blaic.
84. Blé Rouge de St. Laud.
85. Manhattan.
86. Victoria d'Autome.
87. Braunähriger Märkischer-W.
88. Noë.
89. Flandrischer-W.
90. White Trump.
91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
92. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
93. Cover's red. Whead.
94. Elys.
95. De Crepi.
96. Hopetoum Wheat.
97. Spalding prolific Wheat.
98. Galland.
99. Hickling's W.
100. Dattelweizen.
101. Blausamtiger Kolben W.
102. Briguet.
103. Schottischer blutroter.

Triticum vulgare L.
104. Feuton.
105. Blé Talavera de Bellevue.
106. Blanc a duvet veloute.
107. Golden Drop (verbessert).
108. Criewener W.
109. Weizen Roggen.
var. villosum Al.
1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.
var. pyrothrix Al.
1. Roter sammetiger Kolbenweizen.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macrura Jaub. & Spach.
„ ovata L.
„ speltoides Tausch.
„ squarrosa L.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.
Aegopogon geminiflorus Humb. & Boupl.
„ pusillus Beauv.
Agrostis alba L. v. maior Gaud.
„ alpina Scop.
„ canina L.
„ interrupta L.
„ Spica-venti L.
„ stolonifera L.
„ „ „ var. gigantea Gaud.
„ vulgaris With.
Aira bottnica Wahlenb.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ mollis Schreb.
Alopecurus agrestis L.
„ arundinaceus Poir.
„ castellanus Boiss & Reut.
„ geniculatus L.
„ nigricans Horn.
„ pratensis L.
Andropogon argenteus D. C.
„ Gryllus L.
„ Ischaemum L.
Anthoxanthum Carrenianum Parl.
„ odoratum L.
Antoxanthum odoratum L. v. longearistatum.
Antinoria agrostidea Parl.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
„ bulbosum Presl.
Aristida Adscensionis L.
Atropis distans Griseb.
Avellinia Michelii Parl.
Avena bromoides Gouan.
„ desertorum Less. var. basaltica Podp. loc. class.
„ geminiflora Kunth.
„ Ludoviciana Dur.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis L.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum R. & Sch.
„ japonicum Miq.
„ mucronatum Willk.
„ pinnatum P. B.
„ silvaticum Beauv.
Briza geniculata Thbg.
„ maxima L.
„ media L.
„ rufibarba Boiss.
Bromus albidus Murr.
„ arvensis L.
„ asper Murr.
„ brachystachys Horn.
„ brizaeformis Fisch. & Mey.
„ caprinus Kern.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ inermis Leyss.
„ laxus Reichb.
„ longiflorus Spreng.
„ madritensis L.
„ marginatus Steud.
„ mollis L.
„ patulus M. & K.
„ racemosus L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ serotinus Beneken.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
„ uniloides H. B. & K. N.

Calamagrostis arundinacea Roth.
„ epigeios Roth.
„ Halleriana D. C.
„ Nuttaliana Vasey.
„ lanceolata Roth.
„ montana D. C.
Catabrosa aquatica P. B.
Catapodium tuberculosum Moris.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gray.
Chloris elegans H. B. & K. N.
„ meccana Hochst.
„ polydactyla Sw.
Cinna mexicana Beauv.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens P. B.
Crypsis aculeata Ait.
„ alopecuroides Schrad.
„ schoenoides Lam.
Cynosurus cristatus L.
„ echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis altaica Bess.
„ Aschersoniana Gräb.
„ glaucescens Willd.
„ glomerata L.
„ hispanica Roth.
Digitaria aegyptiaca Willd.
„ frondescens Mey.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gärtn.
„ oligostachya Lk.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Wahl.
„ glaucifolius Mühl.
„ Hystrix L.
„ mexicanus Cav.
„ philadelphicus L.
„ sabulosus M. B.
„ virginicus L.
Eragrostis amabilis L.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ peruviana Jacq.
„ plumosa Link.
Festuca alpina L.
„ amethystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ Beckeri Hack.
Festuca borealis Mert & Koch.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ duriuscula Jacq.
„ elegans Boiss.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ indigesta Boiss.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ „ „ v. glauca Schrad.
„ „ „ v. hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičii Haenkl.
„ Pančičiana M. & J.
„ pratensis Huds.
„ psammophila Hack.
„ Pseudovina Hack.
„ pulchella Schrad.
„ rhoetica Suter.
„ rigida Kunth.
„ rubra L.
„ „ „ v. fallax.
„ „ „ „ heterophylla.
„ silvatica Vill.
„ spectabilis Jan.
„ tenuifolia D. Don.
„ vaginata W. K.
„ varia Haenke.
„ xanthina Roem. & Schult.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
„ nemoralis Uechter & Koern.
„ plicata Fries.
Hierochloë australis Roem. & Schult.
„ borealis Roem. & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus argenteus Agardh.
„ lanatus L.
„ mollis L.
„ tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
„ comosum J. & C. Presl.
„ cylindricum Murr.
„ Gussoneanum Parl.
„ jubatum L.
„ maritimum With.

Hordeum secalinum Schreb.
Ischnanthus panicoides Beauv.
Koeleria alpicola Gren. & Godr.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirsuta D. C.
„ rupicola Boiss. & Reut.
„ splendens Presl.
„ valesiaca Gaud.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lolium canadense Michx.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ rigidum Gaud.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ eligulata Boiss.
„ nebrodensis Parl.
„ nutans L.
„ penicillaris Boiss. & Bal.
„ pyramidalis Lam.
„ transsilvanica Schur.
Milium nigricans Ruiz. & Pav.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr. & Gray.
Nardurus Lachenalii Godr.
„ tenellus Fries.
Nardus stricta L.
Panicum bulbosum H. B. & K. Nov.
„ californicum Benth.
„ capillaceum Lam.
„ capillare L.
„ colonum L.
„ Crus Galli L.
„ „ „ „ v. maior.
„ esculentum A. Br.
„ frumentaceum Roxb.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ miliaceum L. v. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Kcke.
Panicum miliaceum L. v. sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke.
„ oryzoides Sw.
„ purpureum Ruiz. & Pav.
„ sanguinale L.
„ tuberculiflorum Steud.
Paspalum stoloniferum E. Desv.
„ tenellum Willd.
Pennisetum macrourum Trin.
Phalaris augusta Ness.
„ arundinacea L.
„ „ „ v. picta.
„ brachystachys Link.
„ canariensis L.
„ coerulescens Desf.
„ minor Retz.
„ nodosa L.
„ paradoxa L.
„ truncata Guss.
Phleum alpinum L.
„ asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ Michellii All.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ tenue Schrad.
Poa alpina L.
„ annua L.
„ badensis Hanke.
„ brevifolia D. C.
„ bulbosa L.
„ cenisia All.
„ compressa L.
„ firmula S. F. Gray.
„ iberica Fisch Mey & Avè-Lall.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ v. rigidula.
„ „ „ „ saxatilis.
„ nevadensis Vasey.
„ pannonica Kern.
„ palustris L.
„ pratensis L.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.

Poa versicolor Bess.
„ violacea Gaud.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus aristatus Duval-Jouve.
„ nardoides Trin.
Scleropoa memphitica Boiss.
Schismus marginatus P. Beauv.
Sclerochloa dura P. B.
Sesleria calcarea Opiz.
„ elongata Host.
„ uliginosa Opiz.
Setaria germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ „ „ „ v. breviseta.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
Sorghum halepense Pers.
„ italicum L.
„ saccharatum Pers.
„ vulgare Pers. v. Arduini Jacq.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ technicum.
„ „ „ „ usorum Nees.
Spinifex hirsutus Labill.
Stipa Aristella L.
„ Calamagrostis Wahl.
„ filiculmis Delile.
„ gigantea Lag.
„ juncea Sibth.
„ Lessingiana Trin.
„ papposa L.
„ pennata L.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
„ tortilis Desf.
„ viridula Trin.
Tricholaena atropurpurea Hort.
Trichloris Blanchardiana Hack.
Trisetum alpestre Beauv.
„ distichophyllum Beauv.
„ pratense Pers.
„ rigidum Roem.-Schult.
Tricitum caninum Schreb.
„ giganteum Roth.
„ glaucum Desf.

Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L. v. Cinquantino.
„ „ „ „ japonica.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ rubra.
„ „ „ „ translucens.

Irideae.

Anomatheca cruenta Lindl.
Crocus speciosus Bieb.
„ viridiflorus Heuff.
Gladiolus palustris Gaud.
Iris anglica Hort.
„ biglumis Wahl.
„ cristata Ait.
„ Gueldenstaedtiana Lepech.
„ ochroleuca L.
„ pumila Bivona.
„ setosa Pall.
„ sibirica L.
„ spuria L.
„ versicolor L.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
„ compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
„ Gerardi Loisel.
„ glaucus Ehrh.
„ lamprocarpus Ehrh.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ campestris D. C.
„ erecta Desv.
„ Forsteri D. C.
„ maxima D. C.
„ multiflora Lej.
„ Sieberi Tausch.
„ spadicea D. C.
„ sudetica Presl.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atroviolaceum Boiss.
„ azureum Ledeb.

Allium baicalense Willd.
„ Cepa L. Madeira.
„ fallax Schult.
„ fistulosum L.
„ flavum L.
„ hymenorrhizum Ledeb.
„ Kochii Lange.
„ Ledebourianum Schult.
„ Libani Boiss.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens L.
„ planifolium D. C.
„ Scorodoprasum L.
„ stipitatum Regel.
„ vineale L.
Anthericum Liliastrum L.
„ ramosum L.
Asphodelus albus Willd.
Bellevalia aleppica Boiss.
Colchicum autumnale L.
„ „ „ v. minor.
„ Cupani Guss.
„ montanum L.

Eremurus Bungei Baker.
„ himalaicus Baker.
„ tauricus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Hyacinthus amethystinus L.
„ azureus Baker.
„ ciliatus Cyrill v. azureus.
Lilium croceum Chaix.
„ Martagon L.
Merendera sobolifera Fisch. & Mey.
Muscari alpinum J. Gay.
„ atlanticum Boiss. & Reut.
„ botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ praecox Siehe.
„ racemosum Mill.
Ornithogalum tenuifolium Guss.
Scilla hyacinthoides L.
„ festalis Salisb. v. nutans Sm.
„ italica L.
Tulipa Sprengeri Baker.
„ suaveolens Roth.

Dicotyledoneae.

Amaranthaceae.

Amaranthus albus L.
„ atropurpureus Roxb.
„ Caracu Jacq.
„ caudatus L.
„ chlorostachys Willd.
„ esculentus Bess.
„ flavus L.
„ paniculatus L.
„ patulus Bertol.
„ retroflexus L.
„ sanguineus Vell.
„ silvestris Desf.
„ speciosus Sims.

Asclepiadeae.

Asclepias curassavica L.
„ incarnata L.
„ purpurascens L.
„ speciosa Torr.
Vincetoxicum nigrum Mönch.

Berberideae.

Podophyllum Emodi Wall.

Boragineae.

Anchusa italica Retz.
„ officinalis L.
„ osmanica Vel.
Cynoglossum bicolor Willd.
„ Columnae Biv.
„ magellense Lk.
Echinospermum consanguineum Fisch & Mey.
Echium vulgare L.
Lithospermum latifolium Michx.
„ officinale L.
Mertensia sibirica G. Don.
Myosotis alpestris F. W. Schmidt.
„ azorica. H. C. Wats.
Omphalodes scorpioides Schrank.
Solenanthus mollissimus D. C.
Symphytum tauricum Willd.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch.
„ lilifolia Ledeb.
„ stricta Miq.
Campanula abietina Griseb-Schenk.
„ alliariaefolia Willd.
„ alpina L.
„ amabilis Leichtl.
„ barbata L.
„ glomerata L.
„ latifolia L.
„ macrantha Boiss.
„ sarmatica Ker-Gawl.
„ Scheuchzeri Lodd.
„ Trachelium L.
„ vernalis L.
Phyteuma campanuloides M. B.
„ nigrum Lehm.
„ Scheuchzeri All.
„ serratum Viv.
„ spicatum L.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
Podanthum anthericoides Janka.
Specularia Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides Link.

Capparidaceae.

Cleome Eckloniana Schr.
„ graveolens Rafin.
„ muricata Schult.
„ spinosa L.
„ violacea L.

Caryophylleae.

Agrostemma Flos-Jovis L.
„ Githago L.
„ nicaeensis Pers.
Alsine saxatilis Wahlenb.
Aenaria alpina Willd.
„ boetica Salzm.
„ serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
„ pensylvanicum Hook.
„ tomentosum L.
„ triviale L.
Dianthus alpestris Sternb.
„ alpinus L.
„ arenarius L.
„ atrorubens All.
Dianthus barbatus L.
„ bicolor Bieb.
„ calocephalus Boiss.
„ capitatus D. C.
„ campestris M. B.
„ caucasicus Bieb.
„ chinensis L.
„ cinnabarinus Sprun.
„ fragrans Bieb.
„ frigidus Zucc.
„ giganteus Urv.
„ glacialis Haenke.
„ Hellwigii Borb.
„ inodorus L.
„ integer Vis.
„ Knappii Aschers.
„ liburnicus Bartl. & Ven.
„ pallens Sibth. & Sm.
„ pelviformis Heuff.
„ petraeus Walldst & Kit.
„ plumarius L.
„ pubescens Sibth. & Sm.
„ Seguierii Vill.
„ suavis Willd.
„ Vandasii Velen.
„ Velenovskyi Borb.
„ versicolor Fisch.
„ virgineus L.
Gypsophila altissima L.
„ arenaria W.-K.
„ collina Stev.
„ dichotoma Bess.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ trichotoma Wender.
Heliosperma pusillum Vis.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alpina L.
„ atropurpurea Nym.
„ chalcedonica L.
„ purpurea Wim.
Melandryum apricum Rohrb.
„ firmum Rohrb.
„ macrocarpum Villk.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ rubrum Garcke.
„ Zawadskii A. Br.
Saponaria depressa Bivona.
„ lutea L.
„ officinalis L.

Saponaria oxyodonta Boiss.
„ persica Boiss.
„ porrigens L.
Silene alpestris Jacq.
„ antirrhina L.
„ caesia Jan.
„ catholica Ait.
„ compacta Fisch.
„ Drummondii Hook.
„ gigantea L.
„ italica Pers.
„ latifolia S. F. Gray.
„ livida Willd.
„ lusitanica L.
„ nutans L.
„ paradoxa L.
„ petraea Adam.
„ Roemeri Frivald.
„ Salzmanni Otth.
„ Sendtneri Boiss.
„ syriaca Reut.
„ Thorei Duf.
„ tincta Frivald.
„ viridiflora L.
„ volgensis Spreng.
Spergula arvensis L.
„ „ „ v. maxima Weihe.
„ „ „ „ sativa.
Viscaria alpina G. Don.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L.
Axyris amaranthoides L.
Beta Bourgaei Coss.
„ maritima L.
„ orientalis Roth.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigyna W.-K.
„ vulgaris L. v. altissima.
„ „ „ v. altissima (Meté).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Elite).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Specialität).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's zuckerreiche).
Beta vulgaris L. v. altissima (Wohanka's ertragreichste).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer gelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer weisse).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla Mammutlange rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Flaschen lange dicke weisse).
„ „ „ v. cicla Erfurter Flaschen lange dicke rote).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer gelbe).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer rote).
„ „ „ v. rubra (Salatrübe).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ virgatum Thunb.
„ Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
„ intermedium Schweig.
„ Marschalli Stev.
Hablitzia thamnoides M. B.
Petrosimonia brachiata Bunge.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.
„ Soda L.
Schizotheca patula Čel.

Spinacia oleracea L. v. inermis.
" " " " spinosa.
Teloxys aristata Moq.

Cistineae.

Helianthemum alpestre Reichb.
" Chamaecistus Mill.
" croceum Pers.
" glaucum Pers.
" grandiflorum D. C.
" guttatum Mill.
" lavandulaefolium Pers.
" montanum Vis.
" mutabile Pers.
" niloticum Moench.
" obscurum Pers.
" polifolium D. C.
" pulverulentum D. C.
" roseum Mill.
" sanguineum Lag.
" variabile Spach.
" violaceum Lange.

Compositae.

Achillea ligustica All.
" magna L.
" pectinata Willd.
" Ptarmica L.
" sudetica Opiz.
" sulphurea Boiss.
Achyrachaena mollis Schau.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus offinarum Hayne.
Anthemis arvensis L.
" austriaca Jacq.
" Bourgaei Boiss. & Reut.
" Cotula L.
" nobilis L.
" parnassica Nym.
" ruthenica M. B.
" tinctoria L.
Arnica montan L.a
Aster alpinus L.
" chinensis L.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
Buphthalmum salicifolium L.
" speciosissimum Ard.
Calendula Crista Galli Viv.
" officinalis L.
Calliopsis bicolor Reichb.
Carlina longifolia Reichb.
Catananche caerulea L.
Centaurea Cyanus L.
" macrocephala Purchk.
" orientalis L.
" ovina Pall.
Chamaemelum trichophyllum Boiss.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
" caucasicum Pers.
" cinerariaefolium Vis.
" corymbosum L.
" macrophyllum W. & K.
" segetum L.
" uliginosum Pers.
Cichorium Endivia L.
" Intybus L.
" " " v. culta (Badische walzenförmige).
Cineraria alpestris Hoppe.
Cirsium ciliatum M. B.
" eriophorum Scop.
" oleraceum Scop.
" pannonicum Gaud.
" scleranthum M. Bieb.
Claranthus arabicus Cass.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Crepis blattarioides Vill.
" grandiflora Tausch.
" sibirica L.
" tectorum L.
Echinops cornigerus D. C.
" niveus Wahl.
Echinopsis exaltatus Schrad.
Eudoptera Dioscoridis D. C.
Erigeron alpinus L.
" alpinus L. v. grandiflorus Hoppe.
" armerifolius Turcz.
" aurantiacus Regel.
" macranthus Nutt.
" speciosus D. C.
" Villarsii Bell.
Eupatorium cannabinum L.
Filago Arvensis L.
" germanica L.
Gailardia picta Sweet.
Gnaphalium luteo-album L.
Helianthus annuus L.

Helianthus argyrophyllus Torr. & Gray.
„ cucumerifolius Torr. & Gray.
Helichrysum monstrosum Hort.
Heliopsis laevis Pers.
Helminthia echioides Gärtn.
Hieracium amplexicaule L.
„ anthracinum D. C.
„ argutum Nutt.
„ aurantiacum L.
„ balcanum Uechtr.
„ bohemicum Fries.
„ Bornmülleri Freyn.
„ cerinthoides Sm.
„ cottianum Arv.
„ crinitum Sibth. & Sm.
„ crocatum Fries.
„ cymosum L.
„ decipiens Monn.
„ foliosum W.-K.
„ glaucum All.
„ grandidentatum Čel.
„ graniticum Sch.
„ gymnocephalum Griseb.
„ longifolium Hornem.
„ murorum L.
„ pallidum Biv.
„ pannosum Boiss.
„ pumilum Jacq.
„ rupicum All.
„ saxatile Rchb.e
„ Schmidtii Tausch.
„ Schraderi Schl.
„ stygium Uechtr.
„ strictum Fries.
„ tridentatum Fries.
„ villosum Jacq.
Hypochoeris glabra L.
„ radicata L.
Inula bifrons L.
„ macrocephala Boiss. & Kotschy.
„ thapsoides Boiss.
Jurinea spectabilis Fisch & Mey.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Lactura angustana L.
„ perennis L.
„ sativa L. v. capitata.
„ „ „ „ hiberna.
Lactura virosa L.
Lappa crispa Wallf.
„ edulis Siebold.
„ Kotschyi Hort.
„ tomentosa Lam.
Lapsana communis L.
Leontodon alpinus Vill.
„ caucasicus M. B.
„ hispidus L.
„ incanus Schrank.
„ proteiformis Vill.
„ squamosus Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
„ „ „ v. himalayanum D. C.
Lepachys pinnatifida Rafin.
Leucanthemum maximum D. C.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
Odontospermum maritimum Sch.
Onopordon heteracanthum C. A. Mey.
„ tauricum Willd.
Petasites nivens Baumg.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
„ tingitanum Desf.
„ vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
„ stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes alba L.
Ptarmica speciosa D. C.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pyrethrum carneum M. B.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
„ Tschihatchewii Hort.
Rhagadiolus edulis Gärtn.
Rudbeckia bicolor Nutt.
„ maxima Nutt.
„ moschata Lodd.
Scorzonera angustifolia L.
„ hispanica L.
„ purpurea L.
„ rosea W.-K.
„ villosa Scop.
Senecio adonifolius Loisel.
„ alpestris D. C.
„ Jacobaea L.

Senecio vernalis W. & K.
„ vulgaris L.
Serratula radiata M. B.
Solidago alpestris Waldst. & Kit.
„ fragrans Willd.
„ sparsiflora A. Gray.
Sonchus asper All.
„ laevis All.
„ palustris L.
Tagetes patula L.
„ „ „ v. nana fl. pl.
Taraxacum alpestre D. C.
„ erythrospermum Andrz.
„ serotinum Poir.
Telekia speciosa Baumg.
Tragopogon brevirostris D. C.
„ pusillus Michx.
„ Tommasinii Schk.
Troximon grandiflorum A. Gray.
Tussilago Farfara L.
Xanthium Strumarium L.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet.
Convolvulus libanoticus Boiss.
„ Scammonia L.
„ tricolor L.
„ undulatus Cav.
Cuscuta corymbosa Choisy. (Trifolium pratense.)
„ Epilinum Weihe. (Linum usitatissimum.)
„ Gronovii Willd. (Medicago sativa, Trifolium pratense.)
„ Gronovii Willd. v. calyptrata Englm. (Aster perennis.)
„ japonica Choisy. (Aster perennis.)
„ lupuliformis Krock. (Salix amygdalina, Lupinus.)
„ maior D. C. (Humulus lupulus, Urtica dioica.)
Ipomaea cordifolia Mart.
„ leucantha Jacq.
„ purpurea Roth.
„ sibirica Pers.
„ superba Schrank.
„ violacea Chaix.
„ zebrina Per.
Jacquemontia violacea Choisy.
Pharbitis hederacea Choisy.
„ hispida Choisy.

Crassulaceae.

Sedum aureum Wirtg.
„ glaucum W.-K.
„ hispanicum L.

Cruciferae.

Aethionema saxatile R. Br.
Alyssum alpestre L.
„ argenteum Witm.
„ calycinum L.
„ gemonense L.
„ minimum Willd.
„ orientale Ard.
Arabis Allionii D. C.
„ alpina L.
„ blepharophylla Hook. & Arn.
„ brassicaeformis Wallr.
„ Hornungiana Schur.
„ pumila Jacq.
„ saxatilis All.
Aubrietia erubens Griseb.
Aurinia sinuata Griseb.
Barbarea bracteosa Guss.
„ sicula C. & J. Presl.
„ vulgaris R. Br.
Braya pinnatifida Koch.
Brassica campestris L.
„ japonica Sieb.
„ juncea Coss.
„ Napus L. v. oleifera, annua.
1. Alti-sarsa.
2. Balcanora.
3. Bhunri-sarsa.
4. Janda-sarsa.
5. Naldra-sarsa.
6. Piarki-tori.
„ Napis L. v. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.

Brassica oleracea L. v. acephala crispa.
„ oleracea L. v. gemmifera D. C.
„ quadrivalvis Hook.
„ rapa L. v. oleifera D. C., annua.
1. Holland.
2. Schweden.
3. Thüringen.
4. Ungarn.
„ rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1. Awehl.
2. Holstein.
3. Schweden.
4. Thüringen.
5. Uckermark.
„ Robertiana J. Gay.
„ sabularia Brot.
„ Sinapis Vis.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cardaria Draba Desv.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis Dum.
Coronopus didymus Sm.
Descurainia tanacetifolia Prantl.
„ sicula Dum.
Draba aurea Wahl.
„ bronchialis D. C.
„ incana L.
„ pyrenaica L.
„ stellata Jacq.
„ verna L.
Eruca cappadocica Reut.
„ sativa Mill.
Erucastrum obtusangulum Reichb.
Erysimum angustifolium R.
„ pannonicum Crantz.
„ repandum L.
„ rupestre D. C.
„ strictum D. C.
Euclidium syriacum R. Br.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
„ Tenoreana D. C.
Isatis canescens D. C.
„ littoralis Stev.
„ lusitanica Brot.
„ tinctoria L.
Lepidium heterophyllum Beuth.
„ sativum L.
„ stylatum Lag.
Lunaria biennis Moench.
Matthiola bicornis D. C.
„ parviflora R. Br.
Moricandia hesperidiflora D. C.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer L.
„ sativus L. v. oleiferus.
„ raphanistrum L.
Rapistrum perenne All.
Schivereckia podolica Andrz & Bess.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. v. orientalis Murr..
„ chinensis L.
„ erucoides L.
„ dissecta Lag.
„ hispida Schousb.
„ juncea L.
„ laevigata L.
„ nigra L.
„ Schkuhriana Rchb.
Succowia balearica Med.
Syrenia sessiliflora Ledeb.
Thlaspi arvense L.
„ densiflorum Boiss. & Kotschy.
Vesicaria utriculata D. C.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Citrullus Colocynthis Schrad.
Cucumis prophetarum L.
Cucurbita Pepo L. v. Mammuth.
„ „ „ „ turbaniformis M. Roem.
„ „ „ „ oviformis.

Cyclanthera explodens Naud.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ centauroides R.-S.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.&Schenk.
„ tatarica Schrad.
Dipsacus ferox Loisel.
„ silvestris Mill.
Knautia magnifica Boiss. & Orph.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa caucasica M. B.
„ purpurea L.
„ ucranica L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia exigua L.
„ falcata L.
„ Lathyris L.
„ Myrsinites L.
„ Peplis L.
„ platyphylla L.
„ Ipecacuanha L.
Mercurialis annua L.
Ricinus japonicus Thunb.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianeae.

Gentiana acaulis L.
„ adscendens Poir.
„ affinis Griseb.
„ Andrewsii Griseb.
„ decumbens L.
„ fragrans Haenke.
„ Kesselringi Regel.

Geraniaceae.

Geranium albiflorum Ledeb.
„ cristatum Stev.
„ dissectum L.
„ platypetalum Fisch. & Mey.
„ sanguineum L.
Geranium silvaticum L.
„ Wallichianum D. Don.
Impatiens angustifolia Hook.
„ biflora Walt.
„ capensis M.
„ cristata Wall.
„ glandulifera Arn.
„ Holstii Engl. & Warb.
„ Roylei Walp.
Limnanthes alba Hartw.
Oxalis corniculata L.
Tropaeolum maius L.

Globulariaceae.

Globularia cordifolia L.
„ trichosantha Fisch. & Mey.

Hydrophylleae.

Eutoca viscida Benth v. albida.
Phacelia bipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ chinense Lam.
„ delphicum Boiss. & Heldr.
„ Gebleri C. A. Mey.
„ hircinum Poir.
„ pyramidatum Ait.

Illecebraceae.

Scleranthus annuus L.

Labiatae.

Ballota hispanica Benth.
„ nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Steph.
„ hirsuta L.
„ incana Mill.
„ officinalis L.
„ orientalis L.
Calamintha Acinos Clair.
„ Clinopodium Spen.

Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
„ peregrinum L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ pyrenaica Bartl.
Hyptis pect'nata Po:t.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch. & May.
Lamium amplexicaule L.
Lavandula vera D. C.
Leonurus villosus Desf.
Lophanthus chinensis Beuth.
Marrubium candidissimum L.
„ leonuroides Desr.
„ pannonicum Reichb.
„ vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
„ gentilis Sm.
„ hortensis Wirg. v. viridis.
„ piperita L.
„ silvestris L. v. crispa.
„ suavis Guss.
„ viridis L.
Monarda Kalmiana Pürsh.
„ Ruseliana Nutt.
Nepeta granatensis Boiss.
„ nuda L.
„ racemosa Lam.
„ ucranica L.
Origanum smyrnaeum L.
Phlomis alpina Poll.
„ armeniaca Willd.
„ tuberosa L.
Prunella australasica Moric.
„ elongata Dougl.
„ grandiflora Jacq.
„ incisa Link.
„ laciniata L.
„ pyrenaica Philippe.
Salvia acaulis L.
„ Aethiopis L.
„ austriaca Jacq.
„ Bertolonii Vis.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.
„ glutinosa L.
„ Horminum L.
„ lanceolata Brouss.
„ officinalis L.
Salvia pratensis L.
„ pyrenaica L.
„ silvestris L.
„ verticillata L.
„ virgata Ait.
Satureia hortensis L.
„ marifolia Carnel.
Scutellaria albida L.
„ commutata Guss.
„ macrantha Fisch.
„ orientalis L.
„ splendens Link.
„ versicolor Nutt.
Sideritis hirsuta L.
„ hyssopifolia L.
„ syriaca L.
„ taurica Willd.
Stachys alpina L.
„ annua L.
„ arvensis L.
„ aurea Beuth. v. plumosa.
„ heraclea All.
„ lanata Jacq.
„ palustris L.
„ sibirica Link.
Tencrium Botrys L.
„ Scorodonia L.
Thymus citriodorus Schreb.

Leguminosae.

Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ cassubicus Jord.
„ chartaceus Ledeb.
„ Cicer L.
„ cylindraceus D. C.
„ danicus Retz.
„ Echinus D. C.
„ galegiformis L.
„ Glycyphyllus L.
„ illyricus Bernh.
„ maximus Willd.
„ Onobrychis L.
„ sulcatus L.
„ vimineus Pall.
Baptisia australis R. Br.
Cicer arietinum L. v. nigrum.
Cicer arietinum L. v. rotundum.
Coronilla vaginalis Lam.
„ varia L.

Cytisus austriacus L.
„ capitatus Jacq.
Dolichos Lablab L.
„ tuberosus Lam.
Ervum abessinicum Hore.
„ Ervilia L.
„ monanthum Desf.
Galega officinalis L.
„ orientalis Lam.
„ persica Pers.
Genista florida L.
„ Halleri Reyn.
„ sagittalis L.
„ sibirica L.
„ tinctoria L.
Glycyrrhiza echinata L.
„ glandulifera Waldst. & Kit.
Hedysarum altaicum Fisch.
„ flavescens Rgl.-Schm.
Lathyrus alatus Tenore.
„ Aphaca L.
„ Armitageanus Knowler & Westc.
„ articulatus L.
„ Bauhini Genty.
„ Cicera L.
„ cirrhosus Ser.
„ Clymenum L.
„ heterophyllus L.
„ hirsutus L.
„ latifolius L.
„ maritimus Bigel.
„ montanus Bernh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ odoratus L.
„ pisiformis L.
„ pratensis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ stipulaceus Le Conte.
„ tingitanus L.
„ tomentosus Lam.
„ tuberosus L.
„ usifolius Red.

Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus corniculatus L.
„ edulis L.
„ Gebelia Vent.
„ peregrinus L.
„ tenuifolius Presl.
„ uliginosus Schk.
Lupinus affinis Agardh.
„ albus L.
„ angustifolius L.
„ „ „ v. albus.
„ Cosentini Guss.
„ Crucksbauksii Hook.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandiflorus Don.
„ Hilarianus Benth.
„ hirsutus L.
„ linifolius Roth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ pulchellus Sweet.
„ sulphureus Dougl.
„ reticulatus Desv.
„ Termis Forsk.
Medicago apiculata Willd.
„ arabica L.
„ Berteriana Mor.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ nigra Krock.
„ orbicularis All.
„ polycarpa Willd.
„ scutellata All.
„ Terebellum Willd.

Melilotus alba Desr.
„ bicolor Boiss. & Bal.
„ dentata Pers.
„ elegans Salzm.
„ leucantha Koch.
„ officinalis Lam.
„ segetalis Ser.
„ sulcata Desf.
Onobrychis montana D. C.
„ sativa Lam.
Ononis geminiflora Lag.
„ hircina Jacq.
„ spinosa L.
Orobus niger L.
„ vernus L.
Oxytropis Halleri Bunge.
Phaseolus ellipticus Hort. v. carneus.
„ lunatus L. v. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L.
„ „ „ v. communis.
„ „ „ v. compressus Mönch.
„ „ „ v. gonospermus Savi.
„ „ „ v. nanus L.
„ „ „ v. nigerrimus Juss.
„ „ „ v. oblongus Savi.
„ „ „ v. tuberosus.
Pisum arvense L.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Rchb.
„ sativa L.
„ „ „ v. Concentator L.
„ „ „ „ Dickon's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
Soja hispida Mönch. v. lutea.
„ „ „ „ nigra.

Tetragonolobus purpureus Mönch.
„ Requienii Fisch. & Mey.
„ siliquosus Roth.
Trifolium agrarium Poll.
„ alatum Biv.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ balcanicum Velen.
„ elegans Savi.
„ fragiferum L.
„ hybridum L.
„ leucanthum M. Bieb.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ olympicum Hornem.
„ pannonicum L.
„ panormitanum Presl.
„ parviflorum Ehrenb.
„ Perreymondii Gren. & Godr.
„ pratense L.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ rubens L.
„ striatum L.
Trigonella Balansae Boiss. & Reut.
„ caerulea Ser.
„ calliceras Fisch.
„ cancellata Desf.
„ corniculata L.
„ gladiata Stev.
„ Foenum graecum L.
„ monspeliaca L.
„ polycerata L.
„ spinosa L.
Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ biennis L.
„ bithynica L.
„ calcarata Desf.
„ canescens Labill.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ cornigera Chaub.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ dumetorum L.

Vicia Faba L. v. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ grandiflora Scop.
„ „ „ v. Kitaibeliana.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii P. B.
„ Narbonensis L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta Fisch. & Mey.
„ sativa L.
„ „ „ v. dalecarliensis.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. B.
„ tetrasperma Mönch.
„ unijuga A. Br.
„ varia Host.
„ villosa Roth.

Linaceae.

Linum americanum L. v. album.
„ austriacum L.
„ flavum L.
„ Lewisii Pursh.
„ perenne L.
„ usitatissimum L. v. crepitans.
„ „ „ (Erfurt).
„ „ „ (Ostindien).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Zeeland).
„ „ „ (Gelbsamiger).

Lythrarieae.

Lythrum flexuosum Lag.
„ myrtifolium Lodd.
Olinia cymosa Thunbg.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
Althaea apterocarpa Fenzl.
„ cannabina L.
„ chinensis Cav.
„ ficifolia Cav.
„ Froloviana Fisch.
„ Heldreichii Boiss.
„ kurdica Schlecht.
„ officinalis L.
„ pallida W.-K.
„ sulphurea Boiss. & Hohen.
Anoda cristata Schlecht.
„ Wrightii A. Gray.
Hibiscus Humboldtii Schrank.
„ mutabilis L.
„ Richardsonii Lindl.
„ Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera maritima Gouan.
„ thuringiaca L.
Malope grandiflora T. G. Dietr.
Malva Alcea L.
„ balsamica Jacq.
„ crispa L.
„ Durieui Spach.
„ glomerata Hort.
„ nicaeënsis All.
„ oxyloba Boiss.
„ parviflora L.
„ rotundifolia Huds.
„ scaberrima Lag.
„ silvestris L.
Napaea dioica L.
Palava malvaefolia Cav.
Sida rhombifolia L.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalappa L.

Onagrarieae.

Clarkia elegans Poir.
„ gauroides Dougl.

Epilobium adnatum Griseb.
„ angustifolium L.
„ boreale Haus.
„ davuricum Fisch.
„ grandiflorum Wigg.
„ hirsutum L.
„ lanceolatum Sebast & Maur.
„ lividum Haus.
„ nutans F. W. Schmidt.
„ tetragonum L.
Godetia amoena G. Don.
„ gloriosa Hort.
„ Lady Satin Rox.
„ purpurea G. Don.
„ Romanzowii Spach.
Jussieua repens L.
Oenothera amoena Lehm.
„ biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ cruciata Nutt.
„ Jamesii Torr & Gray.
„ purpurea Curt.
„ rosea Ait.
„ speciosa Nutt.

Orobanchaceae.

Orobanche cruenta Bertol (Lotus corniculatus).
„ cumana Wall. (Helianthus annuus).

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa Rafin v. purpurea.
Argemone Barclayana Penny.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium laciniatum Mill.
„ maius L.
Corydalis ophiocarpa Hook.
„ rosea Maxim.
Eschscholzia crocea Benth.
Fumaria officinalis L.
„ parviflora Lam.
Glaucium leiocarpum Boiss.
„ luteum Scop.
„ phoeniceum Crantz.
„ rubrum Sibth. & Sm.
„ squamigerum Kar. & Kir.
Papaver album L.
„ Argemone L.
Papaver bracteatum Lindl.
„ dubium L.
„ obtusifolium Desf.
„ orientale L.
„ Rhoeas L.
„ somniferum L.
„ spicatum Boiss. & Bal.
Roemeria hybrida D. C.
„ refracta D. C.

Pedalineae.

Martynia proboscidea Glox.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Decm.
„ alpina L.
„ altissima Loisel.
„ arenaria W. & K.
„ argentea Chaix.
„ Cynops L.
„ kamtschatica Link.
„ Lagopus L.
„ maior L.
„ media L.
„ montana Lam.
„ Psyllium L.
„ purpurascens Nutt.
„ saxatilis M. B.
„ sericea Ruiz. & Pav.
„ serpentina Lam.
„ subulata L.

Plumbagineae.

Armeria allioides Boiss.
„ alpina Willd.
„ berlengensis Daveau.
„ cassubica Boiss.
„ formosa Heynh.
„ juncea Girard.
„ labradorica Wallr.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ maritima Willd.
„ plantaginea L.
„ splendens Boiss.
„ vulgaris Willd.
Statice incana L.

Polemoniaceae.

Gilia grandiflora A. Gray.
„ parviflora Spreng.

Gilia tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ pauciflorum S. Wats.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Polygonum Convolvulus L.
„ Fagopyrum L.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ rotundatum Bab.
„ tataricum Gärtn.
„ „ „ v. secalinum.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.
„ Rhaponticum L.
„ undulatum L.
Rumex abyssinicus Jacq.
„ Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ alpinus L.
„ altissimus Wood.
„ arifolius L.
„ cordifolius Hornem.
„ crispis L.
„ domesticus Hartm.
„ giganteus Ait.
„ Patientia L.
„ pulcher L.
„ sanguineus L.
„ stenophyllus Leeeb.

Portulacaceae.

Portulaca oleracea L.
„ pussilla H. B. a K. Nov.
„ sativa Haw.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schrb.
Androsace lactea L.
„ lactiflora Hort.
„ maxima L.
Lysimachia quadrifolia L.
Primula flagellicaulis Kern.
Primula leucophylla Pax.
„ media Peterm.
„ officinalis L.
„ Paxii W.
„ suaveolens Bertol.

Ranunculaceae.

Aconitum Napellus L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
„ autumnalis L.
„ flammea Jacq.
„ vernalis L.
Anemone albana Stev.
„ borealis Rich.
„ Bungeana Pritz.
„ decapetala Arnd.
„ Hudsoniana Rich.
„ silvestris L.
„ virginiana L.
Aquilegia advena Regel.
„ atrata Koch.
„ atropurpurea Willd.
„ Bauhini Schott.
„ blanda v. Houtte.
„ canadensis L.
„ caryophylloides L.
„ chrysantha A. Gray.
„ coerulea James.
„ flabellata Sieb. & Zucc.
„ flavesceus S. Wats.
„ fragrans Beuth.
„ Haenkeana Koch.
„ nivea Baumg.
„ olympica Boiss.
„ rhodosepala.
Caltha palustris L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis recta L.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
Delphinium Ajacis L.
bicolor Nutt.
„ cardiopetalum D. C.
„ Consolida L.
„ dictyocarpum D. C.
„ discolor Fisch.
„ elatum L.
„ exaltatum Ait.
„ fissum Waldst. & Kit.
„ glabellum Turcz.

Delphinium grandiflorum L.
„ Maackianum Rgl.
„ Przewalskii R.
„ puniceum Pall.
„ Requienii D. C.
„ Skinneri Poit.
„ tirolense Kern.
„ tricolor Bernh.
„ Uechtritzianum Panc.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigelastrum L.
Nigella aristata Sibth.
„ arvensis L.
„ Bourgaei Jord.
„ damascena L.
„ Garidella Spenn.
„ hispanica L.
„ sativa L.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ lobata Pall.
„ peregrina Mill.
„ triternata Pall.
Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
Ranunculus acris L.
„ anemonaefolius D. C.
„ anemonoides Zahlbr.
„ brutius Tenore.
„ chaerophyllus L.
„ Chius D. C.
„ constantinopolitanus Urv.
„ cordigerus Viv.
„ heucheraefolius Presl.
„ millefoliatus Vahl.
„ ophioglossifolius Willd.
„ parnassifolius L.
„ sceleratus L.
„ serbicus Vis.
„ trilobus Desf.
„ velutinus Tenore.
Thalictrum alpinum L.
„ aquilegifolium L.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ maius L.
„ sibiricum L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae

Reseda abyssinica Fresen.
Reseda alba L.
„ crystallina Webb & Berth.
„ fruticulosa L.
„ Jacquini Rchb.
„ lanceolata Lag.
„ lutea L.
„ Luteola L.
„ macrosperma Rchb.
„ myriophylla Tenore.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.
„ odorata Mill.
„ parviflora Ait.
„ pilosa Ledeb.
„ repens L.
Alchemilla arvensis Scop.
Fragaria californica Cham & Schlecht.
„ mexicana Schlecht.
„ roseiflora Boulay.
Geum album J. F. Gmel.
„ biflorum Brot.
„ coccineum Sibth &m.
„ japonicum Thunbg.
„ magellanicum L.
„ macrophyllum Willd.
„ montanum L.
„ pallidum Fisch. & Mey.
„ pyrenaicum Mill.
„ rivale L.
„ rubellum Fisch. & Mey.
„ rubifolium Lej.
„ triflorum Pürsh.
„ urbanum L.
Potentilla adscharica Sommier & Levier.
„ atrosanguinea Lodd.
„ aurea L.
„ elegans Schlecht.
„ formosa D. Don.
„ geoides Bieb.
„ Hookeriana Lehm.
„ incanescens Opiz.
„ insignis L.
„ kurdica Boiss & Hohen.
„ Lindackeri Tausch.
„ maculata Pourr.
„ Menziesii & Pax.
„ montenegrina Pantoč.

Potentilla pulcherrima Lehm.
„ ranunculoides H. & B.
„ recta L.
„ splendens Ram.
„ taurica Willd.
„ villosa Hall.
„ Wrangeliana Fisch- Avè-Lall.
Poterium agrimonifolium Cav.
„ Magnolii Spach.
„ microphyllum Jord.
„ Sanguisorba L.
„ spinosum L.
„ verrucosum Ehr.
Sibbaldia cuneata Aornem.
„ procumbens L.
Spiraea Filipendula L.

Rubiaceae.

Asperula hexaphylla All.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst. & Kit.
„ orientalis Boiss. & Hohen.
Crucianella aegyptiaca L.
„ angustifolia L.
„ gilanica Trin.
„ glauca A. Rich.
„ graeca Boiss.
„ patula L.
Galium Aparine L.
„ crinitum All.
„ tricorne With.
„ vernum L.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.

Rutaceae.

Ruta bracteosa D. C.
„ corsica D. C.
„ graveolens L.
„ macrophylla Moris.
„ montana Mill.

Santalaceae.

Thesium humile Vahl.
„ ramosum Hayne.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
„ cylindrica Dougl.
„ divaricata Fisch.
„ glabra Willd.
„ hispida Pürsh.
„ lucida Schlecht.
„ macrophylla Lodd.
„ sanguinea Engelm.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga ajugifolia L.
„ caespitosa L.
„ Engleri Dalla Torre.
„ oppositifolia L.
„ penduliflora Bast.
Tellima grandiflora R. Br.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum calycinum Vent.
„ hispanicum Chav.
„ Linkianum Boiss & Reut.
„ tortuosum Bosc. v. glutinosum.
Digitalis ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ eriostachya Bess.
„ ferruginea L.
„ Fontanesii Steud.
„ fulva Lindl.
„ gloxinioides Carr.
„ grandiflora Lam.
„ lutea L.
„ nevadensis Kunze.
„ orientalis Lam.
„ purpurea L.
„ sibirica Lindl.
„ viridiflora Lindl.
Linaria albifrons Spreng.
„ arvensis Desf.
„ Broussonnetii Chav.
„ capraria Moris & De Not.
„ dalmatica Mill.
„ Elatine Mill.
„ linarioides Steud.
„ minor Desf.
„ origanifolia D. C.
„ Pančiči Janka.

Linaria spuria Mill.
„ tristis Mill.

Melampyrum arvense L. (Triticum vulgare).

Pentastemon diffusus Dougl.
„ hirsutus Willd.
„ laevigatus Ait.
„ procerus Dougl.
„ roseus G. Don.

Rhinanthus villosus Pers (Triticum vulgare).

Scrophularia divaricata Ledeb.
„ Hoppei Koch.

Verbascum australe Schrad.
„ Chaixi Vill.
„ floccosum W. & K.
„ Kanitzianum Simk. & Walz.
„ nigrum L.
„ phlomoides L.
„ plicatum Sibth. & Sm.
„ thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ austriaca L.
„ Beccabunga L.
„ biserrata Schur.
„ caucasica Bieb.
„ crassifolia Wierzb.
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ hastata L.
„ hederaefolia L.
„ incana L.
„ longifolia L.
„ maritima L.
„ orientalis Mill.
„ persica L.
„ petraea Stev.
„ polita Fries.
„ Ponae Gouan.
„ praecox All.
„ pulchella Bast.
„ saxatilis Scop.
„ Teucrium L.
„ triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.

Solanaceae.

Anisodus luridus Link. & Otto.
Atropa Belladonna L.
Browallia azurea Hort.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura Bertolonii Parl.
„ Leichhardtii F. Muell.
„ Stramonium L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gärtn.
Nicotiana alata L. & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ Auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.
„ rustica L.
„ silvestris L.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.
Petunia hybrida & Hort.
„ nyctaginiflora Juss.
Salpiglossis variabilis Hort.
Saracha Jaltomata Schlecht.
Solanum citrulliifolium A. Br.
„ miniatum Bernh.
„ nigrum L.
„ racemiflorum Dun.
„ rostratum Dun.
„ rubrum Mill.
„ Tomatillo Phil.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L. v. alba.

Umbelliferae.

Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
Bubon galbanum L.
Bupleurum longifolium L.
„ rotundifolium L.

Carum alpinum Benth. & Hook.
„ buriacticum Turcz.
„ Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Cerefolium sativum Bess.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ aureum L.
„ bulbosum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum melphitense Ten. & Guss.
„ sativum L.
Daucus carota L.
„ „ „ v. alba.
„ „ „ „ arvensis (Futtermöhre v. Saalfeld).
Eryngium Billardieri Delar.
„ eburneum Decne.
Ferula thyrsiflora Sibth. & Sm.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum scoticum L.
Lophosciadium meifolium D. C.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
„ peucedanifolia Pollich.
„ Phellandrium Low.
Pastinaca lucida L.
„ sativa L.
„ selinoides Vis.
Peucedanum austriacum Koch.
Scandix Pecten Veneris L.
Siler triilobum Crantz.
Smyrnium perfoliatum L.
Trinia Kitaibelii M. B.
„ vulgaris D. C.
Zizia aurea Koch.

Urticaceae.

Cannabis gigantea Vass.
„ indica Lam.
„ sativa L.
„ „ „ v. himalayna Hort.
Humulus japonicus Sieb & Zucc.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Fedia scorpioides Dufr.
Valerianella auricula D. C.
„ coronata D. C.
„ olitoria Pollich.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. & K. Nov.
„ excelsa Desf.
„ paniculata Lam.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola arenaria D. C.
„ betonicifolia Sm.
„ canadensis L.
„ cenisia L.
„ dactyloides Roem. & Schult.
„ Jooi Janka.
„ pinnatifida All.
„ primulifolia L.
„ suavis Bieb.

Zygophyllaceae.

Zygophyllum Fabago L.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Allium fallax Schult.
„ Moly L.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb.
Begonia discolor Ait.
„ nelumbiifolia Cham. & Schlecht.
„ semperflorens Link. & Otto.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia corallina Hort.
„ gracilis Lindl.
Dyckia sulphurea C. Koch.
Euonymus japonicus L. v. macrophyllus fol. var.
Hyacinthus azureus Baker.
Libonia floribunda C. Koch.
Lavandula vera D. C.
Mesembryanthemum anceps Haw.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ crassulinum Spreng.
„ deltoides L.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl. & Zeyh.
„ spectabile Haw.
„ splendens L.
„ subincanum Haw.
Mesembryanthemum Thunbergii Haw.
„ violaceum D.
Mikania Quaco Humb. & Boupl.
Muscari atlanticum Boiss.
„ racemosum Mill.
Narcissus albicans Spreng.
Nephrolepis bostomiensis Hort.
„ elegantissima Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ophiopogon japonicus Ker. & Gawl.
„ Jaburan Lodd.
Pilea muscosa Lindl.
Peperomia metallica Lindl. & Rod.
Polypodium Lingua.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Sansevieria zeylanica Willd.
Santolina incana Lam.
Saxifraga sarmentosa L.
Sedum Sieboldi Hort. fol. med. pictis.
„ Stahlii Hort.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ grandis Moore.
„ Martensii Spring.
Sempervivum barbatum L.
„ balsamiferum Webl. & Berth.
Streptocarpus hybr. goliath. Hook.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Tulipa Dideri Jord. v. alba.
Tupistra squalida Ker. & Gawl.
Veronica Traversiii Hook.
Zingiber Zerumbet Rosc.

Tábor in Bohemia, 1. die m. Januarii 1912.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

J. Svoboda,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

Frank, Tábor.

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

QK73 .T32 T33

VII.

Delectus seminum plantarum

anno 1912 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Amaryllideae.

Leucojum pulchellum Salisb.

Aroideae.

Calla palustris L.

Cyperaceae.

Carex adusta Boott.
„ arenaria L.
„ atrata L.
„ canescens L.
„ cephalophora Muhl.
„ contigua Hoppe.
„ distans L.
„ disticha Huds.
„ divulsa Good.
„ elongata L.
„ extensa Good.
„ folliculata L.
„ frigida All.
„ glauca Murr.
„ hordeiformis Wahl.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ lamprocarpa Čel.
Carex leporina L.
„ Linkii Willd.
„ Michelii Host.
„ mirabilis Host.
„ multiflora Wahlenb.
„ muricata L.
„ nodiflora Boeck.
„ nubigena D. Don
„ pallescens L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ Pseudo-cyperus L.
„ remota L.
„ rhynchophysa Fisch. Mey & Avé-Lall.
„ rosea Schrk.
„ secalina Wahl.
„ sempervirens Willd.
„ Shortiana Dewey & Torr.
„ sparganioides Muhl.
„ supina Wahl.
„ teretiuscula Good.
„ variabilis L. H. Bailey.
„ vesicaria L.
„ vulpina L.
„ vulpinoidea Michx.
Cyperus fuscus L.
Eriophorum alpinum L.
Scirpus compressus Pers.
„ lacustris L.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch.
„ fatua L.
„ nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ „ for. mutica.
3. „ obtusata All. alba (Hungaria).
4. „ a) pugnax Al.
   b) „ „ (Polend).
5. „ a) tatarica (Germania).
   b) „ (Rossia).
   c) „ (Selchov).
6. „ a) tristis Al. (Hungaria).
   b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke. (Bourbon).
   b) „ „ (Osetia Caucasus).
   c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ montana Alef.
7. „ mutica Alef.
   a) Anglia.
   b) arenaria.
   c) Barnstaedt.
   d) Belgium.
   e) Caucasus.
   f) Fennia.
   g) Hirsch.
   h) Landa's Grün-Hafer.
   i) Lapponia.
   j) Leutewitz.
   k) Ligowo.
   l) Oderbuch.
   m) Podolia.
   n) Polonia.
   o) Probstei.
   p) Romania.
   r) Silesia.
   s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
   b) „ „ (Fennia).
   c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langethal (Australia).
   b) praegravis Langethal (Germania).
   c) „ Langethal (Scotia).
   d) „ Langethal (Willkommen).
10. „ setosa Kcke.
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
    b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
   a) Altona.
   b) Dania.
   c) Imperial.
   d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
   a) Bavaria.
   b) Bestehorn.
   c) Chevalieri.
   d) Chile.
   e) giganteum.
   f) Hierosolyma.
   g) Landa's Porter.
   h) Melonen Gerste.
   i) Philadalphia.
   j) Phoenix.
   k) Probstei.
   l) Nolč's Imperial Typ A.
   m) „ „ „ B.
   n) „ „ „ C.
   o) „ Bohemia Gerste.
   p) „ böhmische früheste.

Hordeum distichum L.
8. „ spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.
1. var. a) parallelum Kcke.
a) „ „ (himalayense).
c) parallelum Kcke. (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
a) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.
1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
a) Italia.
b) Marocco.
c) Mandschuria.
d) Norvegia.
e) Peru.
f) Rimpaui.
g) Cyprus.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).
b) „ Kcke (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.
a) album, furcatum, nudum, distichum.
b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.
a) Brandeburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.
1. var. clavatum Alef.
2. „ a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
b) creticum Mazz. (Palermo).
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.
1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ brunneum Alef.
4. „ campylodon Kcke.
5. „ cladurum Alef.
6. „ farrum Bayle.
7. „ Fuchsii Kcke.
8. „ Krausei Alef.
9. „ liguliforme Kcke.
10. „ pycnurum Alef.
11. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
12. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.
a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.
1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelan Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Tricitum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.
1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.
1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. var. chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.
1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.
a) Běloturka (gub. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.
1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.
1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestenseni.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ caesium Alef.
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
a) aristatum.
b) Petali.
c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
a) Hunderttägig.
b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ Hostianum Clem.
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).

Triticum vulgare L.

13. var. muticum Bayle.
    a) Australia.
    b) California.
    c) Heine's W.
    d) Noë's W.
    e) Schlandstaedt.
    f) Slané (Bohemia).
14. „ pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

a) gigentea.
b) Sibiria.

1. var. a) aurea Kcke. (Mönchhafer).
   b) aurea Kcke. (Ardtii).
2. „ grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum hexastichum L.

1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum (ertragreichste).
   b) giganteum Chrestenseni (verbesserte).
   c) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ luteum.
4. „ nigrum.

Hordeum tetrastichum L.

a) Alberti.
b) Chrestenseni.
c) Groeningense.
d) luteum.
e) Mammuth.

1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
15. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's- R.
18. Chrestensen's-R. giganteum.
19. Chrestensen's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harz).
21. Riesen-Staudenroggen.
22. Landa's Hannibal R.
23. Colossal- hybridum.
24. Buhlendorf.
25. Altpaleschkener R.
26. Hadmersleben.
27. Trispermum.
28. Wasa.
29. St. Johannis.
30. Nyland.
31. Schlaraffen-Roggen.
32. Zeelander Original.
33. Hungaria.
34. Mährischer Stauden-R.
35. Mumien-R.
36. Bric.
37. Petkuss.
38. Rügenscher R.
39. Hessischer Garde du Corps.
40. Correns Stauden-R.
41. Hispanicum.
42. Suecicum
43. Banaticum.
44. Schlanstaedt. giganteum.
45. Champagner Stauden-R.
46. Alpinum.
47. März.
48. Romanum.
49. Montagner Degenerirter Riesen R.
50. Chrestensen's Triumph R.
51. Branisch Excelsior R.
52. Chrestensen's Kolben R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.
„ „ „ Binkel W.

Triticum compactum Host. var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

„ dicoccum Schr. var. nigrum (Amidonnier).
„ dioccum Schr. var. tricoccum Schübl.
„ dicoccum Schr. Schwarzer sammetiger W.
„ dicoccum Schr. v. Bauhini Al. (Roter sammetiger W.).
„ dicoccum Schr. var. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. coeruleum Al. (Kolben W.).
6. dasyanthum.
7. erubescens aristatum.
8. rubrum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. „ centigrammum.
3. „ compositum (velutinum).
4. „ „ (Mirakel).
5. „ dinura Al. (Helena).
6. „ gentile Al. (Blé poulard blanc lisse on carré).
7. „ graecum (Korinthus).
8. var. jodura Al. (Blauer sammetiger W.).
„ jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.).
„ jodura Al. (Paines Defiance).
„ jodura Al. (Riwet's Grannen-W.).
„ jodura Al. (Schottischer rauher Winter W.).
9. „ melanatherum Kcke. (Petanielle noir de Nice).
10. var. mirabile Kcke. (Ihrwetter)
„ „ „ (Schwarzer sammetiger Wunderweizen).
11. „ pseudo-cervinum Kcke.

Triticum vulgare L.

var. a l b o r u b r u m Kcke.
1. Heine's Molds red prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red chaff de Dantzick.

var. a r i s t a t u m Schübl.
1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square-head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Persischer schwarzer W.
12. Golden Cross.
13. Japonischer W.
14. Johnson's W.
15. Nouette de Lausanne.
16. Russischer W.
17. Schwarzer persischer W.
18. Robert's W.
19. Chrestensen's Square-head.
20. Michigan bronce.

var. c y a n o t h r i x Kcke.

var. e r y t h r o s p e r m u m Kcke.
1. Bestehorn's W.
2. Horfords Michigan bronce.
3. Kis-Tur (Hungaria).

Triticum vulgare L.

var. ferrugineum Al.

1. Rimpau's-W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerirter W.
3. Fuchs W.

var. lutescens Al.

1. Juli W.
2. Lammas.
3. Kaiser W.

var. miltura Al.

1. Hallet's red. Nursery.
2. Blé rouge de St. Land.
3. Cover's red. Wheat.
4. Spalding prolific Wheat.

var. muticum Bayle.

1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam Wheat.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomír Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoba.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfälischer Land Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. Probsteier.
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's No. 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Spalding's prolific.
43. Browick red.
44. Bestehorn's Dividendenw.
45. Red Mary gold.
46. Browick red rubrum.
47. Schariff's Square head, Orig.
48. Besseler's Square head.
49. Kirsche's Square head.
50. Mette's Square head.
51. Strube's Square head.
52. Breustedt's kurzer Square h.
53. Anderbeck Square head.
54. Leutewitz Square head.
55. Bore-Svalöf.
56. Extra Svalöf Square head.
57. Original Schiriffw.
58. Böhmischer roter Wechselw.
59. North Allerton.
60. Johns Winter Sive.
61. Englischer brauner W.
62. Böhmischer sammetiger Kolben W.
63. Aleph.
64. Richelle blanc de Naples.
65. Rouge inversable.
66. Schottischer blutroter.
67. Massey.
68. Hunter's White Wheat.
69. Smogger-W.
70. Romanella.
71. Talavera.
72. Horfords Winter Perl.
73. Feuton.
74. Ungarischer roter.
75. Chiddam weisser Urbst.
76. Hybridi inversable.
77. Schilf-W.
78. Amerik. Willits.
79. Preis von Oxford.
80. Urtoba.

Triticum vulgare L.
81. Marenil.
82. Blé Talavera de Bellevue.
83. De Blaic.
84. Blanc a duvet veloute.
85. Manhattan.
86. Victoria d'Autome.
87. Braunähriger Märkischer-W.
88. Golden Drop (verbessert).
89. Flandrischer-W.
90. White Trump.
91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
92. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
93. Griewenner Weizen.
94. Elys.
95. De Crepi.
96. Hopetoum Wheat.
97. Briguet.
98. Galland.
99. Hickling's W.
100. Dattelweizen.
101. Blausamtiger Kolben W.
102. Weizen Roggen.

var. villosum Al.
1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.

var. pyrothrix Al.
1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
2. Sammetiger Square-head.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macrura Jaub. & Spach.
„ ovata L.
„ squarrosa L.
„ speltoides Tausch.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.
Aegopogon geminiflorus Humb. & Boupl.
„ pusillus Beauv.
Agrostis alba L. v. maior Gaud.
„ canina L.
„ dispar Michx.
„ interrupta L.
„ nebulosa Boiss. & Reut.
Agrostis rupestris All.
„ Spica-venti L.
„ stolonifera L.
„ „ „ var. gigantea Gaud.
„ vulgaris With.
Aira bottnica Wahlenb.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ mollis Schreb.
Alopecurus agrestis L.
„ arundinaceus Poir.
„ castellanus Boiss & Reut.
„ fulvus Sm.
„ geniculatus L.
„ nigricans Horn.
„ pratensis L.
Andropogon argenteus D. C.
„ Gryllus L.
Anthoxanthum Carrenianum Parl.
„ odoratum L.
„ ovatum Lag.
„ Puelii Lecoq & Lamotte.
Antinoria agrostidea Parl.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
Aristida Adscensionis L.
Atropis distans Griseb.
Avellinia Michelii Parl.
Avena bromoides Gouan.
„ desertorum Less.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis L.
„ versicolor Vill.
Beckmannia erucaefomis Host.
Boissiera bromoides Hochst. & Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium mucronatum Willk.
„ pinnatum P. B.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
„ media L.
„ minor L.
„ rufibarba Boiss.
„ virens L.
Bromus albidus Murr.
„ arvensis L.

Bromus brachystachys Horn.
„ brizaeformis Fisch. & Mey.
„ caprinus Kern.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ inermis Leyss.
„ laxus Reichb.
„ longiflorus Spreng.
„ macranthus Meyen.
„ madritensis L.
„ marginatus Steud.
„ mollis L.
„ patulus M. & K.
„ racemosus L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ squarrosus L.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
„ uniloides H. B. & K. N.
Calamagrostis arundinacea Roth.
„ epigeios Roth.
„ Halleriana D. C.
„ lanceolata Roth.
„ lapponica Hartm.
„ montana D. C.
„ Nuttaliana Vasey.
Catabrosa aquatica P. B.
Catapodium tuberculosum Moris.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gray.
Cinna mexicana Beauv.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens P. B.
Cynosurus cristatus L.
„ echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis Aschersoniana Gräb.
Deschampsia juncea Beauv.
Desmazeria sicula Dum.
Digitaria eriogona Link.
„ horizontalis Willd.
Eleusine indica Gärtn.
„ rigida Spreng.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ canadensis L.
„ giganteus Wahl.
„ glaucifolius Mühl.
„ mexicanus Cav.
Elymus philadelphicus L.
„ sabulosus M. B.
„ virginicus L.
Eragrostis amabilis L.
„ capillaris Nees.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ maior Host.
„ megastachya Link.
„ nigra Nees.
Festuca alpina L.
„ amethystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ Beckeri Hack.
„ borealis Mert & Koch.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ duriuscula Jacq.
„ elegans Boiss.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ indigesta Boiss.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ „ „ v. glauca Schrad.
„ „ „ v. hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičii Haenkl.
„ Pančičiana M. & J.
„ pratensis Huds.
„ psammophila Hack.
„ Pseudovina Hack.
„ pulchella Schrad.
„ rhoetica Suter.
„ rigida Kunth.
„ rubra L.
„ „ „ v. fallax.
„ „ „ „ heterophylla.
„ silvatica Vill.
„ spectabilis Jan.
„ tenuifolia D. Don.
„ vaginata W. K.
„ varia Haenke.
„ violacea Ser.
Gastridium australe Beauv.
„ lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria convoluta Fries.
„ fluitans R. Br.
„ nemoralis Uechter & Koern.
„ plicata Fries.
Haynaldia villosa Schur.
Hierochloë borealis Roem. & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
„ mollis L.
Hordeum bulbosum L.
„ comosum J. & C. Presl.
„ crinitum Desf.
„ cylindricum Murr.
„ Gussoneanum Parl.
„ jubatum L.
„ murinum L.
„ secalinum Schreb.
Hystrix patula Moench.
Ischnanthus panicoides Beauv.
Koeleria albescens D. C.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ rupicola Boiss. & Reut.
„ splendens Presl.
„ valesiaca Gaud.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lepturus cylindricus Trin.
„ filiformis Trin.
„ pannonicus Kunth.
Lolium canadense Michx.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ eligulata Boiss.
„ hirsuta Koel.
„ maior Sibth. & Sm.
„ nebrodensis Parl.
„ pyramidalis Lam.
„ transsilvanica Schur.
Molinia caerulea Mönch.
„ „ „ v. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia diffusa Willd.
„ glomerata Trin.
Muehlenbergia mexicana Trin.
„ silvatica Torr. & Gray.
Nardurus Lachenalii Godr.
„ tenellus Fries.
Panicum bulbosum H. B. & K. Nov.
„ californicum Benth.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ colonum L.
„ Crus Galli L.
„ „ „ „ v. maior.
„ frumentaceum Roxb.
„ glabrum Gaud.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ miliaceum L. v. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Kcke.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke.
„ sanguinale L.
„ tuberculiflorum Steud.
„ virgatum L.
Paspalum racemosum Lam.
„ tenellum Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris aquatica L.
„ angusta Ness.
„ arundinacea L.
„ „ „ v. picta.
„ brachystachys Link.
„ bulbosa L.
„ canariensis L.
„ coerulescens Desf.
„ minor Retz.
„ paradoxa L.
„ truncata Guss.
Phleum asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ intermedium Jord.

Phleum Michellii All.
„ parnassicum Boiss & Heldr.
„ phalaroides Koel.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ serotinum Jord.
„ tenue Schrad.
Poa alpina L.
„ badensis Haenke.
„ brevifolia D. C.
„ bulbosa L.
„ caesia Sm.
„ cenisia All.
„ compressa L.
„ firmula S. F. Gray.
„ iberica Fisch Mey & Avè-Lall.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ v. rigidula.
„ „ „ „ saxatilis.
„ nevadensis Vasey.
„ pannonica Kern.
„ palustris L.
„ pratensis L.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ versicolor Bess.
Polypogon littoralis Sm.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Sesleria autumnalis F. Schultz.
„ calcarea Opiz.
„ cylindrica D. C.
„ elongata Host.
„ uliginosa Opiz.
Setaria germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ „ „ „ v. breviseta.
„ japònica Pynaert.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus airoides Torr.
„ asper Kunth.
Stipa Aristella L.
„ Calamagrostis Wahl.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
Stipa juncea Sibth.
„ Lagascae Roem. & Schult.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
Trichloris Blanchardiana Hack.
Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L. v. americana.
„ „ „ „ gracillima Koern.
„ „ „ „ japonica.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ rubra.

Irideae.

Crocus speciosus Bieb.
„ viridiflorus Heuff.
Gladiolus palustris Gaud.
Iris cristata Ait.
„ versicolor L.

Juncaceae.

Juncus compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
„ fuscoater Schreb.
„ Gerardi Loisel.
„ glaucus Ehrh.
„ lamprocarpus Ehrh.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ squarrosus L.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ angustifolia Poir.
„ erecta Desv.
„ multiflora Lej.
„ nivea D. C.
„ pallescens Bess.
„ spadicea D. C.

Liliaceae.

Allium ammophilum* Heuff.
„ angulosum L.
„ atropurpureum Waldst. & Kit.
„ atroviolaceum Boiss.
„ azureum Ledeb.
„ baicalense Willd.

Allium caeruleum Pall.
„ Cepa L.
„ fistulosum L.
„ flavum L.
„ hymenorrhizum Ledeb.
„ Kochii Lange.
„ Libani Boiss.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens L.
„ planifolium D. C.
„ Scorodoprasum L.
Anthericum Liliastrum L.
Asphodeline lutea Reichb.
Asphodelus albus Willd.
Bellevalia aleppica Boiss.
Colchicum autumnale L.
„ „ „ v. minor.
„ montanum L.
Crocus iridiflorus Heuff.
„ speciosus Bieb.
Eremurus tauricus Stev.
Fritillaria Meleagris L.
Hyacinthus amethystinus L.
Lilium bulbiferum L.
„ canadense L.
„ pyrenaicum Gouan.
Muscari atlanticum Boiss. & Reut.
„ botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ neglectum Guss.
„ praecox Siehe.
„ racemosum Mill.
Scilla italica L.
Uvularia grandiflora Sm.
Veratrum nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amaranthaceae.

Amaranthus retroflexus L.
„ silvestris Desf.
Celosia cristata L.

Asclepiadeae.

Vincetoxicum canescens Decne.
„ luteum Hoffmgg & Link.
„ nigrum Mönch.

Berberideae.

Berberis serrata Koehne.
„ vulgaris L.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi Bureau & Franch.

Boragineae.

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa Barrelieri Vitm.
„ capensis Thunb.
„ italica Retz.
Anchusa officinalis L.
„ osmanica Vel.
„ paniculata Ait.
Borago officinalis L.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum bicolor Willd.
„ cheirifolium L.
„ officinale L.
„ magellense Lk.
„ tricolor Willd.
Echium rosulatum Lange.
„ vulgare L.
Enchylaena tomentosa R. Br.
Lindelofia longiflora Baill.
Lithospermum latifolium Michx.
„ officinale L.
„ sibiricum Lehm.
Mertensia sibirica G. Don.
Myosotis arvensis Lam.
„ intermedia Link.
„ stricta Link.
Solenanthus mollissimus D. C.

Campanulaceae.

Campanula abietina Griseb-Schenk.
„ alliariaefolia Willd.

Campanula Baumgartenii Becker.
„ barbata L.
„ caespitosa Scop.
„ cordata Peterm.
„ latifolia L.
„ linifolia Scop.
„ macrantha Boiss.
„ nobilis Lindl.
„ Pallasiana Roem. & Schult.
„ pulcherrima Schrank & Zeyh.
„ Rapunculus L.
„ versicolor Sibth. & Sm.
Codonopsis clematidea C. B. Clarke.
Phyteuma campanuloides M. B.
„ serratum Viv.
„ spicatum L.
Podanthum anthericoides Janka.
Specularia castellana Lange.
„ falcata A. D. C.
„ Speculum A. D. C.

Capparidaceae.

Cleome serrata Jacq.
„ viscosa L.

Caprifoliaceae.

Sambucus glauca Nutt.

Caryophylleae.

Agrostemma Coronaria L.
„ Flos-Jovis L.
„ Githago L.
Alsine Bauhinorum J. Gay.
„ graminifolia J. F. Gmel.
„ saxatilis Wahlenb.
Arenaria alpina Willd.
„ grandiflora L.
„ rigida Bieb.
„ serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
„ chloraefolium Fisch. et Mey.
Dianthus calocephalus Boiss.
„ capitatus D. C.
„ campestris M. B.
„ caucasicus Bieb.
Dianthus frigidus Zucc.
„ giganteus Urv.
„ petraeus Walldst & Kit.
„ pubescens Sibth. & Sm.
„ Seguierii Vill.
„ versicolor Fisch.
„ virgineus L.
Eudianthe oculata A. Braun.
Gypsophila altissima L.
„ collina Stev.
„ fastigiata L.
„ paniculata L.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis atropurpurea Nym.
„ chalcedonica L.
„ purpurea Wim.
Melandryum macrocarpum Villk.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ Zawadskii A. Br.
Saponaria Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
„ catholica Ait.
„ caucasica Boiss.
„ flavescens Waldst. & Kit.
„ Sartorii Boiss. & Heldr.
„ Sendtneri Boiss.
„ transsilvanica Schur.
„ viridiflora L.
„ Zawadzkii Herbich.
Spergula arvensis L.
„ „ „ v. maxima Weihe.
„ „ „ „ sativa.
Spergularia laxiflorum Walp.
„ rubra J. & C. Presl.
Viscaria alpina G. Don.
Velezia rigida L.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
Agriophyllum squarrosum Moq.
Ambrina ambrosioides Spach.
„ foetida Moq.
Arthrocnemum macrostachyum Bunge.
Atriplex hortensis L.
Axyris amaranthoides L.
„ hybrida L.

Beta maritima L.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigyna W.-K.
„ vulgaris L. v. altissima.
„ „ „ v. altissima (Chotětov).
„ „ „ v. altissima (Meté).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Elite).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Specialität).
„ „ „ v. altissima (orig. Klein-Wanzleben).
„ „ „ v. altissima (verb. Klein-Wanzleben).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's zuckerreiche).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's ertragreichste).
„ „ „ v. brasiliensis Hort.
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer gelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer weisse).
„ „ „ v. cicla (Eckendorfer rote »Ascania«).
„ „ „ v. cicla (Leutewitzer runde rote).
„ „ „ v. cicla (Leutewitzer runde gelbe).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Flaschen lange dicke weisse).
„ „ „ v. cicla Erfurter Flaschen lange dicke rote).

Beta vulgaris L. v. cicla (Erfurter Modell).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer gelbe).
„ „ „ v. cicla (Oberdorfer rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe).

Blitum capitatum L.

Ceratocarpus arenarius L.

Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ maritimum L.
„ polyspermum L.
„ punctulatum Scop.
„ Quinoa Willd.
„ Vulvaria L.

Corispermum canescens Kit.
„ intermedium Schweig.
„ nitidum Kit.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Hablitzia thamnoides M. B.

Halogeton monandrus C. A. Mey.

Kochia arenaria Roth.

Salsola Kali L.
„ Soda L.

Schizotheca patula Čel.

Spinacia oleracea L. v. inermis.
„ „ „ „ spinosa.

Teloxys aristata Moq.

Cistineae.

Helianthemum alpestre Reichb.
„ Chamaecistus Mill.
„ croceum Pers.
„ grandiflorum D. C.
„ lavandulaefolium Pers.
„ montanum Vis.
„ mutabile Pers.
„ obscurum Pers.
„ pulverulentum D. C.
„ rhodanthum Dum.
„ salicifolium Mill.
„ sanguineum Lag.

Commelinaceae.

Tradescantia undata Humb. & Bonpl.

Compositae.

Achillea clypeolata Sibth. & Sm.
„ ficifolia Bieb.
„ grandifolia Frivald.
„ ligustica All.
„ magna L.
„ pectinata Willd.
„ Ptarmica L.
Achyrachaena mollis Schau.
Ambrosia artemisiaefolia Bess.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis Aizoon Griseb.
„ arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ Bourgaei Boiss. & Reut.
„ Cotula L.
„ nobilis L.
„ parnassica Nym.
„ rigescens Willd.
„ ruthenica M. B.
„ tinctoria L.
Arnica Chamissonis Les.
„ foliosa Nutt.
„ montana L.
Arnoseris pusilla Gärtn.
Artemisia sacrorum Ledeb.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
Broteroa trinervata D. C.
Calendula officinalis L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. & Mey.
Calliopsis bicolor Reichb.
Carlina longifolia Reichb.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit.
„ carniolica Host.
„ Cyanus L.
„ Kotschyana Heuff.
„ lusitanica Boiss et Reut.
„ macrocephala Puschk.
„ orientalis L.
„ rupestris L.
„ Scabiosa L.
Chamaemelum trichophyllum Boiss.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Charieis heterophylla Cass.
Chrysanthemum atratum L.
„ carinatum Schousb.
„ carinatum Schousb. fl. pleno.
„ caucasicum Pers.
„ cinerariaefolium Vis.
„ corymbosum L.
„ macrophyllum W. & K.
„ segetum L.
„ uliginosum Pers.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
Cirsium arvense Scop.
„ crinitum Boiss.
„ ferox D. C.
„ flavispinum Boiss.
Cnicus benedictus L.
Crepis biennis L.
„ blattarioides Vill.
„ sibirica L.
„ virens L.
Crupina vulgaris Cass..
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Echinops bannaticus Rochel.
„ cornigerus D. C.
„ exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ niveus Wahl.
„ Ritro L.
Endoptera aspera D. C.
„ Dioscoridis D. C.
Erigeron alpinus L.
„ alpinus L. v. grandiflorus Hoppe.
„ canadensis L.
„ macranthus Nutt.
„ speciosus D. C.
Eupatorium aromaticum L.
Filago Arvensis L.
„ germanica L.
„ minima Fries.
Gnaphalium luteo-album L.
Guizotia oleifera D. C.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr. & Gray.
Helminthia echioides Gärtn.

Hieracium amplexicaule L.
„ anthracinum D. C.
„ balcanum Uechtr.
„ Bornmülleri Freyn.
„ cerinthoides Sm.
„ cottianum Arv.
„ crinitum Sibth. & Sm.
„ crocatum Fries.
„ decipiens Monn.
„ dovrense Fries.
„ foliosum W.-K.
„ glaucum All.
„ grandidentatum Čel.
„ gymnocephalum Griseb.
„ Heldreichii Boiss.
„ longifolium Hornem.
„ pannosum Boiss.
„ pumilum Jacq.
„ reticulatum Lindeb.
„ rupicum All.
„ saxatile Rchb.
„ Schraderi Schl.
„ strictum Fries.
„ villosum Jacq.
Hypochoeris glabra L.
„ radicata L.
Inula Helenium L.
„ macrocephala Boiss. & Kotschy.
Iva xanthifolia Nutt.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Lactuca altissima Bieb.
„ angustana L.
„ Dregeana D. C.
„ perennis L.
„ sativa L. v. capitata.
„ „ „ „ hiberna.
Lappa crispa Willd.
„ edulis Siebold.
„ tomentosa Lam.
Lapsana communis L.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontodon alpinus Vill.
„ autummalis L.
„ caucasicus M. B.
„ incanus Schrank.
„ proteiformis Vill.
„ pyrenaicus Gouan.
„ squamosus Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
„ „ „ v. himalayanum D. C.
„ sibiricum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
Notobasis syriaca Cass.
Odontospermum maritimum Sch.
Onopordon tauricum Willd.
Palafoxia texana Gray.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
„ tingitanum Desf.
„ vulgare Desf.
Picris amalecitana Boiss.
„ cupuligera Walp.
„ laciniata Vis.
Prenanthes alba L.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pyrethrum carneum M. B.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
Rhagadiolus edulis Gärtn.
Rhaponticum cynaroides Less.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia maxima Nutt.
„ moschata Lodd.
Scorzonera angustifolia L.
„ cana O. Hoffm.
„ hispanica L.
„ purpurea L.
„ rosea W.-K.
„ villosa Scop.
Senecio Jacquinianus Reichb.
„ macrophyllus Bieb.
„ vernalis W. & K.
„ vulgaris L.
Seriola aethnensis L.
Serratula centauroides L.
„ coronata L.
„ gigantea Desf.
„ radiata M. B.
„ Wolffii Andrae.
Sogolgina trilobata Cass.
Sonchus arvensis L.
„ asper All.
„ laevis All.

Sphenogyne anthemoides R. Br.
„ speciosa Hort.
„ versicolor D. C.
Tagetes patula L.
„ „ „ v. nana fl. pl.
„ signata Bartl.
Taraxacum tonebricans Dahl.
Tolpis umbellata Bertol.
Tragopopon pusillus Michx.
„ Tommasinii Schk.
Urospermum picroides F. W. Schmidt.
Ursinia speciosa D. C.
„ virginica L.
Verbesina helianthoides H. B. & K. Nov.
Xanthium orientale L.
„ Strumarium L.
Zacyntha verrucosa Gaertn.

Convolvulaceae.

Convolvulus aegyptius L.
„ rhyniospermus Hochst.
„ tricolor L.
„ undulatus Cav.
Cuscuta corymbosa Choisy. (Linum usitatissimum.)
„ Epilinum Weihe. (Linum usitatissimum.)
„ Gronovii Willd. (Linum usitatissimum, Aster perennis.)
„ Gronovii Willd. v. calyptrata Englm. (Aster perennis.)
„ japonica Choisy. (Aster perennis.)
„ maior D. C. (Humulus lupulus, Urtica dioica.)
„ monogyna Vahl. (Salix amygdalina.)
„ planiflora Tenore. (Urtica maior.)
Ipomaea hederacea Jacq.
„ purpurea Roth.
Nolana prostata L.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
„ cappadocicum Spreng.
Alyssum alpestre L.
„ argenteum Witm.
„ calycinum L.
„ campestre L.
„ repens Baumg.
„ Wulfenianum Willd.
Arabis blepharophylla Hook. & Arn.
„ muralis Bertol.
„ pumila Jacq.
„ saxatilis All.
Aubrietia erubens Griseb.
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella cichoriifolia Loisel.
Brassica japonica Sieb.
„ Napus L. v. oleifera, annua.
1. Alti-sarsa.
2. Balcanora.
3. Bhunri-sarsa.
4. Janda-sarsa.
5. Naldra-sarsa.
6. Piarki-tori.
„ Napus L. v. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.
„ oleracea L. v. gongylodes (Winterkohlrabi).
„ oleracea L. v. gongylodes (Futterkohlrabi).
„ rapa L. v. oleifera D. C., annua.
1. Holland.
2. Schweden.
3. Thüringen.
4. Ungarn.
„ rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1. Awehl.
2. Holstein.
3. Schweden.
4. Thüringen.
5. Uckermark.
Braya supina Koch.
Bunias orientalis L.
Calepina Corvini Desv.

Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ „ „ v. dentata.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
„ grandiflora Boiss.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia anglica L.
„ officinalis L.
Conringia orientalis Dum.
Diplotaxis muralis D. C.
„ Prolongi Boiss.
Draba Aizoon L.
„ verna L.
Eruca cappadocica Reut.
„ sativa Mill.
Erysimum angustifolium R.
„ cheiranthoides L.
„ repandum L.
„ rupestre D. C.
Euclidium syriacum R. Br.
Isatis alpina All.
„ canescens D. C.
„ littoralis Stev.
„ lusitanica Brot.
„ tinctoria L.
Lallemantia canescens Fisch. & Mey.
„ iberica Fisch. & Mey.
Lepidium sativum L.
Matthiola bicornis D. C.
„ parviflora R. Br.
Moricandia hesperidiflora D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer L.
„ raphanistrum L.
„ sativus L. v. niger D. C. annuus.
„ sativus L. v. niger D. C. hiemalis.
„ sativus L. v. niger D. C. hiemalis (Erfurt).
„ sativus L. v. oleiferus.
Rapistrum perenne All.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
Sinapis arvensis L. v. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ incana L.
„ juncea L.
„ nigra L.
Thlaspi arvense L.
„ ceratocarpum Murr.
Vesicaria grandiflora Endl.
Wilckia africana F. Muell.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Cucurbita Pepo L.
„ „ „ v. oviformis.
Cyclanthera explodens Naud.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Sicyos angulata L.

Cupuliferae.

Betula papyracea Ait.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.&Schenk.
Dipsacus atratus Hook.J. & Thoms.
„ fullonum L.
Scabiosa balcanica Velen.
„ caucasica M. B.
„ holosericea Bertol.
„ prolifera L.
„ ucranica L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia L.

Ericaceae.

Bruckenthalia spiculifolia Reichb.
Rhododendron hirsutum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Bornmülleri Hausk.
„ dendroides L.
„ epithymoides L.

Euphorbia exigua L.
„ falcata L.
„ Heldreichii Orph.
„ Ipecacuanha L.
„ Lathyris L.
„ Myrsinites L.
„ Peplis L.
„ platyphylla L.
„ verrucosa Lam.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianeae.

Gentiana acaulis L.
„ alba Mühl.
„ brevidens Franch. & Sav.
„ decumbens L.
„ Fetisowi Regel. & Winkler.
„ Kesselringi Regel.
„ Kurroo Royle.
„ macrophylla Pall.
„ tibetica King.
„ Walujewi Regel. & Schmalh.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.
„ gruinum Ait.
„ malachoides Willd.
„ Salzmanni Delile.

Geranium collinum Steph.
„ columbinum L.
„ dissectum L.
„ nepalense Sweet.
„ pusillum Burm.
„ rivulare Vill.
„ Wallichianum D. Don.
Impatiens biflora Walt.
„ cristata Wall.
„ fulva Nutt.
„ glandulifera Arn.
„ Holstii Engl. & Warb.
„ Roylei Walp.
„ scabrida D. C.
„ tricornis Lindl.
Oxalis corniculata L.

Globulariaceae.

Globularia trichosantha Fisch. & Mey.

Hydrophylleae.

Eutoca Menziesii R. Br.
„ viscida Benth. v. albida.
Phacelia bipinnatifida Michx.
„ circinata Jacq.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.
„ Whitlavia A. Gray.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ chinense Lam.
„ delphicum Boiss. & Heldr.
„ Gebleri C. A. Mey.
„ grandifolium Choisy.
„ pyramidatum Ait.

Illecebraceae.

Scleranthus annuus L.
„ perennis L.

Labiatae.

Amethystea caerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Steph.
„ hirsuta L.
„ officinalis L.
Calamintha Acinos Clair.
„ Clinopodium Spen.
„ Nepeta Savi.
Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
„ peltatum L.
„ peregrinum L.
„ Ruprechti Regel.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ pyrenaica Bartl.
„ Tetrahit L.
Gardoquia betonicoides Lindl.
Hyptis pectinata Poit.

Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. & Mey.
„ iberica Fisch. & Mey.
Leonurus villosus Desf.
Lophanthus chinensis Benth.
Marrubium candidissimum L.
„ leonuroides Desr.
„ vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L. v. piperascens.
„ piperita L.
„ suavis Guss.
„ viridis L.
Monarda Kalmiana Pursh.
„ Russeliana Nutt.
Mosla ocymoides Buch. & Ham.
Nepeta cyanea Stev.
„ nuda L.
„ racemosa Lam.
Ocynum Basilicum L.
Origanum pulchrum Boiss. & Heldr.
„ smyrnaeum L.
„ vulgare L.
Phlomis alpina Poll.
„ armeniaca Willd.
„ tuberosa L.
Prunella australasica Moric.
„ elongata Dougl.
„ incisa Link.
Salvia acaulis L.
„ amarissima Orteg.
„ amplexicaulis Hort.
„ austriaca Jacq.
„ Candelabrum Boiss.
„ candicans Mart. & Gal.
„ chionantha Boiss.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.
„ Horminum L.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ Przewalskii Maxim.
„ Sclarea L.
„ silvestris L.
„ verticillata L.
Satureia hortensis L.
„ marifolia Caruel.
„ montana L.
Scutellaria commutata Guss.
„ minor Huds.
„ orientalis L.
„ splendens Link.
Sideritis hyssopifolia L.
„ syriaca L.
„ taurica Willd.
Stachys annua L.
„ arenaria Vahl.
„ arvensis L.
„ aurea Benth.
„ germanica L.
„ iberica Bieb.
„ leucoglossa Griseb.
„ palustris L.
Teucrium Botrys L.
Thymus citriodorus Schreb.
„ comosus Heuff.
„ Serpyllum L.
„ transsilvanicus Schur.
„ villosus L.
„ vulgaris L.

Leguminosae.

Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ canadensis L.
„ cassubicus Jord.
„ Cicer L.
„ cylindraceus D. C.
„ danicus Retz.
„ Echinus D. C.
„ galegiformis L.
„ Glycyphyllus L.
„ Grahami Steud.
„ gummifer Labill.
„ maximus Willd.
„ Onobrychis L.
„ trimestris L.
Baptisia australis R. Br.
Cicer arietinum L.
„ arietinum L. v. nigrum.
„ arietinum L. v. rotundum.
Colutea alata Koehne.
„ orientalis Lam.
Coronilla vaginalis Lam.
„ varia L.
Cytisus canescens Loisel.
„ nigricans L.
„ Weldeni Vis.

Desmodium canadense D. C.
„ paniculatum D. C.
Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
„ Lablab L.
„ sesquipedalis L.
„ tuberosus Lam.
Ervum abessinicum Hore.
„ Ervilia L.
„ monanthum Desf.
Galega officinalis L.
„ orientalis Lam.
Genista anxantica Tenore.
„ sagittalis L.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Hippocrepis unisiliquosa L.
Krekeria edulis Willk.
Lathyrus alatus Tenore.
„ Aphaca L.
„ articulatus L.
„ Cicera L.
„ cirrhosus Ser.
„ Clymenum L.
„ hirsutus L.
„ latifolius L.
„ maritimus Bigel.
„ montanus Bernh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ palustris L.
„ pisiformis L.
„ pratensis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ tingitanus L.
„ tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus corniculatus L.
„ edulis L.
„ peregrinus L.
Lupinus affinis Agardh.
„ angustifolius L.
„ „ „ v. albus
„ Cruckshauksii Hook.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandiflorus Don.
„ Hilarianus Benth.
„ linifolius Roth.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ polyphyllus Lindl.
„ pulchellus Sweet.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
„ sulphureus Dougl.
Medicago apiculata Willd.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ polycarpa Willd.
„ sativa L.
„ scutellata All.
„ Terebellum Willd.
Melilotus altissima Thuill.
„ segetalis Ser.
„ sulcata Desf.
Onobrychis montana D. C.
„ sativa Lam.
Ononis hircina Jacq.
„ spinosa L.
Ornithopus roseus Duf.
Orobus inconspicuus A. Br.
„ niger L.
„ pusillus Ell.
„ vernus L.
Oxytropis Halleri Bunge.
Phaca astragalina D. C.
Phaseolus aconitifolius Jacq.
„ cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. v. carneus.
„ lunatus L. v. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.

Phaseolus vulgaris L.
„ „ „ v. communis.
„ „ „ v. compressus Mönch.
„ „ „ v. gonospermus Savi.
„ „ „ v. nanus L.
„ „ „ v. nigerrimus Juss.
„ „ „ v. oblongus Savi.
„ „ „ v. tuberosus.
Pisum arvense L.
„ elatum Ser.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Rchb.
„ sativum L.
„ „ „ v. Concentator L.
„ „ „ „ Dickon's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.
Pocockia cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
Soja hispida Mönch. v. nigra.
Tetragonolobus purpureus Mönch.
„ Requienii Fisch. & Mey.
„ siliquosus Roth.
Trifolium agrarium Poll.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ armenium Willd.
„ arvense L.
„ balcanicum Velen.
„ Bocconi Savi.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ pannonicum L.
„ parviflorum Ehrenb.
Trifolium procumbens L.
Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ bithynica L.
„ calcarata Desf.
„ canescens Labill.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ cornigera Chaub.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ dumetorum L
„ Faba L. v. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ Gerardi Jacq.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii P. B.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta Fisch. & Mey.
„ sativa L.
„ „ „ v. dalecarliensis.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ thebanensis.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. B.
„ tetrasperma Mönch.
„ unijuga A. Br.
„ varia Host.
„ villosa Roth.

Linaceae.

Linum africanum L.
„ alpinum L.
„ altaicum Fisch.
„ americanum L. v. album.
„ angustifolium Huds.
„ campanulatum L.

Linum Lewisii Pursh.
„ maritimum L.
„ narbonense L.
„ perenne L.
„ usitatissimum L.
1. crepitans.
2. hibernum.
3. hungaricum.
„ usitatissimum L. (Erfurt).
„ „ „ (Ostindien).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Zeeland).
„ „ „ (Gelbsamiger).
„ tenue Desf.

Lythrarieae.

Lythrum flexuosum Lag.
„ myrtifolium Lodd.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
Althaea Froloviana Fisch.
„ officinalis L.
„ pallida W.-K.
„ rosea Cav.
„ sulphurea Boiss. & Hohen.
Anoda cristata Schlecht.
Hibiscus mutabilis L.
„ Trionum L.
Malope grandiflora T. G. Dietr.
Malva Biasolebtiana Kunze.
„ brasiliensis Desr.
„ calceaefolia Jacq.
„ glomerata Hort.
„ Moreniana Pollini.
„ oxyloba Boiss.
„ rotundifolia Huds.
„ silvestris L.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalappa L.
Oxybaphus floribundus Choisy.

Onagrarieae.

Clarkia elegans Poir.
Epilobium adnatum Griseb.
„ boreale Haus.
„ davuricum Fisch.
„ lanceolatum Sebast & Maur.
„ lividum Haus.
„ nutans F. W. Schmidt.
Eucharidium coccineum Fisch. & Mey.
Godetia gloriosa Hort.
„ Lady Satin Rox.
„ purpurea G. Don.
Kneiffia gracilis Bartl.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
„ Jamesii Torr & Gray.
„ speciosa Nutt.
„ suaveolens Desf.

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk (Vicia Faba).
„ cruenta Bertol (Lotus cormiculatus).
„ flava Mart. (Petasites niveus).
„ ramosa L. (Camabis sativa).

Papaveraceae.

Argemone Barclayana Penny.
„ ochrolenca Sweet.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium laciniatum Mill.
„ maius L.
Corydalis pallida Pers.
Eschscholzia californica Cham.
„ crocea Benth.
Fumaria parviflora Lam.
„ speciosa Jord.
Glaucium elegans Fisch. & Mey.
„ Fischeri Bernh.
„ luteum Scop.
„ phoeniceum Crantz.
„ Serpieri Heldr.
„ squamigerum Kar. & Kir.

Hypecoum pendulum L.
„ procumbens L.
Papaver album L.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ dubium L.
„ Hookeri Baker.
„ hybridum L.
„ orientale L.
„ Rhoeas L.
„ setigerum D. C.
„ somniferum L.
„ splendidissimum Boiss.
Roemeria hybrida D. C.
„ refracta D. C.
„ violacea Medic.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Decne.
„ afra L.
„ alpina L.
„ altissima Loisel.
„ arenaria W. & K.
„ argentea Chaix.
„ Cynops L.
„ Lagopus L.
„ lanceolata L.
„ maior L.
„ media L.
„ montana Lam.
„ patagonica Jacq.
„ Psyllium L.
„ purpurascens Nutt.
„ saxatilis M. B.
„ sericea Ruiz. & Pav.
„ serpentina Lam.
„ subulata L.

Plumbagineae.

Armeria allioides Boiss.
„ cassubica Boiss.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ maritima Willd.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
Gilia achilleaefolia Benth.
Gilia capitata Sims.
„ dianthiflora Benth.
„ grandiflora A. Gray.
„ Liebmanni Lehm.
„ tenuiflora Benth.
Polemonium boreale Adams.
„ coeruleum L.
„ foliosissimum A. Gray.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ pauciflorum S. Wats.
„ pulcherrimum Hook.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Oxyria digyna Hill.
Polygonum aviculare L.
„ Bistorta L.
„ Convolvulus L.
„ Fagopyrum L.
„ Fagopyrum L. v. argenteum.
„ Fagopyrum L. v. emarginatum.
„ japonicum Meissn.
„ lapathifolium L.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ polymorphum Ledeb.
„ tataricum Gärtn.
„ „ „ v. secalinum.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.
„ Rhaponticum L.
„ undulatum L.
Rumex Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ altissimus Wood.
„ cordifolius Hornem.
„ crispus L.
„ Patientia L.
„ Rumex salicifolius Weinm.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
„ grandiflora Lindl.

Portulaca oleracea L.
„ sativa Haw.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schrb.
„ linifolia L.
„ repens Pomel.
Asterolinon stellatum Hoffmgg & Link.
Lysimachia japonica Thunb.
Primula flagellicaulis Kern.
„ leucophylla Pax.
„ media Peterm.
„ officinalis L.
„ orientalis Willd.
„ Paxii W.
„ suaveolens Bertol.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
„ barbatum Patr.
„ Lycoctonum L.
„ variegatum L.
Adonis aestivalis L.
„ autumnalis L.
„ Cupaniana Guss.
„ flammea Jacq.
„ vernalis L.
Anemone borealis Rich.
„ cylindrica A. Gray.
„ dahurica Fisch.
„ decapetala Arduini.
„ Hudsoniana Rich.
„ parviflora Michx.
„ pedata Rafin.
„ pennsylvanica L.
„ pinnatifida Dulac.
„ silvestris L.
„ umbrosa C. A. Mey.
„ virginiana L.
Aquilegia advena Regel.
„ atrata Koch.
„ Bauhini Schott.
„ blanda v. Houtte.
„ canadensis L.
„ caryophylloides L.
„ chrysantha A. Gray.
„ coerulea James.
„ dichroa Freyn.
Aquilegia flavescens S. Wats.
„ nivea Baumg.
„ olympica Boiss.
Caltha palustris L.
Ceratocephalus orthoceras D. C.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
„ asplenifolia Salisb.
Delphinium Ajacis L.
„ bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ dictyocarpum D. C.
„ discolor Fisch.
„ elatum L.
„ fissum Waldst. & Kit.
„ formosum Boiss & Huet.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ Maackianum Rgl.
„ Skinneri Poit.
„ tatsienense Franch.
„ tiroliense Kern.
„ villosum Stev.
Garidella Nigelastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
„ arvensis L.
„ Bourgaei Jord.
„ coarctata C. C. Gmel.
„ corniculata D. C.
„ damascena L.
„ Garidella Spenn.
„ hispanica L.
„ orientalis L.
„ sativa L.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ lobata Pall.
„ peregrina Mill.
„ triternata Pall.
Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
Ranunculus acris L.
„ anemonaefolius D. C.
„ baldschuanicus Regel.
„ brutius Tenore.
„ chaerophyllus L.
„ Chius D. C.
„ millefoliatus Vahl.

Ranunculus sceleratus L.
„ serbicus Vis.
„ trilobus Desf.
Thalictrum alpinum L.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ cinereum Desf.
„ lucidum L.
„ maius L.
„ medium Jacq.
„ minus L.
„ pyrrhocarpum Ckodi.
„ sibiricum L.
Trautvetteria palmata Fisch & Mey.

Resedaceae

Reseda crystallina Webb & Berth.
„ fruticulosa L.
„ Jacquini Rchb.
„ lanceolata Lag.
„ Luteola L.
„ Phyteuma L.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.
„ leucantha Kunze.
„ parviflora Ait.
„ repens L.
Alchemilla arvensis Scop.
Cotoneaster horizontalis Decne.
„ nigra Wahlenb.
Crataegus coccinea L.
Geum album J. F. Gmel.
„ coccineum Sibth & Sm.
„ japonicum Thunbg.
„ magellanicum L.
„ macrophyllum Willd.
„ montanum L.
„ pallidum Fisch. & Mey.
„ pyrenaicum Mill.
„ rubellum Fisch. & Mey.
„ rubifolium Lej.
„ triflorum Pursh.
Potentilla adscharica Sommier & Levier.
„ andicola Benth.
„ atrosanguinea Lodd.
„ elegans Schlecht.
„ geoides Bieb.
Potentilla grandiflora L.
„ Hookeriana Lehm.
„ incanescens Opiz.
„ insignis L.
„ kurdica Boiss & Hohen.
„ maculata Pourr.
„ obscura Willd.
„ pimpinelloides L.
„ pulcherrima Lehm.
„ salisburgensis Haenke.
„ splendens Ram.
„ tanacetifolia Willd.
„ taurica Willd.
„ Wrangeliana Fisch & Avè-Lall.
Poterium agrimonifolium Cav.
„ Magnolii Spach.
„ microphyllum Jord.
„ Sanguisorba L.
„ spinosum L.
„ verrucosum Ehr.
Rosa lucida Andr.
„ nitida Willd.
„ sericea Lindl.
Sanguisorba myriophylla Reichb.
Sibbaldia procumbens L.
Sorbus Aucuparia L.
„ „ „ v. alpina Hort.
„ „ „ fructu dulci.
„ „ „ v. pendula foliis variegatis.
„ Hostii Heynh.
„ hybrida L.
„ intermedia Pers.
Spiraea Douglasii Hook.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub & Spach.
„ hexaphylla All.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst. & Kit.
„ scutellaris Vis.
Crucianella angustifolia L.
Galium album L.
„ Aparine L.
„ aureum Vis.
„ cinereum All.
„ grusinum Trautv.

Galium Kitaibelianum Schult.
„ tricorne With.
„ vernum L.
Sherardia arvensis L.

Selagineae.

Hebenstretia alba Jacq.
„ aurea Andr.
„ comosa Hochst.
„ dentata L.
„ parviflora E. Mey.
„ tenuifolia E. Mey.

Scrophulariaceae.

Alonsoa linifolia Roezl.
Antirrhinum majus L.
„ Orontium L.
„ rupestre Boiss & Reut.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ fulva Lindl.
„ nervosa Steud & Hochst.
„ sibirica Lindl.
„ Thapsi L.
Linaria amethystea Hoffmgg & Link.
„ anticaria Boiss & Reut.
„ arvensis Desf.
„ Pančiči Janka.
„ Perezii J. Gay.
„ spuria Mill.
„ tristis Mill.
„ vulgaris Mill.
Melampyrum *arvense L. (Triticum vulgare).
Nemesia pubescens Benth.
Pentastemon diffusus Dougl.
„ hirsutus Willd.
„ laevigatus Ait.
„ ovatus Dougl.
„ procerus Dougl.
„ roseus G. Don.
Rhinanthus villosus Pers (Triticum vulgare).
Scrophularia chrysantha Jaub. & Spach.
Verbascum glabratum Frivald.
„ nigrum L.
„ orientale Bieb.
„ speciosum Schrad.

Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ Bibersteinii Richter.
„ caucasica Bieb.
„ crassifolia Wierzb.
„ excelsa Desf.
„ fruticulosa L.
„ glauca Sibth. & Sm.
„ incana L.
„ maritima L.
„ orientalis Mill.
„ persica L.
„ petraea Stev.
„ polita Fries.
„ praecox All.
„ ruthenica Roem. & Schult.
„ saturejoides Vis.
„ Teucrium L.
„ triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.
Zaluzianskya selaginoides Walp.

Solanaceae.

Browallia demissa L.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Ceratocaulos daturoides Spach.
Datura Bertolonii Parl.
„ chalybaea Koch.
„ fastuosa L.
„ Leichhardtii F. Muell.
„ muricata Link.
„ Stramonium L.
Dunalia inermis Borzi.
Hyoscyamus niger L.
Lycium rhombifolium Dippel.
Nicandra physaloides Gärtn.
„ violacea Andr.
Nicotiana alata L. & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ Auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.

Nicotiana rustica L.
„ silvestris L.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.

Petunia nyctaginiflora Juss.

Physalis angulata L.
„ peruviana L.

Saracha umbellata G. Don.
„ viscosa Link.

Solanum atropurpureum Schrank.
„ humile Bernh.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L. v. alba.

Umbelliferae.

Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
„ officinalis Hoffm.

Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
„ major L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum buriacticum Turcz.
„ Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Cerefolium sativum Bess.
Chaerophyllum bulbosum L.
Cnidium apioides Spreng.
Conium maculatum L.
Coriandrum melphitense Ten. & Guss.
„ sativum L.
Daucus carota L.
„ „ „ v. rubra.
„ hispanicus D. C.
Didiscus pilosus Benth.

Eryngium amethystinum L.
„ Billardieri Delar.
„ eburneum Decne.
„ Oliverianum Delar.

Ferula thyrsiflora Sibth. & Sm.

Foeniculum dulce Mill.
„ officinale All.

Hasselquistia cordata Jacq.

Heracleum auritum Bischoff.
„ persicum Desf.
„ ternatum Velen.

Laserpitium Panax Gouan.

Levisticum officinale Koch.

Lophosciadium meifolium D. C.

Myrrhis odorata Scop.

Neogaya mucronata Schrenk.

Oenanthe Phellandrium Low.

Palimbia salsa Bess.

Pastinaca lucida L.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum austriacum Koch.

Pimpinella magna L.

Prangos thapsioides D. C.

Scandix Pecten Veneris L.

Seseli glaucum Bieb.
„ gracile Waldst & Kit.
„ rigidum Waldst & Kit.

Silaus alpestris Bess.
„ flavescens Bernh.
Siler trilobum Crantz.
Sium lancifolium Bieb.
„ Sisarum L.
Zizia aurea Koch.

Urticaceae.

Cannabis gigantea Vass.
„ indica Lam.
„ sativa L.
„ „ „ v. himalayna Hort.

Urtica Dodartii L.
„ gracilis Ait.
„ palmata Forsk.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Fedia scorpioides Dufr.

Valerianella coronata D. C.
„ eriocarpa Desv.
„ olitoria Pollich.
„ rimosa Bast.
„ truncata Betcke.
„ uncinata Dufr.

Verbenaceae.

Schuttleworthia pulchella Meissn.
Verbena biserrata H. B. & K. Nov.
„ hastata L.
„ stricta Vent.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola bicolor Gilib.
„ biflora L.
Viola dactyloides Roem. & Schult.
„ Jooi Janka.
„ labradorica Schrank.
„ latisepala Wettst.
„ lusitana Brot.
„ pinnata L.
„ pinnatifida All.
„ primulifolia L.
„ suavis Bieb.
„ tricolor L. v. arvensis.

□ □ □

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb. v. picta.
Begonia nelumbiifolia Cham. & Schlecht.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia corallina Hort.
„ corymbiflora Ruiz. & Pav.
„ gracilis Lindl.
Kleinia articulata Harw.
Libonia floribunda C. Koch.
Mackaya bella Harw.
Mesembryanthemum anceps Haw.
„ aureum L.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ caulescens Mill.
„ crassulinum Spreng.
„ deltoides L.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl. & Zeyh.
„ spectabile Haw.
Mesembryanthemum splendens L.
„ subincanum Haw.
„ Thunbergii Haw.
„ violaceum D. C.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ophiopogon japonicus Ker. & Gawl.
„ Jaburan Lodd.
Pilea muscosa Lindl.
Polypodium Lingua.
Reineckia carnea Kunth.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Sansevieria guineensis Willd.
„ thyrsiflora Thunb.
„ zeylanica Willd.
Saxifraga sarmentosa L.
Sedum Sieboldi Hort. fol. med. pictis.
„ Stahlii Hort.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ Martensii Spring.
„ uncinata Spring.
Teucrium Marum L.
Tradescantia zebrina Hort.
Veronica Traversii Hook.
Zingiber Zerumbet Rosc.

Tábor in Bohemia, 15. die m. Decembris 1912.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

J. Svoboda,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

Frank, Tábor.

QK73
.T32
T33

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

VIII.

Delectus seminum plantarum

anno 1913 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Aroideae.

Calla palustris L.

Cyperaceae.

Carex adusta Boott.
„ arenaria L.
„ atrata L.
„ brevicollis D. C.
„ caucasica Stev.
„ cephalophora Muhl.
„ contigua Hoppe.
„ distans L.
„ divulsa Good.
„ elongata L.
„ frigida All.
„ glauca Murr.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ lamprocarpa Čel.
„ leporina L.
„ mirabilis Host.
Carex multiflora Wahlenb.
„ muricata L.
„ nodiflora Boeck.
„ nubigena D. Don
„ ovata Burm.
„ pallescens L.
„ panicea L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ Pseudo-cyperus L.
„ remota L.
„ rhynchophysa Fisch. Mey & Avé-Lall.
„ riparia Curt.
„ secalina Wahl.
„ sempervirens Willd.
„ stenophylla Wahlenb.
„ variabilis L. H. Bailey.
„ vesicaria L.
„ vulpina L.
Cyperus fuscus L.
„ flavescens L.
Eriophorum alpinum L.
Scirpus lacustris L.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch.
„ fatua L.
„ nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ „ for. mutica.
3. „ obtusata All. alba (Hungaria).
4. „ a) pugnax Al.
   b) „ „ (Polend).
5. „ a) tatarica (Germania).
   b) „ (Rossia).
   c) „ (Selchov).
6. „ a) tristis Al. (Hungaria).
   b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke. (Bourbon).
   b) „ „ (Osetia Caucasus).
   c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ montana Alef.
7. „ mutica Alef.
   a) Anglia.
   b) arenaria.
   c) Barnstaedt.
   d) Belgium.
   e) Caucasus.
   f) Fennia.
   g) Hirsch.
   h) Landa's Grün-Hafer.
   i) Lapponia.
   j) Leutewitz.
   k) Ligowo.
   l) Oderbuch.
   m) Podolia.
   n) Polonia.
   o) Probstei.
   p) Romania.
   r) Silesia.
   s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
   b) „ „ (Fennia).
   c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langethal (Australia).
   b) praegravis Langethal (Germania).
   c) „ Langethal (Scotia).
   d) „ Langethal (Willkommen).
10. „ setosa Kcke.
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
    b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
   a) Altona.
   b) Dania.
   c) Imperial.
   d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
   a) Bavaria.
   b) Bestehorn.
   c) Chevalieri.
   d) Chile.
   e) giganteum.
   f) Hierosolyma.
   g) Landa's Porter.
   h) Melonen Gerste.
   i) Philadalphia.
   j) Phoenix.
   k) Probstei.
   l) Nolč's Imperial Typ A.
   m) „ „ „ B.
   n) „ „ „ C.
   o) „ Bohemia Gerste.
   p) „ böhmische früheste.

Hordeum distichum L.
8. „ spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.
1. var. a) parallelum Kcke.
a) „ „ (himalayense).
c) parallelum Kcke. (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
a) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.
1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
a) Italia.
b) Marocco.
c) Mandschuria.
d) Norvegia.
e) Peru.
f) Rimpaui.
g) Cyprus.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).
b) „ Kcke (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.
a) album, furcatum, nudum, distichum.
b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.
a) Brandeburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.
1. var. clavatum Alef.
2. „ a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
b) creticum Mazz. (Palermo).
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ brunneum Alef.
4. „ campylodon Kcke.
5. „ cladurum Alef.
6. „ farrum Bayle.
7. „ Fuchsii Kcke.
8. „ Krausei Alef.
9. „ liguliforme Kcke.
10. „ pycnurum Alef.
11. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
12. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.

a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.

1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7. „ leucomelan Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadovska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Tricitum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.

1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. var. chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
   b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Samm-.tiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.

a) Běloturka (gub. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.

1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestersenі.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ caesium Alef.
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
   a) aristatum.
   b) Petali.
   c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
   a) Hunderttägig.
   b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ Hostianum Clem.
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).

Triticum vulgare L.

13. var. muticum Bayle.
    a) Australia.
    b) California.
    c) Heine's W.
    d) Noë's W.
    e) Schlandstaedt.
    f) Slané (Bohemia).
14. „ pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

a) gigentea.
b) Sibiria.

1. var. a) aurea Kcke. (Mönchhafer).
   b) aurea Kcke. (Ardtii).
2. „ grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum hexastichum L.

1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum (ertragreichste).
   b) giganteum Chrestenseni (verbesserte).
   c) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ luteum.
4. „ nigrum.

Hordeum tetrastichum L.

a) Alberti.
b) Chrestenseni.
c) Groeningense.
d) luteum.
e) Mammuth.

1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
15. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's- R.
18. Chrestensen's-R. giganteum.
19. Chrestensen's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harz).
21. Riesen-Staudenroggen.
22. Landa's Hannibal R.
23. Colossal- hybridum.
24. Buhlendorf.
25. Altpaleschkener R.
26. Hadmersleben.
27. Trispermum.
28. Wasa.
29. St. Johannis.
30. Nyland.
31. Schlaraffen-Roggen.
32. Zeelander Original.
33. Hungaria.
34. Mährischer Stauden-R.
35. Mumien-R.
36. Bric.
37. Petkuss.
38. Rügenscher R.
39. Hessischer Garde du Corps.
40. Correns Stauden-R.
41. Hispanicum.
42. Suecicum.
43. Banaticum.
44. Schlanstaedt, giganteum.
45. Champagner Stauden-R.
46. Alpinum.
47. März.
48. Romanum.
49. Montagner Degenerirter Riesen R.
50. Chrestensen's Triumph R.
51. Branisch Excelsior R.
52. Chrestensen's Kolben R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.
„ „ „ **Binkel W.**

Triticum compactum Host. var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

„ dicoccum Schr. var. nigrum (Amidonnier).
„ dioccum Schr. var. tricoccum Schübl.
„ dicoccum Schr. Schwarzer sammetiger W.
„ dicoccum Schr. v. Bauhini Al. (Roter sammetiger W.).
„ dicoccum Schr. var. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. coeruleum Al. (Kolben W.).
6. dasyanthum.
7. erubescens aristatum.
8. rubrum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. „ centigrammum.
3. „ compositum (velutinum).
4. „ „ (Mirakel).
5. „ dinura Al. (Helena).
6. „ gentile Al. (Blé poulard blanc lisse on carré).
7. „ graecum (Korinthus).
8. var. jodura Al. (Blauer sammetiger W.).
„ jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.).
„ jodura Al. (Paines Defiance).
„ jodura Al. (Riwet's Grannen-W.).
„ jodura Al. (Schottischer rauher Winter W.).
9. „ melanatherum Kcke. (Petanielle noir de Nice).
10. var. mirabile Kcke. (Ihrwetter)
„ „ „ (Schwarzer sammetiger Wunderweizen).
11. „ pseudo-cervinum Kcke.

Triticum vulgare L.

var. alborubrum Kcke.
1. Heine's Molds red prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red chaff de Dantzick.

var. aristatum Schübl.
1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square-head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Persischer schwarzer W.
12. Golden Cross.
13. Japonischer W.
14. Johnson's W.
15. Nouette de Lausanne.
16. Russischer W.
17. Schwarzer persischer W.
18. Robert's W.
19. Chrestensen's Square-head.
20. Michigan bronce.

var. cyanothrix Kcke.

var. erythrospermum Kcke.
1. Bestehorn's W.
2. Horfords Michigan bronce.
3. Kis-Tur (Hungaria).

Triticum vulgare L.

var. ferrugineum Al.

1. Rimpau's-W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerirter W.
3. Fuchs W.

var. lutescens Al.

1. Juli W.
2. Lammas.
3. Kaiser W.

var. miltura Al.

1. Hallet's red. Nursery.
2. Blé rouge de St. Land.
3. Cover's red. Wheat.
4. Spalding prolific Wheat.

var. muticum Bayle.

1. Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam Wheat.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomír Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoba.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. Probsteier.
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's No. 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Spalding's prolific.
43. Browick red.
44. Bestehorn's Dividendenw.
45. Red Mary gold.
46. Browick red rubrum.
47. Schariff's Square head, Orig.
48. Besseler's Square head.
49. Kirsche's Square head.
50. Mette's Square head.
51. Strube's Square head.
52. Breustedt's kurzer Square h.
53. Anderbeck Square head.
54. Leutewitz Square head.
55. Bore-Svalöf.
56. Extra Svalöf Square head.
57. Original Schiriffw.
58. Böhmischer roter Wechselw.
59. North Allerton.
60. Johns Winter Sive.
61. Englischer brauner W.
62. Böhmischer sammetiger Kolben W.
63. Aleph.
64. Richelle blanc de Naples.
65. Rouge inversable.
66. Schottischer blutroter.
67. Massey.
68. Hunter's White Wheat.
69. Smogger-W.
70. Romanella.
71. Talavera.
72. Horfords Winter Perl.
73. Feuton.
74. Ungarischer roter.
75. Chiddam weisser Ürbst.
76. Hybridi inversable.
77. Schilf-W.
78. Amerik. Willits.
79. Preis von Oxford.
80. Urtoba.

Triticum vulgare L.

81. Marenil.
82. Blé Talavera de Bellevue.
83. De Blaic.
84. Blanc a duvet veloute.
85. Manhattan.
86. Victoria d'Autome.
87. Braunähriger Märkischer-W.
88. Golden Drop (verbessert).
89. Flandrischer-W.
90. White Trump.
91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
92. Chrestensen's róter Dividendenweizen.
93. Griewenner Weizen.
94. Elys.
95. De Crepi.
96. Hopetoum Wheat.
97. Briguet.
98. Galland.
99. Hickling's W.
100. Dattelweizen.
101. Blausamtiger Kolben W.
102. Weizen Roggen.

var. villosum Al.

1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.

var. pyrothrix Al.

1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
2. Sammetiger Square-head.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ macrura Jaub. & Spach.
„ ovata L.
„ squarrosa L.
„ speltoides Tausch.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.

Agrostis canina L.
„ dispar Michx.
„ interrupta L.
„ laxiflora Poir.
„ nebulosa Boiss. & Reut.
„ rupestris All.
„ Spica-venti L.

Agrostis stolonifera L.
„ „ „ var. gigantea Gaud.
„ vulgaris With.

Aira bottnica Wahlenb.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ mollis Schreb.

Alopecurus agrestis L.
„ arundinaceus Poir.
„ brachystachyus Bieb.
„ bulbosus Poir.
„ castellanus Boiss & Reut.
„ fulvus Sm.
„ geniculatus L.
„ lasiostachyus Link.
„ nigricans Horn.
„ pratensis L.

Andropogon argenteus D. C.
„ Gryllus L.
„ halepensis Brot.

Anthoxanthum odoratum L.
„ ovatum Lag.

Arrhenatherum avenaceum P. B.

Atropis distans Griseb.

Avellinia Michelii Parl.

Avena brevis Roth.
„ bromoides Gouan.
„ desertorum Less.
„ Hostii Boiss-Reut.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sempervirens Vill.
„ sterilis L.
„ strigosa Schreb.
„ sulcata J. Gay.
„ versicolor Vill.

Boissiera bromoides Hochst. & Steud.

Brachypodium gracile Beauv.
„ pinnatum P. B.
„ silvaticum Beauv.

Briza maxima L.
„ media L.
„ rufibarba Boiss.

Bromus arvensis L.
„ asper Murr.

Bromus brachystachys Horn.
„ brizaeformis Fisch. & Mey.
„ caprinus Kern.
„ ciliatus L.
„ commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ inermis Leyss.
„ laxus Reichb.
„ longiflorus Spreng.
„ macranthus Meyen.
„ madritensis L.
„ marginatus Steud.
„ mollis L.
„ patulus M. & K.
„ racemosus L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
„ uniloides H. B. & K. N.
Calamagrostis arundinacea Roth.
„ Halleriana D. C.
„ lanceolata Roth.
„ lapponica Hartm.
„ montana D. C.
Catabrosa aquatica P. B.
Catapodium tuberculosum Moris.
Cinna mexicana Beauv.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus echinatus L.
„ siculus Lk.
Dactylis Aschersoniana Gräb.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia juncea Beauv.
Digitaria eriogona Link.
Digitaria sanguinalis Scop.
„ horizontalis Willd.
Eleusine oligostachya Link.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ mexicanus Cav.
„ sabulosus M. B.
„ virginicus L.
Eragrostis chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ minor Host.
„ nigra Nees.
„ pilosa Beauv.

Festuca alpina L.
„ amethystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ Beckeri Hack.
„ borealis Mert & Koch.
„ bromoides L.
„ Crinum-ursi Ramond.
„ duriuscula Jacq.
„ elegans Boiss.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ indigesta Boiss.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ „ „ v. glauca Schrad.
„ „ „ v. hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičii Haenkl.
„ Pančičiana M. & J.
„ pratensis Huds.
„ psammophila Hack.
„ Pseudovina Hack.
„ pulchella Schrad.
„ rhoetica Suter.
„ rigida Kunth.
„ rubra L.
„ „ „ v. fallax.
„ „ „ „ heterophylla.
„ silvatica Vill.
„ spectabilis Jan.
„ tenuifolia D. Don.
„ vaginata W. K.
„ varia Haenke.
„ xanthina Roem & Schulz.
Gastridium australe Beauv.
„ lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloë borealis Roem. & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
„ mollis L.
„ tuberosus Salzm.

Hordeum bulbosum L.
„ jubatum L.
„ murinum L.
„ nodosum L.
„ secalinum Schreb.
Hystrix patula Moench.
Ischnanthus panicoides Beauv.
Koeleria albescens D. C.
„ alpicola Gren & Godr.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirtusa Gaud.
„ rupicola Boiss. & Reut.
„ splendens Presl.
„ valesiaca Gaud.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lolium linicolum A. Br.
„ remotum Schrk.
„ rigidum Gaud.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ eligulata Boiss.
„ nebrodensis Parl.
„ pyramidalis Lam.
„ transsilvanica Schur.
Molinia caerulea Mönch.
„ „ „ v. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia diffusa Willd.
„ silvatica Todrr. & Gray.
Nardurus Lachenalii Godr.
Panicum altissimum Jacq.
„ bulbosum H. B. & K. Nov.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ Crus Galli L.
„ „ „ „ v. maior.
„ glabrum Gaud.
„ italicum L.
„ miliaceum L. v. badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
Panicum miliaceum L. v. nigrum Kcke.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
„ „ „ „ subsanguineum Kcke.
„ sanguinale L.
Paspalum racemosum Lam.
Phalaris angusta Ness.
„ aquatica L.
„ arundinacea L.
„ „ „ v. picta.
„ brachystachys Link.
„ bulbosa L.
„ canariensis L.
„ coerulescens Desf.
„ minor Retz.
„ paradoxa L.
„ truncata Guss.
Phleum asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ intermedium Jord.
Phleum Michellii All.
„ parnassicum Boiss & Heldr.
„ phalaroides Koel.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ serotinum Jord.
„ tenue Schrad.
Poa abyssinica Jacq.
„ alpina L.
„ badensis Haenke.
„ brevifolia D. C.
„ bulbosa L.
„ caesia Sm.
„ cenisia All.
„ compressa L.
„ firmula S. F. Gray.
„ iberica Fisch Mey & Avè-Lall.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ v. rigidula.
„ „ „ „ saxatilis.
„ nevadensis Vasey.
„ palustris L.

Poa pannonica Kern.
„ pratensis L.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.
„ versicolor Bess.
„ violacea Gaud.
Psilurus nardoides Trin.
Sclerochloa philistaea Steud.
Sesleria robusta Schott.
„ uliginosa Opiz.
Setaria italica P. B.
„ „ „ „ v. breviseta.
„ japonica Pynaert.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
Stipa Calamagrostis Wahl.
„ calatajeronensis Tineo.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
„ juncea Sibth.
„ Lagascae Roem. & Schult.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
Trisetum alpestre Beauv.
„ distichophyllum Beauv.
„ pratense Pers.
Triticum caninum Schreb.
„ imbricatum Bieb.
„ petraeum Vis & Panč.
Ventenata avenacea Koel.
Zea mais L. v. japonica.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ Novoboracensis.
„ „ „ „ Yellow.

Irideae.

Crocus viridiflorus Heuff.
Gladiolus palustris Gaud.
Iris anglica Hort.
„ cristata Ait.
„ ochroleuca L.
„ setosa Pall.
„ sibirica Hook & Arn.
„ versicolor L.

Juncaceae.

Juncus bufonius L.
„ compressus Jacq.
„ effusus L.
„ fuscoater Schreb.
„ glaucus Ehrh.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ squarrosus L.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ multiflora Lej.
„ spadicea D. C.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atroviolaceum Boiss.
„ baicalense Willd.
„ fistulosum L.
„ giganteum Regel.
„ hymenorrhizum Ledeb.
„ Kochii Lange.
„ Ledebourianum Schult.
„ Libani Boiss.
„ narcissiflorum Vill.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens L.
„ Scorodoprasum L.
„ tulipaefolium Ledeb.
Anthericum Liliastrum L.
Asphodelus albus Willd.
Colchicum autumnale L.
Convallaria racemosa L.
Crocus iridiflorus Heuff.
Fritillaria Meleagris L.
Hyacinthus amethystinus L.
„ azureus Backer.
Scilla italica L.
Tulipa florentina Hort.
„ Sprengeri Backer.
Veratrum nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amaranthaceae.

Albersia Blitum Kunth.
Amaranthus albus L.
" atropurpureus Roxb.
" caudatus L.
" " " v. albiflorus Moq.
" " " v. sanguineus Vall.
" flavus L.
" paniculatus L.
" patulus Bertol.
" retroflexus L.
" silvestris Desf.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia cristata L.
Deeringia falcata Moq.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus crispus Less.
" emarginatus A. Br. & Bouché.
Scleropus crassipes Moq.

Berberideae.

Berberis vulgaris L.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi Bureau & Franch.

Boragineae.

Alkanna tinctoria Tausch.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa italica Retz.
" hybrida Tenore.
" officinalis L.
" osmanica Vel.
" stylosa Bieb.
Borago caucasica Fisch.
Borago officinalis L.
Cerinthe maculata L.
Cynoglossum cheirifolium L.
" Columnae Bivona.
" montanum L.
Cynoglossum officinale L.
" magellense Lk.
Echium plantagineum L.
" vulgare L.
Lappula echinata Gilib.
" Myosotis Moench.
Lindelofia longiflora Baill.
" spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
" officinale L.
" sibiricum Lehm.
Myosotis arvensis Lam.
" intermedia Link.
Nonnea pulla D. C.
Paracaryum angustifolium Boiss.
" caelestinum Benth & Hook.
Rindera canescens DC.
Solenanthus mollissimus D. C.

Campanulaceae.

Adenophora Lamarkii Fisch.
" latifolia Fisch.
Campanula abietina Griseb-Schenk.
" aggregata Willd.
, alliariaefolia Willd.
" cordata Peterm.
" latifolia L.
" linifolia Scop.
" macrantha Boiss.
" Medium L.
" nobilis Lindl.
" Rapunculus L.
" Trachelium L.
Glosocomia clematidea Fisch, Mey & Vvé-Lall.
Jasione humilis Loisel.
Legousia Speculum Fisch.
Phyteuma canescens Waldst & Kit.
" Carestiae Biroli.
" Halleri All.
" serratum Viv.
" spicatum L.
Specularia Speculum A. D. C.
Wahlenbergia gracilis E. Mey.
" nutabunda A. D. C.

Capparidaceae.

Cleome violacea L.

Caprifoliaceae.

Sambucus glauca Nutt.

Caryophylleae.

Agrostemma Coronaria L.
„ Flos-Jovis L.
„ Githago L.
„ Walkeri Hort.
Alsine Jacquini Koch.
„ saxatilis Wahlenb.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium pensylvanicum Hornem.
„ triviale Link.
Dianthus calocephalus Boiss.
„ campestris M. B.
„ caucasicus Bieb.
„ glacialis Haenke.
„ montanus Bieb.
„ petraeus Walldst & Kit.
„ pubescens Sibth. & Sm.
„ Seguierii Vill.
„ versicolor Fisch.
„ virgineus L.
Gypsophila altissima L.
„ fastigiata L.
„ muralis L.
„ paniculata L.
Kohlrauschia prolifera Kunth.
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.
Lychnis chalcedonica L.
„ cruenta Griseb.
„ Haageana Regel.
Melandryum macrocarpum Villk.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ Zawadskii A. Br.
Saponaria depressa Bivona.
„ glaberrima Ser.
„ persica Boiss.
Silene alpestris Jacq.
„ apetala Willd.
„ Fabaria Sibth & Sm.
„ gigantea L.
„ Muscipula L.
„ nocturna L.
Silene petraea Adam.
„ Salzmanni Otth.
„ Sartorii Boiss. & Heldr.
„ sedoides Jacq.
„ transsilvanica Schur.
„ viridiflora L.
Spergula arvensis L.
„ „ „ v. maxima Weihe.
„ „ „ „ sativa.
„ pilifera D. C.
Spergularia laxiflorum Walp.
„ rubra J. & C. Presl.
Vaccaria grandiflora Jaub & Spach.
„ parviflora Moench.
Viscaria alpina G. Don.
„ atropurpurea Griseb.
„ Sartorii Boiss.
Velezia rigida L.

Celastrineae.

Celastrus scandens L.
Euonymus latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Ambrina ambrosioides Spach.
Arthrocnemum glaucum Delile.
„ macrostachyum Bunge.
Atriplex hortensis L.
„ nitens Schkuhr.
Beta maritima L.
„ orientalis Roth.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigyna W.-K.
„ vulgaris L. v. altissima.
„ „ „ v. altissima (Chotětov).
„ „ „ v. altissima (Meté).
„ „ „ v. altissima (Schreiber's Elite).
„ „ „ v. altissima (verb. Klein-Wanzleben).
„ „ „ v. altissima (Wohanka's zuckerreiche).

Beta vulgaris L. v. altissima. (Wohanka's ertragreichste).
„ „ „ v. brasiliensis Hort.
„ „ „ v. cicla (Leutewitzer runde rote).
„ „ „ v. cicla (Leutewitzer runde gelbe).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe walzenförmige).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte rote).
„ „ „ v. cicla (Erfurter lange glatte gelbe).
„ „ „ v. cicla (Erfurter Flaschen lange dicke weisse).
„ „ „ v. cicla Erfurter Flaschen lange dicke rote).
„ „ v. cicla (Mammut, lange rote).
„ „ „ v. cicla (Olivenförmige orangegelbe).
„ „ v. cicla rubra (Salatrübe).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
„ intermedium Schweig.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia thamnoides M. B.
Polycnemum arvense L.
Salsola Kali L.
„ Soda L.
Schizotheca patula Čel.
Spinacia oleracea L. v. inermis.
„ „ „ „ spinosa.

Cistineae.

Helianthemum Chamaecistus Mill.
„ hirsutum Dun.
„ lavandulaefolium Pers.
„ ledifolium Mill.
„ obscurum Pers.
„ pulverulentum D. C.
„ rhodanthum Dun.
„ roseum Mill.
„ salicifolium Mill.
„ venustum Sweet.

Compositae.

Achillea grandifolia Frivald.
„ magna L.
„ pectinata Willd.
„ sudetica Opiz.
„ sulphurea Boiss.
Achyrachaena mollis Schau.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ Cotula L.
„ mixta L.
„ nobilis L.
„ ruthenica M. B.
„ tinctoria L.
Arnica montana L.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
Calendula officinalis L.
„ stellata Cav.
Calimeris incisa D. C.
Carbenia benedicta Adans.
Carduus Kerneri & Simonk.
„ leptophyllus Turcz.
„ pycnocephalus L.
„ rhodopeus Velen.
Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit.
„ aurea DC. v. glabrata.
„ calocephala Willd.
„ Cyanus L.
„ Kotschyana Heuff.
„ lusitanica Boiss et Reut.
„ macrocephala Puschk.
„ melitensis L.
„ orientalis L.

Centaurea rupestris L.
„ sulphurea Willd.
Chamaemelum trichophyllum Boiss.
Chamaepeuce afra D. C.
Chrysanthemum atratum L.
„ carinatum Schousb.
„ carinatum Schousb. fl. pleno.
„ caucasicum Pers.
„ cinerariaefolium Vis.
„ corymbosum L.
„ inodorum L. v. plenissimum.
„ macrophyllum W. & K.
„ segetum L.
„ Tanacetum Vis.
„ uliginosum Pers.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
„ Intibus L. culta (Badische walzenförmige).
Cirsium crinitum Boiss.
„ ferox D. C.
„ flavispinum Boiss.
„ gigantum Spreng.
„ lappaceum Fisch.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
„ lanceolata L.
„ tinctoria Nutt.
Corvisartia Helenium Mérad.
Crepis rigida Waldst. & Kit.
„ rubra L.
„ sibirica L.
„ virens L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops bannaticus Rochel.
„ cornigerus D. C.
„ exaltatus Schrad.
„ microcephalus Sibth. & Sm.
„ sphaerocephalus L.
„ niveus Wahl.
„ Ritro L.
Eclipta erecta L.
Endoptera aspera D. C.
Erigeron canadensis L.
„ Coulteri Porter & Coulter.
„ elongatus Ledeb.
„ macranthus Nutt.
„ speciosus D. C.
Eupatorium aromaticum L.
„ cannabinum L.
Filago Arvensis L.
„ minima Fries.
Gailardia pulchella Fouger v. picta.
Gnaphalium luteo-album L.
„ norvegicum Gunn.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera D. C.
Hedypnois cretica Willd.
„ polymorpha D. C.
Helianthus annuus L.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium amplexicaule L.
„ argenteum Fries.
„ atratum Fries.
„ balcanum Uechtr.
„ Bornmülleri Freyn.
„ cottianum Arv.
„ crinitum Sibth. & Sm.
„ crocatum Fries.
„ foliosum W.-K.
„ longifolium Hornem.
„ pallidum Biv.
„ pannosum Boiss.
„ rigidum Hartm.
„ saxatile Rchb.
„ villosum Jacq.
Hypochoeris glabra L.
„ radicata L.
Inula Helenium L.
„ macrocephala Boiss. & Kotschy.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Lactura alpina Beuth & Hook.
„ virosa L.
Lappa crispa Willd.
„ edulis Siebold.
„ tomentosa Lam.
Lapsana communis L.
„ intermedia Bieb.
Lasthenia glabrata Lindl.

Leontodon alpinus Vill.
" autummalis L.
" incanus Schrank.
" proteiformis Vill.
" pyrenaicus Gouan.
" squamosus Lam.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepachys pinnatifida Rafin.
Leucanthemum maximum D. C.
Ligularia macrophylla D. C.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
" inodora L.
Odontospermum maritimum Sch.
Onopordon arenarium Pomel.
" macrocanthum Schousb.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
" tingitanum Desf.
" vulgare Desf.
Picris echioides L.
" stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes alba L.
Ptarmica speciosa D. C.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pyrethrum carneum M. B.
" Parthenium Sm.
" Tchihatchewii Hort.
Rhagadiolus edulis Gärtn.
Rhaponticum pulchrum Fisch. & Mey
Rudbeckia maxima Nutt.
" moschata Lodd.
Santolina Chamaecyparissus L.
Saussurea albescens Hoof & Thoms.
Scorzonera cana O. Hoffm.
" hispanica L.
" purpurea L.
" rosea W.-K.
" tuberosa Pall.
Senecio vernalis W. & K.
" vulgaris L.
Serratula centauroides L.
" coronata L.
" gigantea Desf.
" radiata M. B.
" rhapontica D. C.
" tinctoria L.
" Wolffii Andrae.
Siegebeckia flosculosa L'Hérit.
Sonchus arvensis L.
" asper All.
" laevis All.
Taraxacum apenninum D. C.
" tenebricans Dahl.
Tolpis umbellata Bertol.
Tragopogon brevirostris D. C.
" porrifolius L.
" Tommasinii Schk.
Troximon grandiflorum A. Gray.
Tussilago Farfara L.
Urospermum picroides F. W. Schmidt.
Ursinia speciosa D. C.
" virginica L.
Verbesina helianthoides H. B. & K. Nov.
Volutarella Lippii Cass.
Xanthium macrocarpum D. C.
" spinosum L.
" Strumarium L.
Zacyntha verrucosa Gaertn.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet.
Calonyction speciosum Choisy.
Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus aegyptius L.
" elongatus Willd.
" grandiflorus L.
" libanoticus Boiss.
" pentapetaloides L.
" Soldanella L.
" undulatus Cav.
Cuscuta glomerata Choisy. (Aster perennis)
" Gronovii Willd. (Linum usitatissimum, Aster perennis.)
" Gronovii Willd. v. calyptrata Englm. (Aster perennis.)
" japonica Choisy. (Aster perennis.)
" maior D. C. (Humulus lupulus, Urtica dioica.)
" planiflora Tenore. (Urtica maior.)
Dichondra argentea Willd.

Ipomaea cordigera Mart.
„ purpurea Roth.
„ sibirica Pers.
„ zebrina Pers.
Jacquemontia montana Meissn.
Pharbitis hispida Choisy.

Coriariaceae.

Coriaria japonica A. Gray.

Crassulaceae.

Sedim Alberti Regel.
„ Anacampseros L.
„ glaucum Walst & Kit.
„ purpureum Link.
„ Selskianum Regel & Maack.
Sempervivum kopaonikense Panč.
„ pumilum Bieb.
„ Zelebori Schott.

Cruciferae.

Alysum calycinum L.
„ gemonense L.
„ maritimum Lam.
„ maritimum Lam v. Benthami.
„ orientale Ard.
„ Wierzbickii Heuff.
Arabis Allionii D. C.
„ blepharophylla Hook. & Arn.
„ Hornungiana Schur.
„ pumila Jacq.
Barbarea bracteosa Guss.
„ praecox R. Br.
„ sicula C. & J. Presl.
„ vulgaris R. Br.
Brassica Napsus L. v. oleifera, annua.
1. Alti-sarsa.
2. Balcanora.
3. Bhunri-sarsa.
4. Janda-sarsa.
5. Naldra-sarsa.
6. Piarki-tori.
„ Napus L. v. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.
Brasica rapa L. v. oleifera D. C., annua.
1. Holland.
2. Schweden.
3. Thüringen.
4. Ungarn.
„ rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1. Awehl.
2. Holstein.
3. Schweden.
4. Thüringen.
5. Uckermark.
Bunias orientalis L.
Cakile maritima L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ „ „ v. dentata.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cardaria Draba Desv.
Cochlearia anglica L.
„ officinalis L.
Conringia orientalis Dum.
Draba altaica Bunge.
„ tomentosa Clairv.
„ verna L.
Eruca cappadocica Reut.
„ sativa Mill.
Erucastrum obtusangulum Reichb.
Erysimum cheiranthoides L.
„ Marschallianum Andrz.
„ ochroleucum D. C.
„ pulchellum Boiss.
„ pumilum Gaud.
„ repandum L.
„ Witmanni Zawadsk.
Euclidium syriacum R. Br.
Goldbachia laevigata D. C.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey
Iberis australis L.
„ Forestieri Jord.
„ Garrexiana All.
„ Tenoreana D. C.
Isatis alpina All.

Isatis macrocarpa Boiss.
„ tinctoria L.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey.
Lepidium sativum L.
Matthiola bicornis D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ oleifer L.
„ raphanistrum L.
„ sativus L. v. niger D. C. annuus.
„ sativus L. v. niger D. C. hiemalis.
„ sativus L. v. niger D. C. hiemalis (Erfurt).
„ sativus L. v. oleiferus.
Rapistrum perenne All.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. v. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ hispida Schousb.
„ juncea L.
„ laevigata L.
„ nigra L.
Succowia balearica Medic.
Teesdalia Iberis D. C.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Sicyos angulata L.

Cupuliferae.

Alnus americana Hort.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb.&Schenk.
Dipsacus atratus Hook.J. & Thoms.
„ azureus Schrenk.
Dipsacus ferox Loisel.
„ Gmelini Bieb.
„ plumosus C. Koch.
Knautia magnifica Boiss. & Orph.
Pterocephalus palestinus Coult.
Scabiosa agrestis Waldst & Kit.
„ banatica Waldst. & Kit.
„ caucasica M. B.
„ fumarioides Vis. & Panč.
„ holosericea Bertol.
„ Portae Hutr.
„ suaveolens Desf.
„ ucranica L.

Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum L.
„ hirsutum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Bornmülleri Hausk.
„ exigua L.
„ falcata L.
„ Graeca Boiss. & Sprun.
„ Heldreichii Orph.
„ Lagascae Spreng.
„ Myrsinites L.
„ Peplis L.
„ platyphylla L.
„ salicifolia Host.
„ tinctoria Boiss & Huet.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianeae.

Erythraea CentauriumPers.
„ littoralis Fries.
„ ramosissima Pers.
Gentiana acaulis L.
„ asclepiadea L.
„ decumbens L.
„ lutea L.
„ macrophylla Pall.
„ triflora Pall.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.
Geranium affine Ledeb.
„ columbinum L.
„ dissectum L.
„ erianthum D. C.
„ Grevilleanum Wall.
„ lanuginosum Lam.
„ pusillum Burm.
Impatiens amphorata Edgew.
„ biflora Walt.
„ cristata Wall.
„ glandulifera Arn.
„ Holstii Engl. & Warb.
Oxalis corniculata L.
Tropaeolum maius L.
„ minus L.

Globulariaceae.

Globularia bellidifolia Salisb.
Globularia trichosantha Fisch. & Mey.

Hydrophylleae.

Phacelia bipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ delphicum Boiss. & Heldr.
„ Gebleri C. A. Mey.
„ grandifolium Choisy.

Illecebraceae.

Scleranthus annuus L.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Steph.
„ incana Mill.
„ officinalis L.
Calamintha Acinos Clair.
„ Clinopodium Spen.
Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
„ nutans L.
„ peregrinum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ pyrenaica Bartl.
„ Tetrahit L.
Hedeoma napalensis Benth.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey.
Lamium amplexicaule L.
„ purpureum L.
Leonurus capitatus Fresen.
Leonurus villosus Desf.
Lophanthus chinensis Benth.
Mentha arvensis L. v. piperascens.
„ suavis Guss.
Monarda citriodora Cerv.
„ clinopodia L.
„ Kalmiana Pursh.
Nepeta cyanea Stev.
„ granatensis Boiss.
„ spicata Benth.
„ racemosa Lam.
„ ucranica L.
Origanum pulchrum Boiss. & Heldr.
Orthosiphon stamineus Benth.
Phlomis alpina Poll.
„ armeniaca Willd.
„ samia L.
„ tuberosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Prunella hyssopifilia L.
„ pensylvanica Willd.
„ pyrenaica Philippe.
Salvia acaulis L.
„ Aethiopis L.
„ amplexicaulis Hort.
„ austriaca Jacq.
„ chionantha Boiss.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.
„ glutinosa L.
„ Horminum L.
„ nilotica Mürr.
„ officinalis L.
„ patens Cav.

Salvia valentina Vahl.
„ Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
„ montana L.
Scutellaria commutata Guss.
„ macrantha Fisch.
„ minor Huds.
„ orientalis L.
„ versicolor Nutt.
Sideritis hyssopifolia L.
„ syriaca L.
„ taurica Willd.
Stachys annua L.
„ arvensis L.
„ heraclea All.
„ lanata Jacq.
„ leucoglossa Griseb.
„ lusitanica Steud.
„ palustris L.
„ sibirica Link.
„ silvatica L.
Thymus citriodorus Schreb.
„ Serpyllum L.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey.

Leguminosae.

Anthyllis heterophylla L.
Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ canadensis L.
„ cassubicus Jord.
„ Cicer L.
„ cylindraceus D. C.
„ danicus Retz.
„ Glycyphyllus L.
„ illyricus Benth.
Baptisia minor Lehm.
Caragana arborescens Lam.
„ gracilis Hort. v. pendula.
„ pygmaea D. C.
Colutea longialata Kohne.
Coronilla vaginalis Lam.
„ varia L.
Cytisus austriacus L.
„ canescens Loisel.
„ Weldeni Vis.
Dolichos falcatus Klein.
„ sesquipedalis L.

Ervum monanthum Desf.
Galega orientalis Lam
„ persica Pers.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Lathyrus alatus Tenore.
„ Aphaca L.
„ articulatus L.
„ Bauhini Genty.
„ Clymenum L.
„ hirsutus L.
„ maritimus Bigel.
„ montanus Bernh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ pisiformis L.
„ pratensis L.
„ rotundifolius Willd.
„ sativus L.
„ silvestris L.
„ stipulacens Le Conte.
„ tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumänien).
„ peruviana L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus affinis Agardh.
„ angustifolius L.
„ „ „ v. albus.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandiflorus Don.
„ Hilarianus Benth.
„ luteus L.
„ Menziesii Torr.
„ perennis L.
„ polyphyllus Lindl.
„ pulchellus Sweet.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
Medicago apiculata Willd.
„ arabica All.
„ carstiensis Wulf.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.

Medicago leppacea L.
„ lupulina L.
„ scutellata All.
„ Terebellum Willd.
Melilotus alba Desr.
„ altissima Thuill.
„ dentata Pers.
„ gracilis D. C.
„ neapolitana Tenore.
„ officinalis Lam.
„ segetalis Ser.
„ sulcata Desf.
Onobrychis Caput-Galli L.
„ Crista-Galli Lam.
„ montana D. C.
„ sativa Lam.
Ononis spinosa L.
Orobus inconspicuus A. Br.
„ niger L.
„ vernus L.
Oxytropis amaranthoides L.
„ sulphurea Ledeb.
Phaca astragalina D. C.
Phaseolus multiflorus Willd.
Pisum arvense L.
„ elatum Ser.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Rchb.
„ sativum L.
„ „ „ „ abyssinicum.
„ „ „ v. Concentator L.
„ „ „ „ Dickon's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.
Pocockia cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
„ vermiculata L.
Tetragonolobus purpureus Mönch.
Trifolium agrarium Poll.
„ alexandrinum L.
„ aureum Pollich.
„ Bocconi Savi.
„ elegans Savi.
„ hybridum L.
Trifolium Lupinaster L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ pannonicum L.
„ repens L.
„ striatum L.
Trigonella caerulea Ser.
„ Foenum-graecum L.
„ gladiata Stev.
Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ calcarata Desf.
„ canescens Labill.
„ cassubica L.
„ cordata Ten.
„ Faba L. v. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii P. B.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta Fisch. & Mey.
„ sativa L.
„ „ „ v. dalecarliensis.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ thebanensis.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. B.
„ tetrasperma Mönch.
„ unijuga A. Br.

Linaceae.

Linum africanum L.
„ alpinum L.
„ altaicum Fisch.
„ americanum L. v. album.
„ campanulatum L.

Linum maritimum L.
„ sibericum D. C.
„ strictum L.
„ usitatissimum L.
1. crepitans.
2. hibernum.
3. hungaricum.
„ usitatissimum L. (Erfurt).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ tenue Desf.

Lythrarieae.

Lythrum flexuosum Lag.
„ myrtifolium Lodd.
Nesaea salicifolia H. B. & K. Nov.

Malvaceae.

Althaea chinensis Cav.
„ ficifolia Cav.
„ Heldreichii Boiss.
„ kurdica Schlecht.
„ officinalis L.
„ pallida W.-K.
Anoda triangularis D. C.
Hibiscus Trionum L.
Kosteletzkya pentacarpa Ledeb.
Lavatera cachemiriana Cambess.
„ tripartita D. C.
Malope grandiflora T. G. Dietr.
Malva abyssinica A. Br.
„ borealis Wallm.
„ incanescens All.
„ oxyloba Boiss.
„ rotundifolia Huds.
„ silvestris L.
Palava flexuosa Mast.
„ malvaefolia Cav.

Onagrarieae.

Clarkia pulchella Pursh.
Epilobium adnatum Griseb.
„ angustifolium L.
„ boreale Haus.
„ chilense Haussk.
„ davuricum Fisch.
„ lanceolatum Sebast & Maur.
„ lividum Haus.
Epilobium nutans F. W. Schmidt.
„ spicatum Lam.
Eucharidium coccineum Fisch. & Mey.
Eucharidium grandiflorum Fisch. & Mey.
Gauridium molle Spach.
Godetia insignis Spach.
„ purpurea G. Don.
Kneiffia gracilis Bartl.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ cruciata Nutt.
„ glauca Michx.

Orobanchaceae.

Orobanche cruenta Bertol (Lotus cormiculatus).

Papaveraceae.

Adlumia fungosa Greene.
Chelidonium laciniatum Mill.
Corydalis Kalpakowskiana Regel.
„ ochroleuca Koch.
„ ophiocarpa Hook & Thoms.
„ thalictrifolia Jameson.
Dicentra eximia Torr.
Fumaria officinalis L.
Glaucium phoeniceum Crantz.
Hypecoum pendulum L.
Papaver album L.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ californicum A. Gray.
„ dubium L.
„ Heldreichii Boiss.
„ maritimum With.
„ orientale L.
„ persicum Lindl.
„ pilosum Sibth. & Sm.
„ Rhoeas L.
„ rupifragum Boiss. & Reut.
„ somniferum L.
„ spicatum Boiss. & Bal.
Roemeria hybrida D. C.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Plantagineae.

Plantago alpina L.
„ altissima Loisel.
„ amplexicaulis Cav.
„ arenaria W. & K.
„ Cynops L.
„ gloriosa Sm.
„ hirtella H. B. & K. Nov.
„ Kamtschatica L.
„ lanceolata L.
„ maior L.
„ maritima L.
„ media L.
„ montana Lam.
„ Psyllium L.
„ purpurascens Nutt.
„ sericea Ruiz. & Pav.
„ subulata L.
„ Victorialis Poir.

Plumbagineae.

Armeria allioides Boiss.
„ boetica Boiss.
„ cassubica Boiss.
„ formosa Heynh.
„ longearistata Boiss & Reut.
Plumbago micrantha Ledeb.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
Gilia achilleaefolia Benth.
„ multicaulis Benth.
„ tricolor Benth.
Polemonium boreale Adams.
„ coeruleum L.
„ filicinum Greene.
„ grandiflorum Benth.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ pauciflorum S. Wats.
„ pulcherrimum Hook.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum japonicum Hort.
„ rotundatum Bab.
Polygonum Bistorta L.
„ Convolvulus L.
„ Fagopyrum L.
„ Fagopyrum L. v. argenteum.
„ Fagopyrum L. v. emarginatum.
„ lapathifolium L.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ tataricum Gärtn.
„ „ „ v. secalinum.
„ sagittatum L.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.
„ Rhaponticum L.
„ undulatum L.
Rumex Acetosa L.
„ altissimus Wood.
„ aquaticus L.
„ cordifolius Hornem.
„ crispus L.
„ floridanus Meissn.
„ maximus Schreb.
„ Patientia L.
„ purpureus Link.
„ stenophyllus Ledeb.

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora Lindl.
„ Menziesii Torr & Gray.
„ umbellata D. C.
Portulaca pusilla H. B. & K. Nov.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schrb.
„ repens Pomel.
Androsace coronopifolia Andr.
„ maxima L.
„ minor L.
Asterolinon stellatum Hoffmgg & Link.
Lysimachia quadrifolia L.
Primula flagellicaulis Kern.
„ insica Lam.
„ leucophylla Pax.

Primula media Peterm.
„ Paxii W.
„ suaveolens Bertol.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
„ barbatum Patr.
„ Lycoctonum L.
„ Napellus L.
„ orientale Mill.
„ Stoerkianum Reichb.
„ variegatum L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
„ autumnalis L.
„ flammea Jacq.
„ vernalis L.
Anemone cylindrica A. Gray.
„ decapetala Arduini.
„ Hudsoniana Rich.
„ parviflora Michx.
„ pennsylvanica L.
„ pinnatifida Dulac.
„ rivalaris Buch-Ham.
„ virginiana L.
Aquilegia atrata Koch.
„ caryophylloides L.
„ dichroa Freyn.
„ flavescens S. Wats.
„ nivea Baumg.
„ olympica Boiss.
Caltha palustris L.
Ceratocephalus orthoceras D. C.
Clematis graveolens Lindl.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
„ asplenifolia Salisb.
Delphinium bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ decorum Fisch. & Mey.
„ dictyocarpum D. C.
„ discolor Fisch.
„ elatum L.
„ fissum Waldst. & Kit.
„ formosum Boiss & Huet.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ Maackianum Rgl.
„ palmatifidum D. C.
„ Przewalskii Huth.
Delphinium Requienii D. C.
„ silense Huth.
„ Skinneri Poit.
„ tatsienense Franch.
„ tiroliense Kern.
„ tricolor Benth.
„ villosum Stev.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella aristata Sibth.
„ arvensis L.
„ Bourgaei Jord.
„ coarctata C. C. Gmel.
„ corniculata D. C.
„ damascena L.
„ Garidella Spenn.
„ hispanica L.
„ Nigellastrum Willk.
„ orientalis L.
„ sativa L.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ lobata Pall.
„ peregrina Mill.
„ triternata Pall.
Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
Ranunculus anemonaefolius D. C.
„ chaerophyllus L.
„ millefoliatus Vahl.
„ sceleratus L.
„ serbicus Vis.
„ trilobus Desf.
Thalictrum alpinum L.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ cinereum Desf.
„ kemense Fries.
„ lucidum L.
„ maius L.
„ medium Jacq.
„ petaloideum L.
„ pyrrhocarpum Ckodi.
„ sibiricum L.
„ sparsiflorum Turcz.
Trautvetteria palmata Fisch & Mey.

Resedaceae

Reseda abyssinica Fresen.
„ alba L.
„ Luteola L.
„ myriophylla Tenore.
„ odorata L.
„ Phyteuma L.

Rosaceae.

Agrimonia dahurica Willd.
„ Eupatoria L.
„ parviflora Ait.
„ repens L.
Alchemilla arvensis Scop.
Amelanchier Botryapium D. C.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
„ multiflora Bunge.
„ nigra Wahlenb.
„ vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
Fragaria californica Cham & Schlecht.
„ maxima Schlecht.
„ mexicana Schlecht.
Geum album J. F. Gmel.
„ aleppicum Jacq.
„ japonicum Thunbg.
„ magellanicum L.
„ macrophyllum Willd.
„ montanum L.
„ pallidum Fisch. & Mey.
„ rubellum Fisch. & Mey.
„ rubifolium Lej.
„ tirolense Kern.
„ triflorum Pursh.
Potentilla adscharica Sommier & Levier.
„ andicola Benth.
„ apennina Tenore.
„ atrosanguinea Lodd.
„ elegans Schlecht.
„ formosa D. Don.
„ geoides Bieb.
„ Hookeriana Lehm.
„ incanescens Opiz.
„ kurdica Boiss & Hohen.
„ montenegrina Pantoč.
„ pimpinelloides L.
„ pulcherrima Lehm.
Potentilla ranunculoides Humb. & Bonpl.
„ splendens Ram.
„ tanacetifolia Willd.
„ taurica Willd.
„ Wrangeliana Fisch & Avè-Lall.
Poterium agrimonifolium Cav.
„ Sanguisorba L.
„ spinosum L.
Prunus serotina Ehrh.
Rosa glutinosa Sibth. &Sm.
„ lucida Andr.
„ nitida Willd.
„ rubrifolia Rupr.
Sibbaldia procumbens L.
Sorbus Aucuparia L.
„ „ „ v. alpina Hort
„ „ „ v. rossica.
„ Hostii Heynh.
„ melanocarpa Heynh.
Spiraea Aruncus L.

Rubiaceae.

Asperula hexaphylla All.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst. & Kit.
„ scutellaris Vis.
Crucianella aegyptiaca L.
Galium Aparine L.
„ Kitaibelianum Schult.
„ tricorne With.
„ vernum L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Ptelea trifoliata L.

Saxifragaceae.

Henchera cylindrica Dougl.
„ divaricata Fisch.
„ hispida Pursh.
„ lucida Schlecht.
„ macrophylla Lodd.
„ Richardsoni R. Br.
„ rubescens Torr.
Ribes petraeum Wulf.
Saxifraga crustata Vest.
„ pendurans Kit.
Tellima grandiflora R. Br.

Selagineae.

Hebenstretia alba Jacq.
„ comosa Hochst.
„ dentata L.
„ parviflora E. Mey.
„ tenuifolia E. Mey.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum rupestre Boiss & Reut.
Chelone barbata Cav.
„ Lyoni Pursh.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis alba Schrank.
„ ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ ferruginea L.
„ fulva Lindl.
„ gloxinoides Carr.
„ grandiflora Lam.
„ lutescens Lindl.
„ nervosa Steud & Hochst.
„ nevadensis Kunze.
„ ochroleuca Jacq.
„ purpurea L.
Linaria arvensis Desf.
„ capraria Moris & De Not.
„ chalepensis Mill.
„ Elatine Mill.
„ maroccana Hook.
„ minor Desf.
„ repens L.
„ spuria Mill.
„ supina Desf.
Mimulus nasutus Greene.
Nemesia versicolor E. Mey.
Pentastemon alpinus Torr.
„ diffusus Dongl.
„ laevigatus Ait.
„ procerus Dougl.
„ roseus G. Don.
Rhinanthus villosus Pers (Triticum vulgare).
Schrophularia canina L.
„ Hoppii Koch.
„ nodosa L.
Verbascum blattarioides Lam.
„ floccosum Waldst. & Kit.
„ gnaphalodes Bieb.
Verbascum Kanitzianum Simk & Walz.
„ phlomoides L.
„ thapsiforme Schrad.
„ Thapsus L.
Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ caucasica Bieb.
„ excelsa Desf.
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ incana L.
„ lanceolata Benth.
„ maritima L.
„ Michauxii Lam.
„ persica L.
„ petraea Stev.
„ polita Fries.
„ ruthenica Roem. & Schult.
„ saxalitis Scop.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.
Zaluzianskya selaginoides Walp.

Solanaceae.

Anisodus luridus Link & Otto.
Atropa Belladona L.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura fastuosa L.
„ laevis L.
„ Metel L.
„ quercifolia H. B. & K. Nov.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyoscyamus agrestis Kit.
„ aureus L.
„ niger L.
Nicandra physaloides Gärtn.
„ violacea Andr.
Nicotiana angustifolia Mill.
„ Auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fruticosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca L.
„ glutinosa L.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.

Nicotiana rustica L.
„ Sanderiana Hort.
„ silvestris L.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ Virginica Com.
„ viscosa Lehm.
Physalis edulis Sims.
„ philadelphica Lam.
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.
Solanum americanum Mill.
„ guianense Dun.
„ miniatum Bernh.
„ nigrum L.
„ „ v. chlorocarpum.
„ „ v. humile.
„ „ v. oleraceum.
„ „ v. villosum.
„ racemiflorum Dun.

Ternstroemiaceae.

Actinidia arguta Franch. & Sav.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
„ major L.
Bubon Galbanum L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum alpinum Benth. & Hook.
„ Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spreng.
Conium maculatum L.
Conopodium denudatum Koch.
Coriandrum sativum L.
Cryptotaenia canadensis D. C.
Daucus carota L.
„ „ „ v. alba.
„ „ „ v. rubra.
Eryngium amethystinum L.
„ caeruleum Bieb.
„ eburneum Decne.
„ giganteum Bieb.
„ Oliverianum Delar.
Ferula thyrsiflora Sibth. & Sm.
Foeniculum dulce Mill.
„ officinale All.
Heracleum persicum Desf.
„ Spondylium L.
„ ternatum Velen.
Laserpitium hispidum Bieb.
„ Panax Gouan.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis D. C.
Lophosciadium meifolium D. C.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schrenk.
Pastinaca sativa L.
„ selinoides Vis.
Peucedanum ruthenicum Bieb.
„ verticillare Spreng.
„ verticillatum Rafin.
Pimpinella magna L.
„ peregrina L.
Prangos thapsioides D. C.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix Balansae Reut.
„ brachycarpa Guss.
„ Pecten Veneris L.
Selinum Carvifolia L.
Seseli gracile Waldst & Kit.
„ rigidum Waldst & Kit.
Silaus flavescens Bernh.
Siler trilobum Crantz.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Bernh.
Trinia Kitaibelii Bieb.
„ vulgaris D. C.
Zizia aurea Koch.

Urticaceae.

Cannabis gigantea Vass.
„ indica Lam.
„ sativa L.
„ „ „ v. himalayna Hort.
Humulus japonicus Sieb & Zucc.
Urtica Dodartii L.
„ palmata Forsk.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
„ macrosiphon Boiss.

Fedia scorpioides Dufr.
Valeriana exaltata Mikan.
„ integrifolia Phil.
„ montana L.
Valerianella coronata D. C.
„ discoidea Loisel.
„ truncata Betcke.
„ uncinata Dufr.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola canadensis L.
„ dactyloides Roem. & Schult.
„ labradorica Schrank.
„ lusitana Brot.
„ maculata Cav.
„ Munbyana Boiss. & Reut.
„ persicifolia Roth.
„ pinnata L.
„ tricolor L. v. arvensis.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Aconitum polychrysum.
Anacampseros arachnoides Sims.
Aspidistra elatior Bl.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb. v. picta.
Begonia nelumbiifolia Cham. & Schlecht.
Chloranthus erectus Sweet.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Dyckia rariflora Schult.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia alpestris Gardn.
„ corollina Hort.
„ corymbiflora Ruiz. & Pav.
„ gracilis Lindl.
Kleinia articulata Harw.
Libonia floribunda C. Koch.
Mackaya bella Harw.
Mesembryanthemum anceps Haw.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ caulescens Mill.
„ crassulinum Spreng.
„ deltoides L.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckl. & Zeyh.
„ spectabile Haw.
Mesembryanthemum splendens L.
„ subincanum Haw.
„ Thunbergii Haw.
„ tumidulum Harv.
„ violaceum D.C.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ophiopogon japonicus Ker. & Gawl.
„ Jaburan Lodd.
Othonna crassifolia Harv.
Pilea muscosa Lindl.
Polypodium Lingua.
Reineckia carnea Kunth.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Salvia involucrata Cav.
Sansevieria guineensis Willd.
Saxifraga sarmentosa L.
Sedum sarmentosum Bunge.
„ Sieboldi Hort. fol. med. pictis.
„ Stahlii Hort.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ Martensii Spring.
„ uncinata Spring.
Sempervivum barbatum C. Sm.
„ decorum Christ.
Teucrium Marum L.
„ fruticans L.
Tradescantia zebrina Hort.
Veronica Traversiii Hook.
Viburnum Tinus L.
Zingiber Zerumbet Rosc.

Tábor in Bohemia, 15. die m. Decembris 1913.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

J. Svoboda,
hortulanus.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

V. Trojan,
seminum conservator.

(P. 134 2

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

Pr a. 1915

IX.

Delectus seminum plantarum

anno 1914 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Aroideae.

Richardia tingitana Roth.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
„ brevicollis D. C.
„ cyperoides L.
„ curvata Knaf.
„ distans L.
„ elongata L.
„ glauca Murr.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ lamprocarpa Čel.
„ leporina L.
„ muricata L.
„ pallescens L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ Pseudo-cyperus L.
Carex pulicaris L.
„ remota L.
„ secalina Wahl.
„ sempervirens Vill.
„ stenophylla Wahlenb.
„ vesicaria L.
„ vulpina L.
Scirpus Holoschoenus L.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch.
„ fatua L.
„ nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ „ for. mutica.
3. „ obtusata All. alba (Hungaria).

4. var. a) pugnax Al.
b) „ „ (Polend).
5. „ a) tatarica (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
6. „ a) tristis Al. (Hungaria).
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke. (Bourbon).
b) „ „ (Osetia Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ montana Alef.
7. „ mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt.
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Hirsch.
h) Landa's Grün-Hafer.
i) Lapponia.
j) Leutewitz.
k) Ligowo.
l) Oderbuch.
m) Podolia.
n) Polonia.
o) Probstei.
p) Romania.
r) Silesia.
s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
b) „ „ (Fennia).
c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langenthal Australia).
b) „ Langenthal (Germania).
c) „ Langenthal (Scotia).
d) praegravis Langenthal (Willkommen).
10. „ setosa Kcke.
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
a) Altona.
b) Dania.
c) Imperial.
d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
a) Bavaria.
b) Bestehorn.
c) Chevalieri.
d) Chile.
e) giganteum.
f) Hierosolyma.
g) Landa's Porter.
h) Melonen Gerste.
i) Philadalphia.
j) Phoenix.
k) Probstei.
l) Nolč's Imperial Typ A.
m) „ „ „ B.
n) „ „ „ C.
o) „ Bohemia Gerste.
p) „ böhmische früheste.

Hordeum distichum L.

8. var. spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
 b) „ „ (himalayense).
 c) „ „ (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
 b) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
 a) Italia.
 b) Marocco.
 c) Mandschuria.
 d) Norvegia.
 e) Peru.
 f) Rimpaui.
 g) Cyprus.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
 b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).
 b) „ Kcke (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
 b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.
 a) album, furcatum, nudum, distichum.
 b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
 c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
 d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.
 a) Brandeburg.
 b) giganteum.
 c) nivale.
 d) Petkuss.
 e) Saxonicum, vulgare.
 f) Sibiricum.
 g) Stauden Roggen (Saxonia).
 h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.

1. var. clavatum Alef.
2. „ a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
 b) creticum Mazz. (Palermo).
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ brunneum Alef.
4. „ campylodon Kcke.
5. „ cladurum Alef.
6. „ farrum Bayle.
7. „ Fuchsii Kcke.
8. „ Krausei Alef.
9. „ liguliforme Kcke.
10. „ pycnurum Alef.
11. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
12. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.

a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.

1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7 „ leucomelan Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadowska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.

1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. var. chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
   b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.

a) Běloturka (gub. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.

1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestenseni.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ caesium Alef.
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
   a) aristatum.
   b) Petali.
   c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
   a) Hunderttägig.
   b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ Hostianum Clem.
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).

Triticum vulgare L.

13. var. muticum Bayle.
    a) Australia.
    b) California.
    c) Heine's W.
    d) Noë's W.
    e) Schlandstaedt.
    f) Slané (Bohemia).
14. » pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

a) gigentea.
b) Sibiria.
1. var. a) aurea Kcke. (Mönchhafer.
   b) aurea Kcke.
2. » grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum hexastichum L.

1. var. brachyurum
2. „ a) giganteum (ertragreichste).
   b) giganteum Chrestenseni (verbesserte).
   c) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ luteum.
4. „ nigrum.

Hordeum tetrastichum L.

a) Alberti.
b) Chrestenseni.
c) Groeningense.
d) luteum.
e) Mammuth.
1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
1. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's- R.
18. Chrestensen'-R. giganteum.
19. Chestensten's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harz).
21. Riesen-Staudenroggen.
22. Landa's Hanibal R.
23. Colossal- hybridum.
24. Buhlendorf.
25. Altpaleschkener R.
26. Hadmersleben.
27. Trispermum.
28. Wasa.
29. St. Johannis.
30. Nyland.
31. Schlaraffen-Roggen.
32. Zeelander Original.
33. Hungaria.
34. Mährischer Stauden-R.
35. Mumien-R.
36. Bric.
37. Petkuss.
38. Rügenscher R.
39. Hessischer Garde du Corps.
40. Correns Stauden-R.
41. Hispanicum.
42. Suecicum.
43. Banaticum.
44. Schlanstaedt, giganteum.
45. Champagner Stauden-R.
46. Alpinum.
47. März.
48. Romanum.
49. Montagner Degenerirter Riesen R.
50. Chrestensen's Triumph R.
51. Branisch Excelsior R.
52. Chrestensen's Kolben R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.

„ „ „ **Binkel W.**

„ „ „ **var. sericeum.**

Triticum dicoccum Schr.

„ dicoccum Schr. var. nigrum (Amidonnier).

„ dicoccum Schr. var tricoccum Schübl.

„ dicoccum Schr. Schwarzer sammetiger W.

„ dicoccum Schr v. Bauhini Al. (Roter sammetiger W.).

„ dicoccum Schr. v. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. coeruleum Al. (Kolben W.).
6. dasyanthum.
7. erubescens aristatum.
8. rubrum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. „ centigrammum.
3. „ compositum (velutinum).
4. „ „ (Mirakel).
5. „ dinura Al. (Helena).
6. „ gentile Al. ((Blé poulard blanc lisse on carré).
7. „ graecum (Korinthus).
8. var. jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
„ jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.)
„ jodura Al. (Paine,s Defiance).
„ jodura Al. (Riwet's Grannen-W.).
„ jodura Al. (schottischer rauher Winter W.).
9. „ melanatherum Kcke. (Petanielle noir de Nice).
10. „ mirabile Kcke. (Ihrwetter).
„ „ „ (Schwarzer sammetiger Wunderweizen).
11. „ pseudo-cervinum Kcke.

Triticum vulgare L.

var. a l b o r u b r u m Kcke.
1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red. chaff de Dantzick.

var. a r i s t a t u m Schübl.
1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square-head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Golden Cross.
12. Japonischer W.
13. Johnson's W.
14. Nouette de Lausanne.
15. Russischer W.
16. Schwarzer persischer W.
17. Robert's W.
18. Chrestensen's Square-head.
19. Michigan bronce.

var. c y a n o t h r i x Kcke.

var. e r y t h r o s p e r m u m Kcke.
1. Bestehorn's W.
2. Horford's Michigan bronce.
3. Kis-Tur (Hungaria).

var. ferrugineum Al.

Tritigum vulgare L.

1. Rimpau's-W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerirter W.
3. Fuchs W.

var. lutescens Al.

1. Juli W.
2. Lammas.
3. Kaiser W.

var. miltura Al.

1. Hallet's red. Nursery.
2. Blé rouge de St. Land.
3. Cover's red. Wheat.
4. Spalding prolific Wheat.

var. muticum Bayle.

Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam Wheat.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomir Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoha.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. Probsteier.
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb. W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's No 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Spalding's prolific.
43. Browick red.
44. Bestehorn's Dividendenw.
45. Red. Mary gold.
46. Browick red rubrum.
47. Schariff's Square head, Orig.
48. Besseler's Square head.
49. Kirsche's Square head.
50. Mette's Square head.
51. Strube's Square head.
52. Breustedt's kurzer Square head.
53. Anderbeck Square head.
54. Leutowitz Square head.
55. Bore-Svalöf.
56. Extra Svalöf Square head.
57. Original Schiriffw.
58. Böhmischer roter Wechselw.
59. North Allerton.
68. Hunter's White Wheat.
61. Englischer brauner W.
62. Böhmischer sammetiger Kolben-W.
63. Aleph.
64. Richelle blanc de Naples.
65. Rouge inversable.
66. Schottischer blutroter.
67. Massey.
68. Hunter's White Wheat.
69. Smogger-W.
70. Romanella.
71. Talavera.
72. Horfords Winter Perl.
73. Feuton.
74. Ungarischer roter.
75. Chiddam weisser Urbst.
76. Hybridi inversable.
77. Schilf-W.
78. Amerik. Willits.
79. Preis von Oxford.
80. Urtoba.

Triticum vulgare L.

81. Marenil.
82. Blé Talavera de Bellevue.
83. De Blaic.
84. Blanc a duvet veloute.
85. Manhattan.
86. Victoria d'Autome.
87. Braunähriger Märkischer W.
88. Golden Drop (verbessert).
89. Flandrischer-W.
90. White Trump.
91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
92. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
93. Griewerner Weizen.
94. Elys.
95. De Crepi.
96. Hopetown Wheat.
97. Briguet.
98. Galland.
99. Hickling's W.
100. Dattelweizen.
101. Blausamtiger Kolben W.
102. Weizen Roggen.

var. villosum Al.

1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.

var. pyrothix Al.

1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
2. Sammetiger Square head.

Aegilops Aucheri Boiss.
" caudata L.
" cylindrica Host.
" macrura Jaup & Spach.
" ovata L.
" speltoides Tausch.
" squarrosa L.
" triticoides L.
" triuncialis L.
" ventricosa Tausch.
Aegopogon pusillus Beauv.
Agrostis alba L. v. maior.
" canina L.
" interrupta L.
" rupestris All.
" Spica-venti L.
Agrostis stolonifera L.
" stolonifera L. v. gigantea Gaud.
" vulgaris With.
Aira bottnica Wahlenb.
" caespitosa L.
" flexuosa L.
" lendigera Lag.
" media R. & Sch.
" mollis Schreb.
Alopecurus agrestis L.
" arundinaceus Poir.
" brachystachyus Bieb.
" castellanus Boiss & Reut.
" nigricans Hornem.
" pratensis L.
Andropogon argenteus D. C.
" distachyus L.
" Gryllus L.
" Ischaemum L.
Anthoxanthum gracile Bivon.
" odoratum L.
" " v. longe-aristatum.
Antinoria agrostidea Parl.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Atropis distans Rupr.
Avena bromoides Gouan.
" compressa Heuff.
" desertorum Less.
" Hostii Boiss & Reut.
" planiculmis Schrad.
" pratensis L.
" pubescens Huds.
" sterilis L.
" sulcata J. Gay.
Boissiera bromoides Hochst & Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium gracile Beauv.
" pinnatum Beauv.
" silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
" media L.
" rufibarba Boiss.
Bromus arvensis L.
" asper Murr.
" brachystachys Hornem.
" caprinus Kerner.
" ciliatus Pursh.

Bromus commutatus Ehrh.
„ erectus Huds.
„ laxus Reichb.
„ longiflorus Spreng.
„ inermis Leyss.
„ madritensis Del.
„ marginatus Steud.
„ mollis L.
„ patulus M. & K.
„ racemosus L.
„ Schraderi Kunth.
„ secalinus L.
„ serotinus Beneken.
„ squarrosus L.
„ sterilis L.
„ tectorum L.
Calamagrostis arundinacea Roth.
„ Halleriana D. C.
„ lanceolata Roth.
„ montana D. C.
Catabrosa aquatica Beauv.
Cinna mexicana Beauv.
Cornucopiae cuculatum L.
Corynephorus canescens Beauv.
Crypsis aculeata Ait.
„ alopecuroides Schrad.
„ schoenoides Lam.
Cynosurus cristatus L.
„ echinatus L.
„ siculus Jacq.
Dactylis Aschersoniana Gräb.
„ glomerata L.
Deschampsia juncea Beauv.
Eleusine oligostachya Link.
„ Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Vahl.
„ glaucifolius Muhl.
„ hordeisformis Desf.
„ mexicanus Cav.
„ sabulosus M. Bieb.
„ virginicus L.
Eragrostis amabilis L.
„ Borrelieri Daveau.
„ chilensis Nees.
„ elegans Nees.
„ maior Host.
„ minor Host.
„ nigra Nees.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
„ plumosa Link.
Festuca alpina L.
„ amethystina L.
„ ampla Hack.
„ argentea Savi.
„ arundinacea Schreb.
„ borealis Mert & Koch.
„ duriuscula Jacq.
„ elegans Boiss.
„ exaltata Presl.
„ gigantea Vill.
„ glauca Lam.
„ Halleri All.
„ heterophylla Lam.
„ indigesta Boiss.
„ Myurus L.
„ ovina L.
„ „ „ v. glauca Schrad.
„ „ „ v. hispida.
„ pallens Host.
„ Pančičii Haenkl.
„ Pančičiana Hand-Mazz. & Jauch.
„ pratensis Huds.
„ psammophila Hack.
„ Pseudovina Hack.
„ rhoetica Suter.
„ rigida Kunth.
„ rubra L.
„ „ „ v. fallax.
„ „ „ v. heterophylla.
„ silvatica Vill.
„ spectabilis Jan.
„ tenuifolia Sibth.
„ vaginata Waldst. & Kit.
„ varia Haenkle.
„ violacea Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Hierochloë borealis Roem & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
„ mollis L.
„ tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
„ cylindricum Murr.
„ murinum L.
„ secalinum Schreb.
Haynaldia villosa Schur.

Koeleria albescens D. C.
„ alpicola Gren & Godr.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirsuta D. C.
„ rupicola Boiss & Reut.
„ splendens Presl.
„ valesiaca Gaud.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lolium canadense Michx.
„ multiflorum Lam.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ eligulata Boiss.
„ maior Sibth & Sm.
„ nebrodensis Parl.
„ pyramidalis Lam.
„ transsilvanica Schur.
Milium nigricans Ruiz & Pav.
Molinia caerulea Moench.
„ „ v. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr & Gray.
Panicum altissimum Jacq.
„ bulbosum H. B. & K. Nov.
„ californicum Benth.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ colonum L.
„ Crus Galli L.
„ „ „ v. maior.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ miliaceum L. v. album.
„ „ „ „ badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Alef.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
Panicum miliaceum L. v. subsanguineum Kcke.
„ oryzoides Sw.
„ sanguinale L.
Paspalum tenellum Willd.
Phalaris brachystachys Link.
„ bulbosa L.
„ canariensis L.
„ coerulea Desf.
„ minor Retz.
„ paradoxa L.
Phleum asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ intermedium Jord.
„ Michelii All.
„ parnassicum Boiss & Heldr.
„ phalaroides Koel.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ serotinum Jord.
„ subulatum Spreng.
„ tenue Schrad.
Poa abyssinica Jacq.
„ alpina L.
„ badensis Haenke.
„ bulbosa L.
„ caesia Sm.
„ cenisia All.
„ compressa L.
„ firmula S. F. Gray.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ v. rigidula.
„ „ „ v. saxatilis.
„ nevadiensis Vasey.
„ palustris L.
„ pannonica Korn.
„ pratensis L.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.
„ versicolor Bess.
Schismus marginatus Beauv.
Sesleria uliginosa Opiz.
Setaria germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ italica P. B. v. breviseta.

Setaria japonica Pynaert.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
Sorghum vulgare Per. v. Arduini Jacq.
Stipa aristella L.
„ Calamagrostis Wahl.
„ calatajeronensis Tineo.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
„ Grafiana Stev.
„ juncea Sibth.
„ Lagascae Roem & Schult.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ pubescens R. Br.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
Trisetum alpestre Beauv.
„ argenteum Roem & Schult.
„ distichophyllum Beauv.
„ pratense Pers.
Triticum caninum Schreb.
Ventenata avenacea Koel.
Zea gracillima Koern.
„ mais L. v. Cinquantino.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ rubra.
„ „ „ „ translucens.

Irideae.

Crocus speciosus Bieb.
Gladiolus palustris Gaud.
„ segetum Ker & Gavl.
Iris arenaria Waldst. & Kit.
„ cristata Ait.
„ setosa Pall.
„ sibirica Hook & Arn.
„ spuria L.
„ versicolor L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
„ compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
Juncus fuscoater Schreb.
„ glaucus Ehrh.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ squarrosus L.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ angustifolia Poir.
„ campestris D. C.
„ erecta Desv.
„ racemosa Desv.
„ spadicea D. C.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atroviolaceum Boiss.
„ baicalense Willd.
„ fallax Schult.
„ fistulosum L.
„ flavum L.
„ Kochii Lange.
„ Ledebourianum Schult.
„ Libani Boiss.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens Sibth. & Sm.
„ planifolium D. C.
„ Scorodoprasum L.
„ tulipaefolium Ledeb.
Anthericum algeriense Boiss & Reut.
„ graminifolium Willd.
„ Liliastrum L.
Bulbine alloides Willd.
Colchicum autumnale L.
Eremurus robustus Regel.
Hyacinthus amethystinus L.
„ ciliatus Cyrill.
„ dubius Guss.
Lilium pyrenaicum Gouan.
Muscari comosum Mill.
„ praecox Siehe.
Scilla campanulata Ait.
„ festalis Salisb. v. nutans Sm.
„ italica L.
„ peruviana L.
„ sibirica Andr.
Veratrum nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amaranthaceae.

Amaranthus bullatus Bess.
„ caudatus L.
„ crassipes Schlecht.
„ elegantissimus Hort.
„ flavus L.
„ polygamus L.
„ retroflexus L.
„ silvestris Desf.
„ spinosus L.
„ tortuosus Hornem.
Euxolus lividus Moq.
Froelichia gracilis Moq.
Scleropus amaranthoides Schrad.

Araliaceae.

Aralia chinensis L.

Aristalochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

Asclepias purpurascens L.
„ speciosa Torr.
Vincetoxicum canescens Decne.
„ luteum Hoffmg. & Link.
„ nigrum Mönch.

Berberideae.

Berberis Thunbergii D. C.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi Bureau & Franch.

Boragineae.

Anchusa italica Retz.
„ myosotidiflora Lehm.
„ officinalis L.
„ osmanica Vel.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum bicolor Willd.
„ cheirifolium L.
„ furcatum Wall.
„ magellense Tenore.
„ nebrodense Guss.
„ officinale L.
„ Wallichii G. Don.
Echium plantagineum L.
„ rosulatum Lange.
„ rubrum Jacq.
Lappula Myosotis Moench.
Lindeloffia longiflora Baill.
Lithospermum sibiricum Lehm.
Myosotis orientalis Lam.
„ stricta Link.
Nonnea lutea Reichb.
Rindera canescens D. C.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch.
„ Lamarkii Fisch.
„ latifolia Fisch.
„ lilifolia Ledeb.
„ marsupiiflora Fisch.
„ polymorpha Ledeb.
Campanula aggregata Willd.
„ alliariaefolia Willd.
„ alpina L.
„ glomerata L.
„ lamiifolia Bieb.
„ latifolia L.
„ linifolia Scop.
„ macrantha Boiss.
„ Medium L.
„ nobili-macrantha Regel.
„ Rapunculus L.
„ vernalis L.
Downingia elegans Torr.
„ pulchella Torr.
Jasione perennis Lam.
Lobelia Cliffortiana L.
Phyteuma campanuloides M. Bieb.
„ canescens Waldst. & Kit.
„ spicatum L.

Specularia Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobeloides D. C.
„ nutabunda A. D. C.

Capparideae.

Cleome fugax Schrad.
„ speciosissima Deppe.
„ viscosa L.
Polanisia brachysperma Torr & Gray.
„ viscosa L.

Caryophylleae.

Agrostemma Coronaria L.
„ Flos-Jovis L.
„ Githago L.
„ nicaeensis Pers.
„ Walkeri Hort.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium triviale Link.
Dianthus Armeria L.
„ calocephalus Boiss.
„ glacialis Haenke.
„ pelviformis Heuff.
„ petraeus Waldst. & Kit.
„ pubesceus Sibth & Sm.
„ superbus L.
Drymaria cordata Willd.
Eudianthe corsica Reichb.
Gypsophila acutifolia Fisch.
„ altissima L.
„ dichotoma Bess.
„ elegans Bieb.
„ fastigiata L.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ perfoliata Boiss.
„ saligna Schrad.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis chalcedonica L.
„ Coeli-rosa Desv.
„ cruenta Griseb.
„ fulgens Fisch.
„ Githago Scop.
„ Haageana Regel.
Melandryum eriocalycinum Boiss.
„ firmum Rohrb.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ Zawadski A. Br.

Saponaria depressa Bivon.
„ persica Boiss.
„ Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
„ babylonica Boiss & Noé.
„ Billeniana Schott.
„ bellidifolia Jacq.
„ bipartita Desf.
„ catholica Ait.
„ caucasica Boiss.
„ conoidea L.
„ Fabaria Sibth & Sm.
„ Friwaldskyana Hampe.
„ gigantea L.
„ tatarica Pers.
„ transsilvanica Schur.
„ vallesiaca Link.
„ Zawadzkii Herbich.
Spergula arvensis L.
„ „ „ var. maxima Wall.
„ „ „ „ sativa.
Tunica velutina Fisch & Mey.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
„ parviflora Mönch.
Velezia rigida L.
Viscaria alpina G. Don.
„ atropurpurea Griseb.
„ purpurea Wimm.

Celastrineae.

Euonymus latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Ambrina chilensis Spach.
Arthrocnemum macrostachyum Bunge.
Atriplex hortensis L.
„ „ „ v. rubra.
„ „ „ „ semibaccata R. Br.
Axyris amaranthoides L.
Beta longespicata Moq.
„ maritima L.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigina Waldst.-Kit.
„ vulgaris L. v. altissima (Schreiber's Elite).

Beta vulgaris L. v. altissima (Schreiber's Specialität).
„ vulgaris L. v. cicla rubra (Salatrübe).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ maritimum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ virgatum Thunb.
„ Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
„ hyssopifolium L.
„ intermedium Schweig.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia thamnoides Bieb.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia scoparia Schrad.
Monolepis chenopodioides Moq.
Salsola collina Pall.
„ Kali L.
Schizotheca patula Cěl.
Spinacia oleracea L. v. inermis.
Spinacia oleracea L. v. spinosa.

Cistineae.

Helianthemum apenninum D. C.
„ chamaecistus Mill.
„ guttatum Mill.
„ hirsutum Dun.
„ lavandulaefolium Pers.
„ ledifolium Pers.
„ montanum Vis.
„ pulverulentum D. C.
„ rhodanthum Dun.
„ roseum D. C.
„ salicifolium Mill.
„ sanguineum Lag.
„ velutinum Jord.
„ venustum Sweet.
„ violaceum Pers.

Compositae.

Achillea grandifolia Bieb.
„ ligustica All.
Achillea nobilis L.
„ magna L.
„ pectinata Willd.
„ sudetica Opiz.
Achyrachaena mollis Schau.
Alfredia cernua Cass.
Anacyclus officinarum Hayne.
„ radiatus Loisel.
Anthemis arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ Cotula L.
„ incrassata Link.
„ nobilis L.
„ rigescens Willd.
„ ruthenica M.-B.
„ tinctoria L.
Arnica Chamissonis Les.
„ foliosa Nutt.
„ montana L.
Aster alpinus L.
„ Linosyris Bernh.
„ Tripolium L.
Bidens Warszewicziana Regel.
Broteroa trinervata D. C.
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosissimum Ard.
Calendula algeriensis Boiss & Reut.
„ officinalis L.
Calimeris incisa D. C.
Carbenia benedicta Adans.
Carlina longifolia Reichb.
Carthamus tinctorius L.
Catananche caerulea L.
Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit.
„ Cyanus L.
„ macrocephala Puschk.
„ melitensis L.
„ sulphurea Willd.
Chrysanthemum caucasicum Willd.
„ macrophyllum Waldst. & Kit.
„ segetum L.
„ uliginosum Pers.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
Cirsium eriophorum Scop.
„ ferox D. C.
Cladanthus arabicus Cass.
Cnicus benedictus L.

Coreopsis grandiflora Nutt.
Corvisartia Helenium Mérat.
Cosmos bipinatus Cav. hybr. gandifl. albus.
Crepis alpina L.
„ blattarioides Vill.
„ biennis L.
„ rubra L.
„ sibirica L.
Echinops exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ microcephalus Sibth & Sm.
„ niveus Wall.
„ sphaerocephalus L.
Emilia sonchifolia D. C.
Encelia calva A. Gray.
Endoptera aspera D. C.
Erechtites hieracifolia Rafin.
Erigeron alpinus L. fl. albo.
„ canadensis L.
„ compositus Pursh.
„ Coulteri Porter-Coult.
„ macranthus Nutt.
„ pulchellus D. C.
„ speciosus D. C.
Eupatorium aromaticum L.
„ cannabinum L.
Filago germanica L.
„ minima Fries.
Gaillardia pulchella Fourg. v. picta Sweet.
Gnaphalium luteoalbum L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera D. C.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr.-Gray.
„ occidentalis Riddell.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium amplexicaule L.
„ atratum Fries.
„ balcanum Uechrt.
„ barbatum Tausch.
„ cottianum Arv.
„ crocatum Fries.
„ foliosum Waldst. & Kit.
„ longifolium Hornem.
„ pannosum Boiss.
„ reticulatum Lindeb.
Hieracium rupicum All.
„ Schraderi Schleich.
„ scoticiforme Dahlst.
Hypochoeris aethnensis Ball.
„ glabra L.
„ radicata L.
Inula macrocephala Boiss & Kotschy.
Jurinea alata Cass.
„ spectabilis Fisch & Mey.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Koelpinia linearis Pall.
Lactura angustana L.
„ sativa L. v. capitata.
„ virosa L.
Lappa edulis Siebold.
„ minor Hill.
„ nemorosa Koern.
Lapsana communis L.
Leontodon alpinus Vill.
„ autumnalis L.
„ proteiformis Vill.
„ pyrenaicus Gouan.
„ squamosus Lam.
Lepachys pinnatifida Rafin.
Leucanthemum maximum D. C.
Macrorhynchus laevigatus Fisch & Mey.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
Odontospermum maritimum Sch.
Onopordon Acanthium L.
„ arabicum L.
„ tauricum Willd.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes alba L.
Ptarmica speciosa D. C.
Pyrethrum carneum M. B.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
„ Tchihatchewii Hort.
Rhagodiolus edulis Gaertn.
„ Hedypnois Fisch. & Mey.
Rhaponticum cynaroides Less.
„ pulchrum Fisch & Mey.
Rudbeckia bicolor Nutt.
„ maxima Nutt.

Scorzonera angustifolia L.
„ hispanica L.
Senecio Fuchsii C. C. Gmel.
„ subalpinus Koch.
„ vernalis Walldst. & Kit.
Serratula centauroides L.
„ gigantea Desf.
„ radiata M. B.
„ Wolffii Andrae.
Silphium connatum L.
„ terebinthinaceum Jacq.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago sparsiflora A. Gray.
Sonchus asper Hill.
„ laevis Vill.
Tagetes erecta L.
„ patula L. v. nana.
Taraxacum apenninum D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tragopogon ruber L.
Tridax trilobata Hemsl.
Troximon grandiflorum A. Gray.
Tussilago Farfara L.
Tyrimnus leucographus Cass.
Uropappus Clevelandi Greene.
Urospermum picroides F. W. Schmidt.
Verbesina helianthoides H. B. & K. Nov.
Volutarella Lippii Cass.
Xanthium italicum Moretti.
„ macrocarpum D. C.
„ Strumarium Ell.

Convolvulaceae.

Calonyction grandiflorum G. Don.
Argyreia splendens Sweet.
Convolvulus pentapetaloides L.
„ Pseudo-siculus Cav.
Cuscuta glomerata Choisy (Aster perennis).
„ Gronovii Willd. (Linum usitatissimum).
„ Gronovii v. calyptrata Englm. (Aster perennis).
„ japonica Choisy (Aster perennis).
„ maior D. C. (Humulus lupulus„ Urtica divica).
„ planiflora Tenore (Urtica maior).
Evolvus emarginatus Burm.
Ipomaea imperialis Hort.
„ purpurea Roth.
„ sibirica Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.
Pharbitis hispida Choisy.

Crassulaceae.

Sedum Alberti Rgl.
„ aureum Wirtg.
„ Cepaea L.
„ dasyphyllum L.
„ hispanicum L.
„ pinnatum Brot.
„ Selskianum Regel-Maack.

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum J. Gay.
Alyssum argenteum Witm.
„ calycinum L.
„ gemonense L.
„ Wierzbickii Heuff.
Barbarea praecox R. Br.
„ sicula C. & J. Presl.
„ vulgaris R. Br.
Brassica Napus L. v. oleifera, annua.
1. Balcanora.
„ Napus L. v. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.
„ rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1. Awehl.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Carpoceras sibiricum Link.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.

Draba bronchialis D. C.
„ incana L.
„ muralis L.
„ pyrenaica L.
„ verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Reichb.
Erysimum cheiranthoides L.
„ cuspidatum D. C.
„ Perofskianum Fisch & Mey.
„ repandum L.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis Garrexiana All.
Isatis alpina All.
„ canescens D. C.
„ tinctoria L.
Malcomia africana Ait.
Melanosinapis communis Spenn.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ sativus L. var. niger D. C.
„ sativus L. var. oleiferus.
Rapistrum Linnaeanum Boiss & Reut.
Schivereckia podolica Andrz.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. var. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ juncea L.
„ nigra L.
Sisymbrium taraxacifolium D .C.
Syrenia cuspidata Reichb.
Teesdalia Iberis D. C.
Thlaspi arvense L.
„ ceratocarpum Murr.
„ Huetii Boiss.

Cucurbitaceae.

Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Echinocystis lobata Torr & Gray.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Asterocephalus brachiatus Reichb.
„ palaestinus Spreng.
Cephalaria alpina Schrad.
„ graeca Roem & Schult.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb & Schenk.
„ Thihatchewii Boiss.
Dipsacus atratus Hook. f. & Thoms.
„ azureus Schrenk.
„ fullonum Huds.
Knautia magnifica Boiss. & Orph.
Scabiosa caucasica M. B.

Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia agraria Bieb.
„ Bornmülleri Hausk.
„ exigua L.
„ falcata L.
„ Myrsinites L.
„ Peplis L.
„ platyphylla L.
„ Ypecacuanha L.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
„ Fetisowi Regel-Winkler.
„ Kesselringi Regel.
„ lutea L.
„ macrophylla Pall.
„ Olivieri Griseb.
„ tibetica King.
„ triflora Pall.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.
„ Jacquinianum Fisch Mey & Avè Lall.
„ sebaceum Delile.

Geranium columbinum L.
„ dissectum L.
Impatiens biflora Walt.
„ capensis Meerb.
„ cristata Wall.
„ glandulifera Arn.
„ Roylei Walp.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
„ maius L.
„ minus L.

Globulariaceae.

Globularia bellidifolia Salisb.
„ nudicaulis L.
„ trichosantha Fisch & Mey.

Hydrophyllaceae.

Phaceliabipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ chinense L.
„ Gebleri C. A. Mey.
„ grandiflorum Choisy.
„ humifusum L.
„ japonicum Thunb.
„ quadrangulum L.
„ rumelicum Boiss.

Illecebraceae.

Herniaria cinerea D. C.
Scleranthus annuus L.
„ perennis L.

Labiatae.

Ajuga Chia Schreb.
Ballota nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Steph.
„ hirsuta L.
„ incana Mill.
„ officinalis L.
„ orientalis L.
Calamintha Acinos Clair.
„ Clinopodium Spen.
„ Nepeta Savi.
Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
Elsholtzia Patrini Garcke.
Galeopsis latifolia Hoffm.
„ ochrolenca Lam.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch & Mey.
Lophanthus chinensis Benth.
Marrubium candidissimum L.
„ vulgare L.
Melissa officinalis L.
„ pyrenaica Jacq.
Mentha crispa L.
„ gentilis Sm.
„ piperita L.
„ suavis Guss.
„ viridis L.
„ viridis L. v. hortensis Wirtg.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda citriodora Cerv.
„ clinopodia L.
„ Kalmiana Pursh.
Mosla ocymoides Buch & Ham.
Nepeta cyanea Stev.
„ grandiflora Bieb.
„ granatensis Boiss.
„ nuda L.
„ racemosa Lam.
„ ucranica L.
Origanum pulchrum Boiss & Heldr.
„ vulgare L.
Phlomis americana Naud.
„ armeniaca Willd.
„ samia L.
„ tuberosa L.
Preslia árguta Benth.
Prunella elongata Dougl.
„ incisa Link.
„ pyrenaica Philippe
„ Webbiana Loud.
Salvia acaulis Vahl.
„ amplexicaulis Reichb.
„ Bertolonii Vis.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.

Salvia glutinosa L.
„ Horminum L.
„ nilotica Murr.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ Przewalskii Maxim.
„ Pseudo-silvestris Stapf.
„ valentina Vahl.
„ Verbenacea L.
Satureia hortensis L.
„ marifolia Caruel.
„ montana L.
Scutellaria albida L.
„ baicalensis Georgi.
„ commutata Guss.
„ macrantha Fisch.
„ minor Huds.
„ orientalis L.
„ versicolor Nutt.
Sideritis hyssopifolia L.
„ taurica Willd.
Stachys annua L.
„ arvensis L.
„ aurea Benth.
„ heraclea All.
„ lanata Jacq.
„ leucoglossa Griseb.
„ palustris L.
Thymus citriodorus Schreb.
„ transsilvanicus Schur.
„ vulgaris Sm.
Trichostema dichotomum L.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey.

Leguminosae.

Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ boeticus L.
„ canadensis L.
„ cassubicus Jord.
„ Cicer L.
„ cylindraceus D. C.
„ falcatus Lam.
„ galegiformis L.
„ Glycyphyllus L.
„ maximus Willd.
„ monspessulanus L.
„ podocarpus C. A. Mey.
Baptisia minor L.
Caragana arborescens Lam.
„ pygmaea D. C.
Cicer arietinum L.
„ „ „ v. nigrum.
„ „ „ „ rotundum.
Colutea longialata Koehne.
„ orientalis Lam.
Coronilla cretica L.
„ vaginalis Lam.
„ varia L.
Cytisus capitatus Scop.
„ glabrescens Sartor.
„ hirsutus L.
„ leucanthus Walldst.-Kit.
„ ruthenicus Fisch.
„ Weldeni Vis.
Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
„ Lablab L.
„ sesquipedalis L.
„ tuberosus Lam.
Ervum abessinicum Hor.
„ Ervilia L.
„ monanthum Desf.
Galega officinalis L.
„ orientalis Lam.
„ persica Pers.
Genista sagittalis L.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Hosackia Purshiana Benth.
Lathyrus alatus Tenore.
„ articulatus L.
„ Cicera L.
„ cirrhosus Ser.
„ Clymenum L.
„ flaccidus Dalla Torre & Sarnth.
„ Gorgoni Parl.
„ heterophyllus Retz.
„ hirsutus L.
„ incurvus Reichb.
„ maritimus Bigel.
„ megalanthus Steud.
„ montanus Berh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ odoratus L.
„ pisiformis L.
„ pyrenaicus Jord.
„ rotundifolius Willd.

Lathyrus sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ stipulaceus Le Conte.
„ tingitanus L.
„ tuberosus Muhl.

Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumenien).
„ peruviane L.

Lotus edulis L.
„ ornithopodioides L.
„ tenuifolius L.
„ uliginosus Schkuhr.

Lupinus affinis Agardh.
„ albo-coccineus Hort.
„ angustifolius L.
„ angustifolius L. v. albus.
„ Cruckshauksii Hook.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandifolius Lindl.
„ Hilarianus Benth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ polyphyllus Dougl.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
„ sulphureus Dougl.
„ Termis Forsk.

Medicago apiculata Willd.
„ arabica L.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ sativa L.
„ scutellata Pall.
„ Terebellum Willd.

Melilotus altissima Thuill.
„ compacta Salzm.
„ italica Lam.
„ neapolitana Tenore.
„ parviflora Desf.
„ segetalis Ser.
„ sulcata Desf.

Onobrychis Caput-Galli Lam.
„ Crista-Galli Lam.
„ montana D. C.
„ sativa Lam.

Ornithopus sativus L.

Orobus niger L.
„ vernus L.

Oxytropis ochroleuca Bunge.
„ sulphurea Ledeb.

Phaseolus cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. v. carneus.
„ lunatus L.
„ lunatus L. v. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L. compressus Moench.
„ „ „ v. communis.
„ „ „ „ gonospermus Savi.
„ „ „ „ nanus L.
„ „ „ „ nigerrimus Jurs.
„ „ „ „ oblongus Savi.
„ „ „ „ tuberosus.

Pisum arvence L.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Hort.
„ sativum L.
„ „ „ v. abyssinicum
„ „ „ „ Concentator L.
„ „ „ „ Dickson's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.

Soja hispida Moench v. nigra.

Tetragonolobus purpureus Moench.
„ Requienii Fisch & Mey.
„ siliquosus Roth.

Thermopsis caroliniana C. A. Curt.

Trifolium agrarium L.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ arvense L.
„ elegans Savi.
„ glomeratum L.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ libanoticum Ehrenb.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ olympicum Hornem.
„ pannonicum L.
„ pratense L.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ rubens L.
„ trichocephalum M. Bieb.

Trigonella coerulea Ser.
„ Foenum graecum L.
„ monspeliaca L.

Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ Barbazitae Guss & Tenore.
„ cassubica L.
„ cordata Tenore.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ dumetorum L.
„ Faba L. var. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ grandiflora Scop.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii Bieb.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta Fisch & Mey.
„ rubra Walp.
„ sativa L.
„ „ „ v. dalecarliensis.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ thebanensis.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. B.
„ tetrasperma Moench.
„ villosa.

Linaceae.

Linum africanum L.
„ altaicum Fisch.
„ americanum L. v. album.
„ angustifolium Huds.
„ campanulatum L.
„ corymbiferum Desf.
„ extraaxillare Kit.
„ gallicum L.
„ humile L.
„ Lewisii Pursh.
„ maritimum L.
„ Mülleri Moris.
„ perenne L.
„ sibiricum D. C.
„ usitatissimum L.
1. crepitans.
2. hibernum.
3. hungaricum.
„ usitatissimum L. (Erfurt).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Gelbsamiger.

Lythrarieae.

Cuphea petiolata Pohl.
„ Zimapani E. Morr.
Lythrum myrtifolium Lodd.

Malvaceae.

Abutilon Sonneratianum Sweet.
Althaea apterocarpa Fenzl.
„ armeniaca Tenore.
„ atrocarpa Fenzl.
„ chinensis Cav.
„ Heldreichii Boiss.
„ kurdica Schlecht.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
„ spicata Spreng.
„ sulphurea Boiss & Hohen.
Anoda crenatifolia Orteg.
„ cristata Schlecht.
Callirhoë involucrata A. Gray.
Hibiscus africanus Roth.
„ Trionum L.
Kostelezkya pentacarpa Ledeb.
Lavatera cachemiriana Cambess.
„ decumbens G. Don.
„ Davaei Pereira Continho.
„ malvaefolia Cav.
„ neapolitana Tenore.
„ thuringiaca L.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
„ trifida Cav. v. grandiflora Hort.
Malva abyssinica A. Br.
„ borealis Wallm.
„ brasiliensis Desr.
„ Durieui Spach.
„ glomerata Hort.
„ mauritiana L.
„ Morenii Pollini.
„ nicaeënsis All.
„ radiata L.
„ rotundifolia L.
„ silvestris L.
Napaea dioica L.
Palava flexuosa Mast.
„ malvaefolia Cav.
Sidalcea neomexicana A. Gray.
„ oregana A. Gray.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus floribundus Choisy.

Onagrarieae.

Epilobium adnatum Griseb.
„ anagalidifolium Lam.
„ boreale.
„ chilense Haussk.
„ davuricum Fisch.
„ lanceolatum Sebast.
„ spinatum Lam.
Eucharidium grandiflorum Fisch & Mey.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia amoena G. Don.
„ grandiflora Lindl.
„ Lady Satin.
„ Romanzowii Spach.
„ rubicunda Lindl.
„ Whitneyi × Hort.
Jussieua salicifolia H. B. & K. Nov.
Kneiffia floribunda Spach.
„ fruticosa Spr.
„ gracilis Bartl.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera alsinifolia Will.
„ Berteriana Spach.
„ biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ Lamarkiana Ser.

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk (Vicia Faba).
„ Eryngii Duby (Eryngium).
„ flava Mart. (Petasites niveus).
„ Salviae F. Schultz (Salvia glutinosa).

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
„ fungosa Greene.
Argemone Barclayana Penny.
„ mexicana Sweet.
„ sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium Franchetianum Pran.
Corydalis sempervirens Pers.
Eschscholtzia crocea Benth.

Fumaria officinalis L.
Glaucium corniculatum Curt.
„ luteum Scop.
„ phoeniceum Crantz.
„ Sprengeri Heldr.
Hunnemannia fumariaefolia Sweet.
Hypecoum caucasicum Koch.
„ pendulum L.
Papaver album L.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ californicum A. Gray.
„ caucasicum Bieb.
„ dubium L.
„ glaucum Boiss & Haussk.
„ Heldreichii Boiss.
„ hybridum L.
„ nudicaule L.
„ oreophyllum Rupr.
„ orientale L.
„ pavoninum Mey.
„ Rhoeas L.
„ somniferum L.
„ tauricolum Boiss.
Roemeria violacea Medic.

Plantagineae.

Plantago altissima Loisel.
„ arenaria Waldst & Kit.
„ argentea Chaix.
„ Candollei Rafin.
„ Cynops L.
„ graminea Lam.
„ hirtella H. B. & K. Nov.
„ indica L.
„ kamtschatica L.
„ lanceolata L.
„ maior L.
„ maior L. v. monstrosa.
„ media L.
„ Psyllium L.
„ purpurascens Nutt.
„ subulata L.
„ saxatilis Bieb.

Plumbagineae.

Armeria allioides Boiss.
„ alpina Willd.
Armeria boetica Boiss.
„ cassubica Boiss.
„ formosa Haynh.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ plantaginea Willd.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
„ heterophylla Hook.
Gilia crassifolia Benth.
Phlox Drummondii Hook v. grandiflora.
Polemonium boreale Adams.
„ coeruleum L.
„ filicinum Greene.
„ foliosissimum A. Gray.
„ grandiflorum Benth.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ reptans L.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Emex Centropodium Meissn
Polygonum Bistorta L.
„ Convolvulus L.
, Fagopyrum L.
„ Fagopyrum L. v. emarginatum.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ rotundatum Balb.
„ tataricum Gärtn.
„ tataricum Gärtn. v. secalinum.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.
„ Rhaponticum L.
„ „ „ v. (Gross v. Cannstadt.)
„ „ „ v. Cyclop.
„ „ „ v. Delikatess.
, undulatum L.
Rumex Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ altissimus Wood.

Rumex cordifolius Hornem.
„ crispus L.
„ Lunaria L.
„ Patientia L.
„ pulcher L.
„ purpureus Poir.
„ salicifolius Weinm.
„ stenophyllus Ledeb.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schreb.
„ coerulea Schreb.
„ foemina Mill.
„ repens Pomel.
Androsace lactiflora Hort.
„ maxima L.
Asterolimon adoënse Kunze.
Lysimachia japonica Thunb.
„ quadrifolia L.
„ verticillata Bieb.
Primula carpatica Juss.
„ flagellicaulis Kern.
„ grandiflora Link.
„ macrocalyx Bunge.
„ media Peterm.
„ leucophylla Pax.
„ officinalis L.
„ Paxii W.
„ suaveolens Bertol.
„ uralensis Fisch.
„ variabilis Bast.
„ Thomasinii Gren & Godr.

Proteaceae.

Simsia calva A. Gray.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
„ Lycoctonum L.
„ orientale Mill.
„ Stoerkianum Reichb.
„ variegatum L.

Adonis autumnalis L.
„ flammea Jacq.
„ vernalis L.
Anemone cylindrica A. Gray.
„ decapetala J. F. Gmel.
„ multifida Poir.
„ parviflora Michx.
„ rivularis Buch & Ham.
„ virginiana L.
Aquilegia canadensis L.
„ nivea Baumg.
„ Skinneri Hook.
Caltha palustris L.
Clematis recta L.
Coptis anemonaefolia Sieb & Zucc
„ asplenifolia Salisb.
Delphinium bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ decorum Fisch & Mey.
„ dictiocarpum D. C.
„ discolor Fisch.
„ elatum L.
„ fissum Willd.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ paniceum L.
„ Przewalskii Huth.
„ silense Huth.
„ Skinneri Poir.
„ tatsienense Franch.
„ tirolense Kern.
„ tricolor Benth.
„ villosum Stev.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth & Sm.
„ arvensis L.
„ Bourgaei Jord.
„ ciliaris D. C.
„ coarctata C. C. Gmel.
„ damascena L.
„ diversifolia Franch.
„ Garidella Spen.
„ hispanica L.
„ Nigellastrum Willk.
„ orientalis Lam.
„ sativaL.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ lobata Pall.
„ triternata Pall.

Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
Ranunculus acris L.
„ anemonaefolius D. C.
„ chaerophyllus L.
„ cordigerus Viv.
„ Chius D. C.
„ repens L.
„ sceleratus L.
Thalictrum alpinum L.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ cinereum Desf.
„ lucidum L.
„ maius Jacq.
„ medium Jacq.
„ petaloideum L.
„ pyrrhocarpum Ckodi.
„ sibiricum L.
„ sparsiflorum Turcz.
Trautvetteria palmata Fisch & Mey.

Resedaceae.

Reseda alba L.
„ crystallina Webb. & Berth.
„ inodora Reichb.
„ Jacquinii Reichb.
„ Luteola L.
„ Phyteuma L.
„ ramosissima Pourr.
„ stricta Pers.

Rosaceae.

Acaena cordifolia R. B.
„ myriophylla Lindl.
Agrimonia caffra E. Mey.
„ dahurica Willd.
„ Eupatoria L.
„ leucantha Kunze.
„ odorata Mill.
„ parviflora Ait.
„ repens L.
Alchemilla arvensis Scop.
„ pubenscens Bieb.
„ sulphurea L.
Comarum palustre L.

Cotoneaster acutifolia Turcz.
„ multiflora Bunge.
„ nigra Wahlenb.
„ vulgaris Lindl.

Geum album J. F. Gmel.
„ aleppicum Jacq.
„ canadense Murr.
„ chiloënse Balb.
„ coccineum Sibth & Sm.
„ japonicum Thunbg.
„ Laxmanni Gaertn.
„ magellanicum Lechler.
„ pallidum Fisch & Mey.
„ pyrenaicum Mill.
„ rubifolium Lej.
„ tirolense Kern.
„ triflorum Pursk.

Potentilla adscharica Sommier & Levier.
„ albanica Baldacci.
„ andicola Benth.
„ apennina Tenore.
„ astracanica Jacq.
„ astragalina Jacq.
„ calabra Tenore.
„ cataclines Lehm.
„ elegans Schlecht.
„ erecta L.
„ formosa D. Don.
„ geoides Bieb.
„ Hookeriana Lehm.
„ incanescens Opiz.
„ kurdica Boiss & Hohen.
„ montenegrina Pantoč.
„ pimpinelloides L.
„ pulcherrima Lehm.
„ ranunculoides Humb. & Bonpl.
„ salisburgensis Haenke.
„ splendens Ram.
„ tanacetifolia Willd.
„ taurica Willd.
„ Wrangeliana Fisch & Avé-Lall.

Poterium microphyllum Jord.
„ polygamum Walldst & Kit.
„ Sanquisorba L.
„ spinosum L.

Prunus virginica L.

Rosa alpina L.
„ „ „ cinnamomea L.
„ „ „ v. pyrenaica.
„ balsamea Bess.
„ cinnamomea L.
„ ferox Bieb.
„ glutinosa Sibth & Sm.
„ lucida Andr.
„ nitida Willd.
„ nutkana Presl.
„ pimpinellifolia L. v. marmorata.
„ rubrifolia Rupr.
„ spinulifolia Dematra.
„ virginica Mill.
Sanquisorba myriophylla Reichb.
Sibbaldia cuneata Hornem.
„ procumbens L.
Sorbus Hostii Heynh.
„ melanocarpa Heynh.
Spiraea Aruncus L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub & Spach.
„ hexaphylla All.
„ humifusa Bess.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst & Kit.
„ orientalis Boiss & Hohen.
„ scutellaris Vis.
Crucianella aegyptiaca L.
„ gellanica Trin.
„ glauca A. Rich.
Galium Aparine L.
„ cinereum All.
„ Kitaibelianum Schult.
„ tricorne With.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Heuchera glabra Willd.
„ Richardsoni R. Br.
Mitella pentandra Hook.
Ribes pensylvanicum Lam.
Saxifraga crustata Vest.
„ Lapeyrousii D. Don.
„ pendurans Kit.
„ sibirica L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa linifolia Roezl.
Antirrhinum Huetii Reut.
„ maius L.
„ Orontium L.
„ rugosum Lour.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. Nov.
„ scabiosaefolia L.
Chelone Lyoni Pursh.
Digitalis alba Schrank.
„ ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ ferruginea L.
„ fulva Lindl.
„ gloxinoides L.
„ laevigata Waldst & Kit.
„ nevadensis Kunze.
„ ochroleuca Jacq.
„ purpurea L.
Linaria arvensis Desf.
„ genistifolia Mill.
„ multipunctata Hoffmg & Link.
„ reticulata Desf.
„ spuria Mill.
„ triornithophora Willd.
„ vulgaris Mill.
Mimulus Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
„ Sultani Benth.
Penstemon alpinus Torr.
„ diffusus Dougl.
„ procerus Dougl.
„ roseus G. Don.
„ virgatus A. Gray.
Rhinanthus villosus Pers. (Triticum vulgare)
Schistanthe peduncularis Kunze.
Verbascum glabratum Frivald.
„ nigrum L.

Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ Beccabunga L.
„ caucasica M. Bieb.
„ excelsa Desf.
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ hederaefolia L.
„ incana L.
„ lanceolata Benth.
„ longifolia L.
„ maritima L.
„ persica Poir.
„ petraea Stev.
„ polita Fries.
„ praecox All.
„ spuria L.
„ Teucrium L.
„ triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.

Solanaceae.

Anisodus luridus Link & Otto.
Atropa Belladona L.
Browalia grandiflora R. Grah.
„ viscosa H. B. & K. Nov.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura Bertolonii Parl.
„ inermis Jacq.
„ Leichardtii F. Muell.
„ quercifolia H. B. & K. Nov.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Dunalia inermis Boiss.
Hyoscyamus niger L.
„ pallidus Waldst. & Kit.
„ reticulatus L.
Nicandra physaloides Gärtn.
Nicotiana alata Link & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fructicosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca R. Groh.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
Nicotiana paniculata L.
„ rustica L.
„ Sanderiana Hort.
„ silvestris L.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ virginica Agardh.
„ viscosa Lehm.
Physalis philadelphica Lam.
Sarracha Joltomata Schlecht.
„ umbellata L.
Schizanthus grandiflorus Hort.
„ pinnatus Ruiz & Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
„ nigrum L.
„ racemiflorum Dun.

Umbelliferae.

Apium graveolens L. v. fol. crispis.
Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
„ maior L.
Berula angustifolia Mert & Koch.
Bupleurum rotundifolium L.
Capnophyllum dichotomum Lag.
Carum Carvi L.
Caucalis dauçoides L.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ bulbosum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spreng.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
„ „ „ v. lutea (Futtermöhre v. Saalfeld.
„ „ „ v. rubra.
Didiscus pusillus F. Muell.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium eburneum Decne.
„ giganteum Bieb.
Ferula thyrsiflora Sibth & Sm.
Foeniculum capillaceum Gilib.
„ officinale All.
Heracleum barbatum Ledeb.
„ persicum Desf.
„ ternatum Velen.
Laserpitium Panax Gouan.
Levisticum officinale Koch.

Libanotis buchtormensis D. C.
„ sibirica Koch.
Ligusticum scoticum L.
Lophosciadium meifolium D. C.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum austriacum Koch.
„ verticillare Spreng.
Pimpinella rotundifolia M. Bieb.
Prangos thapsioides D. C.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix brachycarpa Guss.
„ Pecten Veneris L.
Selinum Carvifolia L.
Seseli rigidum Waldst. & Kit.
Silaus flavescens Bernh.
„ pratensis Bess.
Siler trilobum Crantz.
Sium sisarum L.
Trachymene pilosa Sm.
Trinia vulgaris D. C.
Xanthogallum purpurascens Avè-Lall.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Urtica Dodartii L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Fedia scorpioides Dufr.
Patrinia intermedia Roem. & Schult.
Valeriana exaltata Mikan.
„ integrifolia Ledeb.
Valerianella coronata D. C.
„ membranacea Loisel.

Verbenaceae.

Verbena bonariensis L.
„ quadrangularis Vell.
„ teucroides Gill & Hook.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola altaica Ker & Gawl.
„ canadensis L.
„ dactyloides Roem & Schult.
„ Jovi Janka.
„ labradorica Schrank.
„ lusitana Brot.
„ Munbyana Boiss.
„ rothomagensis Desf.
„ tricolor L. v. arvensis.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Anacampseros arachnoides Sims.
Aspidistra elatior Bl.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb v. picta.
Bryophyllum crenatum Baker.
Chloranthus erectus Sweet.
Convulvulus Cneorum L.
Crassula lycopodioides Lam.
Cuphea platycentra Benth.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Dyckia rariflora Schult.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia alpestris Gardn.
„ corallina Hort.
„ gracilis Lindl.
„ procumbens R. Cunn.
Kleinia articulata Harw.
Libonia floribunda C. Koch.
Mackaya bella Harw.
Mesembryanthemum anceps Haw.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ caulescens Mill.
„ crassulinum Spreng.
„ curvifolium Haw.
„ deltoides L.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckel & Zeyh.
„ spectabile Haw.
Mesembryanthemum splendens L.
„ subincanum Haw.
„ Thunbergii Haw.
„ tumidulum Haw.
„ violaceum D. C.
Nephrolepis bostoniensis Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ophiopogon japonicus Ker & Gawl.
„ Jaburan Lodd.
Othonna crassifolia Harv.
Piper geniculatum Sw.
„ nigrum L.
Polypodium Lingua.
Reineckia carnea Kunth.
Rhipsalis Saglionis Otto.
„ grandiflora Haw.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Salvia involucrata Cav.
Sansevieria zeylanica Willd.
Sedum sarmentosum Bunge.
„ Sieboldi Hort. fol. med. pictis.
„ Stahli Hort.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ Martensii Spring.
„ uncinata Spring.
Sempervivum tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.
„ decorum Christ.
Strobilanthes Dyerianus Hort.
Tencrium Marum L.
„ fruticans L.
Veronica Traversii Hook.
Viburuum Tinus L.
Zingiber Zerumbet Rosc.

Tábor in Bohemia, 15. die m. Decembris 1914.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

J. Svoboda,
hortulanus.

V. Trojan,
seminum conservator.

Hortus botanicus regiae Academiae agronomicae bohemicae Táborensis.
(Tábor, Bohemia, Austria.)

QK73 .T3 T37

IX.

Delectus seminum plantarum

anno 1914 collectorum.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Aroideae.

Richardia tingitana Roth.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
„ brevicollis D. C.
„ cyperoides L.
„ curvata Knaf.
„ distans L.
„ elongata L.
„ glauca Murr.
„ Hornschuchiana Hoppe.
„ lamprocarpa Čel.
„ leporina L.
„ muricata L.
„ pallescens L.
„ paniculata L.
„ paradoxa Willd.
„ Pseudo-cyperus L.
Carex pulicaris L.
„ remota L.
„ secalina Wahl.
„ sempervirens Vill.
„ stenophylla Wahlenb.
„ vesicaria L.
„ vulpina L.
Scirpus Holoschoenus L.

Gramineae.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.
„ chinensis Fisch.
„ fatua L.
„ nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. flava.
2. „ „ for. mutica.
3. „ obtusata All. alba (Hungaria).

4. var. a) pugnax Al.
b) „ „ (Polend).
5. „ a) tatarica (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
6. „ a) tristis Al. (Hungaria).
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. aristata Kcke.
2. „ a) aurea Kcke. (Bourbon).
b) „ „ (Osetia Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
3. „ brunnea Kcke.
4. „ grisea Kcke.
5. „ Krausei Kcke.
6. „ montana Alef.
7. „ mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt.
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Hirsch.
h) Landa's Grün-Hafer.
i) Lapponia.
j) Leutewitz.
k) Ligowo.
l) Oderbuch.
m) Podolia.
n) Polonia.
o) Probstei.
p) Romania.
r) Silesia.
s) Triumf.
8. „ a) nigra Krause (Étampes).
b) „ „ (Fennia).
c) „ „ (Kylbergensis).
9. „ a) praegravis Langenthal Australia).
b) „ Langenthal (Germania).
c) „ Langenthal (Scotia).
d) praegravis Langenthal (Willkommen).
10. „ setosa Kcke.
11. „ a) trisperma Schübler, aristata.
b) „ „ inermis.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
a) Altona.
b) Dania.
c) Imperial.
d) Webbii.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
a) Bavaria.
b) Bestehorn.
c) Chevalieri.
d) Chile.
e) giganteum.
f) Hierosolyma.
g) Landa's Porter.
h) Melonen Gerste.
i) Philadalphia.
j) Phoenix.
k) Probstei.
l) Nolč's Imperial Typ A.
m) „ „ „ B.
n) „ „ „ C.
o) „ Bohemia Gerste.
p) „ böhmische früheste.

Hordeum distichum L.

8. var. spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
   b) „ „ (himalayense).
   c) „ „ (japonicum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
   b) „ „ (brachyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
   a) Italia.
   b) Marocco.
   c) Mandschuria.
   d) Norvegia.
   e) Peru.
   f) Rimpaui.
   g) Cyprus.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
   b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).
   b) „ Kcke (oryzoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke.
   b) „ „ (coerulescens).

Hordeum zeocriton L.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ album erectum B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.

Hordeum Steudellii ♀ × trifurcatum ♂ D.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ F.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ G.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ H.
„ zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ A.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ B.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ C.
„ „ ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.

a) album, furcatum, nudum, distichum.
b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.

a) Brandeburg.
b) giganteum.
c) nivale.
d) Petkuss.
e) Saxonicum, vulgare.
f) Sibiricum.
g) Stauden Roggen (Saxonia).
h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.

1. var. clavatum Alef.
2. „ a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
   b) creticum Mazz. (Palermo).
3. „ icterinum Alef. (Sommer-Igel-Weizen).
4. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.
2. „ atratum Host.
3. „ brunneum Alef.
4. „ campylodon Kcke.
5. „ cladurum Alef.
6. „ farrum Bayle.
7. „ Fuchsii Kcke.
8. „ Krausei Alef.
9. „ liguliforme Kcke.
10. „ pycnurum Alef.
11. „ rufum Schübl (Roter Sommer).
12. „ rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.

a) Blé de Medéah (Vilmorin).
b) Blé de Xeres (Vilmorin).
c) creticum.
d) durospermum.
e) Germerode.
f) Malaga.

1. var. affine Kcke.
2. „ africanum Kcke.
3. „ alexandrinum Kcke.
4. „ campylodon Kcke (Palermo).
5. „ fastuosum Lag.
6. „ hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagaria).
7 „ leucomelan Alef. (Ohio).
8. „ libycum Kcke.
9. „ melanopus Alef. (Sadowska sivoklasa Zagaria).
10. „ murciense Kcke.
11. „ obscurum Kcke.
12. „ plenissimum.
13. „ provinciale Alef.
14. „ Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.

1. var. Hornemanni Clem.
2. „ vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. var. chrysospermum Kcke.
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum.
7. „ rufescens Kcke.
8. „ a) velutinum (latum).
   b) „ (quadratum).
9. „ villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ Arduini Mazz.
4. „ coeruleum Alef.
5. „ Duhamelianum Mazz.
6. „ vulpinum Alef.

Triticum Thaoudar Boiss.

Triticum Tumonia Schrad.

Triticum turgidum L.

a) Běloturka (gub. Saratow).
b) compositum.
c) Mammuth.
d) Marathon.

1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie).
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestenseni.
4. „ barbarossa Alef.
5. „ caesium Alef.
6. „ coeruleo-velutinum Kcke.
7. „ erythrospermum Kcke.
   a) aristatum.
   b) Petali.
   c) Salermo.
8. „ ferrugineum Alef.
   a) Hunderttägig.
   b) Umea.
9. „ graecum Kcke.
10. „ Hostianum Clem.
11. „ leucospermum Kcke.
12. „ milturum Alef. (Heine's Bordeaux).

Triticum vulgare L.

13. var. muticum Bayle.
    a) Australia.
    b) California.
    c) Heine's W.
    d) Noë's W.
    e) Schlandstaedt.
    f) Slané (Bohemia).
14. » pyrotrix Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

a) gigentea.
b) Sibiria.
1. var. a) aurea Kcke. (Mönchhafer.
   b) aurea Kcke.
2. » grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum hexastichum L.

1. var. brachyurum
2. „ a) giganteum (ertragreichste).
   b) giganteum Chrestenseni (verbesserte).
   c) giganteum Chrestenseni perlatum.
3. „ luteum.
4. „ nigrum.

Hordeum tetrastichum L.

a) Alberti.
b) Chrestenseni.
c) Groeningense.
d) luteum.
e) Mammuth.
1. var. lupulinum.
2. „ nigrum Willd.

Secale anatolicum Boiss.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna, montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
1. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's- R.
18. Chrestensen'-R. giganteum.
19. Chestensten's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harz).
21. Riesen-Staudenroggen.
22. Landa's Hanibal R.
23. Colossal- hybridum.
24. Buhlendorf.
25. Altpaleschkener R.
26. Hadmersleben.
27. Trispermum.
28. Wasa.
29. St. Johannis.
30. Nyland.
31. Schlaraffen-Roggen.
32. Zeelander Original.
33. Hungaria.
34. Mährischer Stauden-R.
35. Mumien-R.
36. Bric.
37. Petkuss.
38. Rügenscher R.
39. Hessischer Garde du Corps.
40. Correns Stauden-R.
41. Hispanicum.
42. Suecicum.
43. Banaticum.
44. Schlanstaedt, giganteum.
45. Champagner Stauden-R.
46. Alpinum.
47. März.
48. Romanum.
49. Montagner Degenerirter Riesen R.
50. Chrestensen's Triumph R.
51. Branisch Excelsior R.
52. Chrestensen's Kolben R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Secale dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.

Secale perenne Guss.

Triticum compactum Host.

„ „ „ **Binkel W.**

„ „ „ **var. sericeum.**

Triticum dicoccum Schr.

„ dicoccum Schr. var. nigrum (Amidonnier).

„ dicoccum Schr. var tricoccum Schübl.

„ dicoccum Schr. Schwarzer sammetiger W.

„ dicoccum Schr v. Bauhini Al. (Roter sammetiger W.).

„ dicoccum Schr. v. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides Bal.

Triticum Spelta L.

1. albovelutinum Kcke.
2. album (aristatum) Al.
3. album (inerme) Al.
4. Alefeldii Kcke.
5. coeruleum Al. (Kolben W.).
6. dasyanthum.
7. erubescens aristatum.
8. rubrum.
9. vulpinum Al.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. „ centigrammum.
3. „ compositum (velutinum).
4. „ „ (Mirakel).
5. „ dinura Al. (Helena).
6. „ gentile Al. ((Blé poulard blanc lisse ou carré).
7. „ graecum (Korinthus).
8. var. jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
   „ jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.)
   „ jodura Al. (Paine,s Defiance).
   „ jodura Al. (Riwet's Grannen-W.).
   „ jodura Al. (schottischer rauher Winter W.).
9. „ melanatherum Kcke. (Petanielle noir de Nice).
10. „ mirabile Kcke. (Ihrwetter).
    „ „ „ (Schwarzer sammetiger Wunderweizen).
11. „ pseudo-cervinum Kcke.

Triticum vulgare L.

var. a l b o r u b r u m Kcke.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red. chaff de Dantzick.

var. a r i s t a t u m Schübl.

1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square-head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Golden Cross.
12. Japonischer W.
13. Johnson's W.
14. Nouette de Lausanne.
15. Russischer W.
16. Schwarzer persischer W.
17. Robert's W.
18. Chrestensen's Square-head.
19. Michigan bronce.

var. c y a n o t h r i x Kcke.

var. e r y t h r o s p e r m u m Kcke.

1. Bestehorn's W.
2. Horford's Michigan bronce.
3. Kis-Tur (Hungaria).

var. ferrugineum Al.

Tritigum vulgare L.

1. Rimpau's-W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerirter W.
3. Fuchs W.

var. lutescens Al.

1. Juli W.
2. Lammas.
3. Kaiser W.

var. miltura Al.

1. Hallet's red. Nursery.
2. Blé rouge de St. Land.
3. Cover's red. Wheat.
4. Spalding prolific Wheat.

var. muticum Bayle.

Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
3. Kujava.
4. White Chiddam Wheat.
5. Noë's Früh W.
6. Aleph Vilmorin's W.
7. Champion white.
8. Amerika (leucospermum album arenarium).
9. Zeelander W. (Original).
10. Koström Original W.
11. Kaiser Wilhelm.
12. Hallet's red pedigrée.
13. Hickling's prolific.
14. Golden Drop. W. (verbessert).
15. Martin Amber (Amerika).
16. Hartwood's W.
17. Vilmorin.
18. Sandomir Original W.
19. Probsteier roter.
20. Matinoha.
21. Grösster Goldweizen.
22. Richmond's Riesen W.
23. Goldene Perle.
24. Svalöf.
25. Ungarischer weisser, glatter.
26. Neapol.
27. Bestehorn's »Coloss«.
28. Westfalischer Land Weizen.
29. Kalifornia (album).
30. Amerika borealis.
31. »Nordstrand« (album).
32. Probsteier.
33. Scotia (rubrum).
34. Iverness Hochland W.
35. Cimbal's Gelb. W.
36. Heine's Bordier.
37. Rimpau's Früher Bastardweizen.
38. Besseler's No 1.
39. Epp.
40. Tarver W.
41. Model v. Bestehorn.
42. Spalding's prolific.
43. Browick red.
44. Bestehorn's Dividendenw.
45. Red. Mary gold.
46. Browick red rubrum.
47. Schariff's Square head, Orig.
48. Besseler's Square head.
49. Kirsche's Square head.
50. Mette's Square head.
51. Strube's Square head.
52. Breustedt's kurzer Square head.
53. Anderbeck Square head.
54. Leutowitz Square head.
55. Bore-Svalöf.
56. Extra Svalöf Square head.
57. Original Schiriffw.
58. Böhmischer roter Wechselw.
59. North Allerton.
68. Hunter's White Wheat.
61. Englischer brauner W.
62 Böhmischer sammetiger Kolben-W.
63. Aleph.
64. Richelle blanc de Naples.
65. Rouge inversable.
66. Schottischer blutroter.
67. Massey.
68. Hunter's White Wheat.
69. Smogger-W.
70. Romanella.
71. Talavera.
72. Horfords Winter Perl.
73. Feuton.
74. Ungarischer roter.
75. Chiddam weisser Urbst.
76. Hybridi inversable.
77. Schilf-W.
78. Amerik. Willits.
79. Preis von Oxford.
80. Urtoba.

Triticum vulgare L.

81. Marenil.
82. Blé Talavera de Bellevue.
83. De Blaic.
84. Blanc a duvet veloute.
85. Manhattan.
86. Victoria d'Autome.
87. Braunähriger Märkischer W.
88. Golden Drop (verbessert).
89. Flandrischer-W.
90. White Trump.
91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
92. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
93. Griewerner Weizen.
94. Elys.
95. De Crepi.
96. Hopetown Wheat.
97. Briguet.
98. Galland.
99. Hickling's W.
100. Dattelweizen.
101. Blausamtiger Kolben W.
102. Weizen Roggen.

var. villosum Al.

1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.

var. pyrothix Al.

1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
2. Sammetiger Square head.

Aegilops Aucheri Boiss.
„ caudata L.
„ cylindrica Host.
„ macrura Jaup & Spach.
„ ovata L.
„ speltoides Tausch.
„ squarrosa L.
„ triticoides L.
„ triuncialis L.
„ ventricosa Tausch.
Aegopogon pusillus Beauv.
Agrostis alba L. v. maior.
„ canina L.
„ interrupta L.
„ rupestris All.
„ Spica-venti L.
Agrostis stolonifera L.
„ stolonifera L. v. gigantea Gaud.
„ vulgaris With.
Aira bottnica Wahlenb.
„ caespitosa L.
„ flexuosa L.
„ lendigera Lag.
„ media R. & Sch.
„ mollis Schreb.
Alopecurus agrestis L.
„ arundinaceus Poir.
„ brachystachyus Bieb.
„ castellanus Boiss & Reut.
„ nigricans Hornem.
„ pratensis L.
Andropogon argenteus D. C.
„ distachyus L.
„ Gryllus L.
„ Ischaemum L.
Anthoxanthum gracile Bivon.
„ odoratum L.
„ „ v. longe-aristatum.
Antinoria agrostidea Parl.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Atropis distans Rupr.
Avena bromoides Gouan.
„ compressa Heuff.
„ desertorum Less.
„ Hostii Boiss & Reut.
„ planiculmis Schrad.
„ pratensis L.
„ pubescens Huds.
„ sterilis L.
„ sulcata J. Gay.
Boissiera bromoides Hochst & Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium gracile Beauv.
„ pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
„ media L.
„ rufibarba Boiss.
Bromus arvensis L.
„ asper Murr.
„ brachystachys Hornem.
„ caprinus Kerner.
„ ciliatus Pursh.

Bromus commutatus Ehrh.
" erectus Huds.
" laxus Reichb.
" longiflorus Spreng.
" inermis Leyss.
" madritensis Del.
" marginatus Steud.
" mollis L.
" patulus M. & K.
" racemosus L.
" Schraderi Kunth.
" secalinus L.
" serotinus Beneken.
" squarrosus L.
" sterilis L.
" tectorum L.
Calamagrostis arundinacea Roth.
" Halleriana D. C.
" lanceolata Roth.
" montana D. C.
Catabrosa aquatica Beauv.
Cinna mexicana Beauv.
Cornucopiae cuculatum L.
Corynephorus canescens Beauv.
Crypsis aculeata Ait.
" alopecuroides Schrad.
" schoenoides Lam.
Cynosurus cristatus L.
" echinatus L.
" siculus Jacq.
Dactylis Aschersoniana Gräb.
" glomerata L.
Deschampsia juncea Beauv.
Eleusine oligostachya Link.
" Tocussa Fresen.
Elymus arenarius L.
" giganteus Vahl.
" glaucifolius Muhl.
" hordeisformis Desf.
" mexicanus Cav.
" sabulosus M. Bieb.
" virginicus L.
Eragrostis amabilis L.
" Borrelieri Daveau.
" chilensis Nees.
" elegans Nees.
" maior Host.
" minor Host.
" nigra Nees.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
" plumosa Link.
Festuca alpina L.
" amethystina L.
" ampla Hack.
" argentea Savi.
" arundinacea Schreb.
" borealis Mert & Koch.
" duriuscula Jacq.
" elegans Boiss.
" exaltata Presl.
" gigantea Vill.
" glauca Lam.
" Halleri All.
" heterophylla Lam.
" indigesta Boiss.
" Myurus L.
" ovina L.
" " v. glauca Schrad.
" " v. hispida.
" pallens Host.
" Pančičii Haenkl.
" Pančičiana Hand-Mazz. & Jauch.
" pratensis Huds.
" psammophila Hack.
" Pseudovina Hack.
" rhoetica Suter.
" rigida Kunth.
" rubra L.
" " v. fallax.
" " v. heterophylla.
" silvatica Vill.
" spectabilis Jan.
" tenuifolia Sibth.
" vaginata Waldst. & Kit.
" varia Haenkle.
" violacea Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Hierochloë borealis Roem & Schult.
Hilaria rigida Vasey.
Holcus lanatus L.
" mollis L.
" tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
" cylindricum Murr.
" murinum L.
" secalinum Schreb.
Haynaldia villosa Schur.

Koeleria albescens D. C.
„ alpicola Gren & Godr.
„ crassipes Lange.
„ cristata Pers.
„ glauca D. C.
„ gracilis Pers.
„ hirsuta D. C.
„ rupicola Boiss & Reut.
„ splendens Presl.
„ valesiaca Gaud.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis argentea Link.
Lolium canadense Michx.
„ multiflorum Lam.
„ perenne L.
„ remotum Schrk.
„ temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ eligulata Boiss.
„ maior Sibth & Sm.
„ nebrodensis Parl.
„ pyramidalis Lam.
„ transsilvanica Schur.
Milium nigricans Ruiz & Pav.
Molinia caerulea Moench.
„ „ v. arundinacea Schrank.
Muehlenbergia glomerata Trin.
„ silvatica Torr & Gray.
Panicum altissimum Jacq.
„ bulbosum H. B. & K. Nov.
„ californicum Benth.
„ capillare L.
„ ciliare Retz.
„ colonum L.
„ Crus Galli L.
„ „ „ „ v. maior.
„ italicum L.
„ macrourum Trin.
„ miliaceum L. v. album.
„ „ „ „ badium Kcke.
„ „ „ „ flavum Kcke.
„ „ „ „ nigrum Alef.
„ „ „ „ sanguineum Kcke.
Panicum miliaceum L. v. subsanguineum Kcke.
„ oryzoides Sw.
„ sanguinale L.
Paspalum tenellum Willd.
Phalaris brachystachys Link.
„ bulbosa L.
„ canariensis L.
„ coerulea Desf.
„ minor Retz.
„ paradoxa L.
Phleum asperum Willd.
„ Boehmeri Willd.
„ cuspidatum Willd.
„ intermedium Jord.
„ Michelii All.
„ parnassicum Boiss & Heldr.
„ phalaroides Koel.
„ pratense L.
„ „ „ v. nodosum L.
„ serotinum Jord.
„ subulatum Spreng.
„ tenue Schrad.
Poa abyssinica Jacq.
„ alpina L.
„ badensis Haenke.
„ bulbosa L.
„ caesia Sm.
„ cenisia All.
„ compressa L.
„ firmula S. F. Gray.
„ laxa Haenke.
„ nemoralis L.
„ „ „ v. rigidula.
„ „ „ v. saxatilis.
„ nevadiensis Vasey.
„ palustris L.
„ pannonica Korn.
„ pratensis L.
„ pumila Host.
„ silvatica Chaix.
„ trivialis L.
„ versicolor Bess.
Schismus marginatus Beauv.
Sesleria uliginosa Opiz.
Setaria germanica Roth.
„ glauca P. B.
„ italica P. B.
„ italica P. B. v. breviseta.

Setaria japonica Pynaert.
„ persica P. B.
„ verticillata P. B.
„ viridis P. B.
Sorghum vulgare Per. v. Arduini Jacq.
Stipa aristella L.
„ Calamagrostis Wahl.
„ calatajeronensis Tineo.
„ capillata L.
„ gigantea Lag.
„ Grafiana Stev.
„ juncea Sibth.
„ Lagascae Roem & Schult.
„ Lessingiana Trin.
„ pennata L.
„ pubescens R. Br.
„ splendens Trin.
„ tenacissima L.
Trisetum alpestre Beauv.
„ argenteum Roem & Schult.
„ distichophyllum Beauv.
„ pratense Pers.
Triticum caninum Schreb.
Ventenata avenacea Koel.
Zea gracillima Koern.
„ mais L. v. Cinquantino.
„ „ „ „ Nanerottolo.
„ „ „ „ oryzoides.
„ „ „ „ rubra.
„ „ „ „ translucens.

Irideae.

Crocus speciosus Bieb.
Gladiolus palustris Gaud.
„ segetum Ker & Gavl.
Iris arenaria Waldst. & Kit.
„ cristata Ait.
„ setosa Pall.
„ sibirica Hook & Arn.
„ spuria L.
„ versicolor L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
„ compressus Jacq.
„ conglomeratus L.
„ effusus L.
Juncus fuscoater Schreb.
„ glaucus Ehrh.
„ obtusiflorus Ehrh.
„ squarrosus L.
„ tenuis Willd.
Luzula albida D. C.
„ angustifolia Poir.
„ campestris D. C.
„ erecta Desv.
„ racemosa Desv.
„ spadicea D. C.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ angulosum L.
„ atroviolaceum Boiss.
„ baicalense Willd.
„ fallax Schult.
„ fistulosum L.
„ flavum L.
„ Kochii Lange.
„ Ledebourianum Schult.
„ Libani Boiss.
„ odorum L.
„ oleraceum L.
„ pallens Sibth. & Sm.
„ planifolium D. C.
„ Scorodoprasum L.
„ tulipaefolium Ledeb.
Anthericum algeriense Boiss & Reut.
„ graminifolium Willd.
„ Liliastrum L.
Bulbine alloides Willd.
Colchicum autumnale L.
Eremurus robustus Regel.
Hyacinthus amethystinus L.
„ ciliatus Cyrill.
„ dubius Guss.
Lilium pyrenaicum Gouan.
Muscari comosum Mill.
„ praecox Siehe.
Scilla campanulata Ait.
„ festalis Salisb. v. nutans Sm.
„ italica L.
„ peruviana L.
„ sibirica Andr.
Veratrum nigrum L.

Dicotyledoneae.

Amaranthaceae.

Amaranthus bullatus Bess.
" caudatus L.
" crassipes Schlecht.
" elegantissimus Hort.
" flavus L.
" polygamus L.
" retroflexus L.
" silvestris Desf.
" spinosus L.
" tortuosus Hornem.
Euxolus lividus Moq.
Froelichia gracilis Moq.
Scleropus amaranthoides Schrad.

Araliaceae.

Aralia chinensis L.

Aristalochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

Asclepias purpurascens L.
" speciosa Torr.
Vincetoxicum canescens Decne.
" luteum Hoffmg. & Link.
" nigrum Mönch.

Berberideae.

Berberis Thunbergii D. C.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi Bureau & Franch.

Boragineae.

Anchusa italica Retz.
" myosotidiflora Lehm.
" officinalis L.
" osmanica Vel.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum bicolor Willd.
" cheirifolium L.
" furcatum Wall.
" magellense Tenore.
" nebrodense Guss.
" officinale L.
" Wallichii G. Don.
Echium plantagineum L.
" rosulatum Lange.
" rubrum Jacq.
Lappula Myosotis Moench.
Lindeloffia longiflora Baill.
Lithospermum sibiricum Lehm.
Myosotis orientalis Lam.
" stricta Link.
Nonnea lutea Reichb.
Rindera canescens D. C.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch.
" Lamarkii Fisch.
" latifolia Fisch.
" lilifolia Ledeb.
" marsupiiflora Fisch.
" polymorpha Ledeb.
Campanula aggregata Willd.
" alliariaefolia Willd.
" alpina L.
" glomerata L.
" lamiifolia Bieb.
" latifolia L.
" linifolia Scop.
" macrantha Boiss.
" Medium L.
" nobili-macrantha Regel.
" Rapunculus L.
" vernalis L.
Downingia elegans Torr.
" pulchella Torr.
Jasione perennis Lam.
Lobelia Cliffortiana L.
Phyteuma campanuloides M. Bieb.
" canescens Waldst. & Kit.
" spicatum L.

Specularia Speculum A. D. C.
Wahlenbergia lobeloides D. C.
„ mutabunda A. D. C.

Capparideae.

Cleome fugax Schrad.
„ speciosissima Deppe.
„ viscosa L.
Polanisia brachysperma Torr & Gray.
„ viscosa L.

Caryophylleae.

Agrostemma Coronaria L.
„ Flos-Jovis L.
„ Githago L.
„ nicaeensis Pers.
„ Walkeri Hort.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium triviale Link.
Dianthus Armeria L.
„ calocephalus Boiss.
„ glacialis Haenke.
„ pelviformis Heuff.
„ petraeus Waldst. & Kit.
„ pubesceus Sibth & Sm.
„ superbus L.
Drymaria cordata Willd.
Eudianthe corsica Reichb.
Gypsophila acutifolia Fisch.
„ altissima L.
„ dichotoma Bess.
„ elegans Bieb.
„ fastigiata L.
„ muralis L.
„ paniculata L.
„ perfoliata Boiss.
„ saligna Schrad.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis chalcedonica L.
„ Coeli-rosa Desv.
„ cruenta Griseb.
„ fulgens Fisch.
„ Githago Scop.
„ Haageana Regel.
Melandryum eriocalycinum Boiss.
„ firmum Rohrb.
„ noctiflorum Fries.
„ pratense Roehl.
„ Zawadski A. Br.

Saponaria depressa Bivon.
„ persica Boiss.
„ Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
„ babylonica Boiss & Noé.
„ Billeniana Schott.
„ bellidifolia Jacq.
„ bipartita Desf.
„ catholica Ait.
„ caucasica Boiss.
„ conoidea L.
„ Fabaria Sibth & Sm.
„ Friwaldskyana Hampe.
„ gigantea L.
„ tatarica Pers.
„ transsilvanica Schur.
„ vallesiaca Link.
„ Zawadzkii Herbich.
Spergula arvensis L.
„ „ „ var. maxima Wall.
„ „ „ „ sativa.
Tunica velutina Fisch & Mey.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
„ parviflora Mönch.
Velezia rigida L.
Viscaria alpina G. Don.
„ atropurpurea Griseb.
„ purpurea Wimm.

Celastrineae.

Euonymus latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Ambrina chilensis Spach.
Arthrocnemum macrostachyum Bunge.
Atriplex hortensis L.
„ „ „ v. rubra.
„ „ „ „ semibaccata R. Br.
Axyris amaranthoides L.
Beta longespicata Moq.
„ maritima L.
„ patula Ait.
„ scutellaris Moq.
„ trigina Waldst.-Kit.
„ vulgaris L. v. altissima (Schreiber's Elite).

Beta vulgaris L. v. altissima (Schreiber's Specialität).
„ vulgaris L. v. cicla rubra (Salatrübe).
Blitum capitatum L.
Chenopodium album L.
„ Botrys L.
„ ficifolium Sm.
„ hybridum L.
„ maritimum L.
„ polyspermum L.
„ Quinoa Willd.
„ virgatum Thunb.
„ Vulvaria L.
Corispermum canescens Kit.
„ hyssopifolium L.
„ intermedium Schweig.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Hablitzia thamnoides Bieb.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia scoparia Schrad.
Monolepis chenopodioides Moq.
Salsola collina Pall.
„ Kali L.
Schizotheca patula Cěl.
Spinacia oleracea L. v. inermis.
Spinacia oleracea L. v. spinosa.

Cistineae.

Helianthemum apenninum D. C.
„ chamaecistus Mill.
„ guttatum Mill.
„ hirsutum Dun.
„ lavandulaefolium Pers.
„ ledifolium Pers.
„ montanum Vis.
„ pulverulentum D. C.
„ rhodanthum Dun.
„ roseum D. C.
„ salicifolium Mill.
„ sanguineum Lag
„ velutinum Jord.
„ venustum Sweet.
„ violaceum Pers.

Compositae.

Achillea grandifolia Bieb.
„ ligustica All.
Achillea nobilis L.
„ magna L.
„ pectinata Willd.
„ sudetica Opiz.
Achyrachaena mollis Schau.
Alfredia cernua Cass.
Anacyclus officinarum Hayne.
„ radiatus Loisel.
Anthemis arvensis L.
„ austriaca Jacq.
„ Cotula L.
„ incrassata Link.
„ nobilis L.
„ rigescens Willd.
„ ruthenica M.-B.
„ tinctoria L.
Arnica Chamissonis Les.
„ foliosa Nutt.
„ montana L.
Aster alpinus L.
„ Linosyris Bernh.
„ Tripolium L.
Bidens Warszewicziana Regel.
Broteroa trinervata D. C.
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosissimum Ard.
Calendula algeriensis Boiss & Reut.
„ officinalis L.
Calimeris incisa D. C.
Carbenia benedicta Adans.
Carlina longifolia Reichb.
Carthamus tinctorius L.
Catananche caerulea L.
Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit.
„ Cyanus L.
„ macrocephala Puschk.
„ melitensis L.
„ sulphurea Willd.
Chrysanthemum caucasicum Willd.
„ macrophyllum Waldst. & Kit.
„ segetum L.
„ uliginosum Pers.
Cichorium Endivia L.
„ Intybus L.
Cirsium eriophorum Scop.
„ ferox D. C.
Cladanthus arabicus Cass.
Cnicus benedictus L.

Coreopsis grandiflora Nutt.
Corvisartia Helenium Mérat.
Cosmos bipinatus Cav. hybr. gandifl. albus.
Crepis alpina L.
„ blattarioides Vill.
„ biennis L.
„ rubra L.
„ sibirica L.
Echinops exaltatus Schrad.
„ globifer Janka.
„ microcephalus Sibth & Sm.
„ niveus Wall.
„ sphaerocephalus L.
Emilia sonchifolia D. C.
Encelia calva A. Gray.
Endoptera aspera D. C.
Erechtites hieracifolia Rafin.
Erigeron alpinus L. fl. albo.
„ canadensis L.
„ compositus Pursh.
„ Coulteri Porter-Coult.
„ macranthus Nutt.
„ pulchellus D. C.
„ speciosus D. C.
Eupatorium aromaticum L.
„ cannabinum L.
Filago germanica L.
„ minima Fries.
Gaillardia pulchella Fourg. v. picta Sweet.
Gnaphailum luteoalbum L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera D. C.
Helianthus annuus L.
„ cucumerifolius Torr.-Gray.
„ occidentalis Riddell.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium amplexicaule L.
„ atratum Fries.
„ balcanum Uechrt.
„ barbatum Tausch.
„ cottianum Arv.
„ crocatum Fries.
„ foliosum Waldst. & Kit.
„ longifolium Hornem.
„ pannosum Boiss.
„ reticulatum Lindeb.
Hieracium rupicum All.
„ Schraderi Schleich.
„ scoticiforme Dahlst.
Hypochoeris aethnensis Ball.
„ glabra L.
„ radicata L.
Inula macrocephala Boiss & Kotschy.
Jurinea alata Cass.
„ spectabilis Fisch & Mey.
Kentrophyllum leucocaulon D. C.
Koelpinia linearis Pall.
Lactura angustana L.
„ sativa L. v. capitata.
„ virosa L.
Lappa edulis Siebold.
„ minor Hill.
„ nemorosa Koern.
Lapsana communis L.
Leontodon alpinus Vill.
„ autumnalis L.
„ proteiformis Vill.
„ pyrenaicus Gouan.
„ squamosus Lam.
Lepachys pinnatifida Rafin.
Leucanthemum maximum D. C.
Macrorhynchus laevigatus Fisch & Mey.
Madia sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
„ inodora L.
Odontospermum maritimum Sch.
Onopordon Acanthium L.
„ arabicum L.
„ tauricum Willd.
Picridium dichotomum Fisch & Mey.
Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes alba L.
Ptarmica speciosa D. C.
Pyrethrum carneum M. B.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
„ Tchihatchewii Hort.
Rhagodiolus edulis Gaertn.
„ Hedypnois Fisch. & Mey.
Rhaponticum cynaroides Less.
„ pulchrum Fisch & Mey.
Rudbeckia bicolor Nutt.
„ maxima Nutt.

Scorzonera angustifolia L.
„ hispanica L.
Senecio Fuchsii C. C. Gmel.
„ subalpinus Koch.
„ vernalis Walldst. & Kit.
Serratula centauroides L.
„ gigantea Desf.
„ radiata M. B.
„ Wolffii Andrae.
Silphium connatum L.
„ terebinthinaceum Jacq.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago sparsiflora A. Gray.
Sonchus asper Hill.
„ laevis Vill.
Tagetes erecta L.
„ patula L. v. nana.
Taraxacum apenninum D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tragopogon ruber L.
Tridax trilobata Hemsl.
Troximon grandiflorum A. Gray.
Tussilago Farfara L.
Tyrimnus leucographus Cass.
Uropappus Clevelandi Greene.
Urospermum picroides F. W. Schmidt.
Verbesina helianthoides H. B. & K. Nov.
Volutarella Lippii Cass.
Xanthium italicum Moretti.
„ macrocarpum D. C.
„ Strumarium Ell.

Convolvulaceae.

Calonyction grandiflorum G. Don.
Argyreia splendens Sweet.
Convolvulus pentapetaloides L.
„ Pseudo-siculus Cav.
Cuscuta glomerata Choisy (Aster perennis).
„ Gronovii Willd. (Linum usitatissimum).
„ Gronovii v. calyptrata Englm. (Aster perennis).
„ japonica Choisy (Aster perennis).
„ maior D. C. (Humulus lupulus„ Urtica divica).
„ planiflora Tenore (Urtica maior).
Evolvus emarginatus Burm.
Ipomaea imperialis Hort.
„ purpurea Roth.
„ sibirica Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.
Pharbitis hispida Choisy.

Crassulaceae.

Sedum Alberti Rgl.
„ aureum Wirtg.
„ Cepaea L.
„ dasyphyllum L.
„ hispanicum L.
„ pinnatum Brot.
„ Selskianum Regel-Maack.

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum J. Gay.
Alyssum argenteum Witm.
„ calycinum L.
„ gemonense L.
„ Wierzbickii Heuff.
Barbarea praecox R. Br.
„ sicula C. & J. Presl.
„ vulgaris R. Br.
Brassica Napus L. v. oleifera, annua.
1. Balcanora.
„ Napus L. v. oleifera, biennis.
1. Biewitz.
2. Böhmen.
3. Holstein.
4. Holland.
5. humilis.
6. Kanada.
7. Schweden.
8. Uckermark.
„ rapa L. v. oleifera D. C. biennis.
1. Awehl.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ foetida Fries.
„ microcarpa Andrz.
„ sativa Crantz.
Carpoceras sibiricum Link.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.

Draba bronchialis D. C.
„ incana L.
„ muralis L.
„ pyrenaica L.
„ verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Reichb.
Erysimum cheiranthoides L.
„ cuspidatum D. C.
„ Perofskianum Fisch & Mey.
„ repandum L.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis Garrexiana All.
Isatis alpina All.
„ canescens D. C.
„ tinctoria L.
Malcomia africana Ait.
Melanosinapis communis Spenn.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus caudatus L.
„ sativus L. var. niger D. C.
„ sativus L. var. oleiferus.
Rapistrum Linnaeanum Boiss & Reut.
Schivereckia podolica Andrz.
Sinapis alba L.
„ Allioni Jacq.
„ arvensis L.
„ arvensis L. var. orientalis Murr.
„ chinensis L.
„ dissecta Lag.
„ juncea L.
„ nigra L.
Sisymbrium taraxacifolium D .C.
Syrenia cuspidata Reichb.
Teesdalia Iberis D. C.
Thlaspi arvense L.
„ ceratocarpum Murr.
„ Huetii Boiss.

Cucurbitaceae.

Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Echinocystis lobata Torr & Gray.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Asterocephalus brachiatus Reichb.
„ palaestinus Spreng.
Cephalaria alpina Schrad.
„ graeca Roem & Schult.
„ leucantha Schrad.
„ radiata Griseb & Schenk.
„ Thihatchewii Boiss.
Dipsacus atratus Hook. f. & Thoms.
„ azureus Schrenk.
„ fullonum Huds.
Knautia magnifica Boiss. & Orph.
Scabiosa caucasica M. B.

Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia agraria Bieb.
„ Bornmülleri Hausk.
„ exigua L.
„ falcata L.
„ Myrsinites L.
„ Peplis L.
„ platyphylla L.
„ Ypecacuanha L.
Mercurialis annua L.

Ficoideae.

Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
„ Fetisowi Regel-Winkler.
„ Kesselringi Regel.
„ lutea L.
„ macrophylla Pall.
„ Olivieri Griseb.
„ tibetica King.
„ triflora Pall.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.
„ Jacquinianum Fisch Mey & Avè Lall.
„ sebaceum Delile.

Geranium columbinum L.
„ dissectum L.
Impatiens biflora Walt.
„ capensis Meerb.
„ cristata Wall.
„ glandulifera Arn.
„ Roylei Walp.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
„ maius L.
„ minus L.

Globulariaceae.

Globularia bellidifolia Salisb.
„ nudicaulis L.
„ trichosantha Fisch & Mey.

Hydrophyllaceae.

Phaceliabipinnatifida Michx.
„ congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericineae.

Hypericum Ascyron L.
„ chinense L.
„ Gebleri C. A. Mey.
„ grandiflorum Choisy.
„ humifusum L.
„ japonicum Thunb.
„ quadrangulum L.
„ rumelicum Boiss.

Illecebraceae.

Herniaria cinerea D. C.
Scleranthus annuus L.
„ perennis L.

Labiatae.

Ajuga Chia Schreb.
Ballota nigra L.
Betonica Alopecurus L.
„ grandiflora Steph.
„ hirsuta L.
„ incana Mill.
„ officinalis L.
„ orientalis L.
Calamintha Acinos Clair.
„ Clinopodium Spen.
„ Nepeta Savi.
Dracocephalum austriacum L.
„ Moldavica L.
Elsholtzia Patrini Garcke.
Galeopsis latifolia Hoffm.
„ ochrolenca Lam.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch & Mey.
Lophanthus chinensis Benth.
Marrubium candidissimum L.
„ vulgare L.
Melissa officinalis L.
„ pyrenaica Jacq.
Mentha crispa L.
„ gentilis Sm.
„ piperita L.
„ suavis Guss.
„ viridis L.
„ viridis L. v. hortensis Wirtg.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda citriodora Cerv.
„ clinopodia L.
„ Kalmiana Pursh.
Mosla ocymoides Buch & Ham.
Nepeta cyanea Stev.
„ grandiflora Bieb.
„ granatensis Boiss.
„ nuda L.
„ racemosa Lam.
„ ucranica L.
Origanum pulchrum Boiss & Heldr.
„ vulgare L.
Phlomis americana Naud.
„ armeniaca Willd.
„ samia L.
„ tuberosa L.
Preslia arguta Benth.
Prunella elongata Dougl.
„ incisa Link.
„ pyrenaica Philippe.
„ Webbiana Loud.
Salvia acaulis Vahl.
„ amplexicaulis Reichb.
„ Bertolonii Vis.
„ dominica L.
„ gigantea Desf.

Salvia glutinosa L.
„ Horminum L.
„ nilotica Murr.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ Przewalskii Maxim.
„ Pseudo-silvestris Stapf.
„ valentina Vahl.
„ Verbenacea L.
Satureia hortensis L.
„ marifolia Caruel.
„ montana L.
Scutellaria albida L.
„ baicalensis Georgi.
„ commutata Guss.
„ macrantha Fisch.
„ minor Huds.
„ orientalis L.
„ versicolor Nutt.
Sideritis hyssopifolia L.
„ taurica Willd.
Stachys annua L.
„ arvensis L.
„ aurea Benth.
„ heraclea All.
„ lanata Jacq.
„ leucoglossa Griseb.
„ palustris L.
Thymus citriodorus Schreb.
„ transsilvanicus Schur.
„ vulgaris Sm.
Trichostema dichotomum L.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey.

Leguminosae.

Astragalus armatus Willd.
„ armeniacus Boiss.
„ boeticus L.
„ canadensis L.
„ cassubicus Jord.
„ Cicer L.
„ cylindraceus D. C.
„ falcatus Lam.
„ galegiformis L.
„ Glycyphyllus L.
„ maximus Willd.
„ monspessulanus L.
„ podocarpus C. A. Mey.
Baptisia minor L.
Caragana arborescens Lam.
„ pygmaea D. C.
Cicer arietinum L.
„ „ „ v. nigrum.
„ „ „ „ rotundum.
Colutea longialata Koehne.
„ orientalis Lam.
Coronilla cretica L.
„ vaginalis Lam.
„ varia L.
Cytisus capitatus Scop.
„ glabrescens Sartor.
„ hirsutus L.
„ leucanthus Walldst.-Kit.
„ ruthenicus Fisch.
„ Weldeni Vis.
Dolichos Catjang L.
„ falcatus Klein.
„ Lablab L.
„ sesquipedalis L.
„ tuberosus Lam.
Ervum abessinicum Hor.
„ Ervilia L.
„ monanthum Desf.
Galega officinalis L.
„ orientalis Lam.
„ persica Pers.
Genista sagittalis L.
Hedysarum esculentum Ledeb.
Hosackia Purshiana Benth.
Lathyrus alatus Tenore.
„ articulatus L.
„ Cicera L.
„ cirrhosus Ser.
„ Clymenum L.
„ flaccidus Dalla Torre & Sarnth.
„ Gorgoni Parl.
„ heterophyllus Retz.
„ hirsutus L.
„ incurvus Reichb.
„ maritimus Bigel.
„ megalanthus Steud.
„ montanus Berh.
„ Nissolia L.
„ Ochrus D. C.
„ odoratus L.
„ pisiformis L.
„ pyrenaicus Jord.
„ rotundifolius Willd.

Lathyrus sativus L.
„ silvestris L.
„ silvestris L. v. Wagneri.
„ stipulaceus Le Conte.
„ tingitanus L.
„ tuberosus Muhl.

Lens esculenta Moench.
„ „ „ (grau v. Arden).
„ „ „ (Hellerlinse).
„ „ „ v. nigra (Samen aus Rumenien).
„ peruviane L.

Lotus edulis L.
„ ornithopodioides L.
„ tenuifolius L.
„ uliginosus Schkuhr.

Lupinus affinis Agardh.
„ albo-coccineus Hort.
„ angustifolius L.
„ angustifolius L. v. albus.
„ Cruckshauksii Hook.
„ Douglasii Agardh.
„ elegans L.
„ grandifolius Lindl.
„ Hilarianus Benth.
„ luteus L.
„ maximus L.
„ Menziesii Torr.
„ micranthus Dougl.
„ perennis L.
„ polyphyllus Dougl.
„ reticulatus Desv.
„ subcarnosus Hook.
„ sulphureus Dougl.
„ Termis Forsk.

Medicago apiculata Willd.
„ arabica L.
„ denticulata Willd.
„ echinata D. C.
„ lappacea L.
„ lupulina L.
„ minima Desr.
„ Murex Willd.
„ orbicularis All.
„ sativa L.
„ scutellata Pall.
„ Terebellum Willd.

Melilotus altissima Thuill.
„ compacta Salzm.
„ italica Lam.
„ neapolitana Tenore.
„ parviflora Desf.
„ segetalis Ser.
„ sulcata Desf.

Onobrychis Caput-Galli Lam.
„ Crista-Galli Lam.
„ montana D. C.
„ sativa Lam.

Ornithopus sativus L.

Orobus niger L.
„ vernus L.

Oxytropis ochroleuca Bunge.
„ sulphurea Ledeb.

Phaseolus cerasiferus L.
„ ellipticus Hort. v. carneus.
„ lunatus L.
„ lunatus L. v. tunkinensis Lour.
„ multiflorus Willd.
„ Ricciardianus Tenore.
„ vulgaris L. compressus Moench.
„ „ „ v. communis.
„ „ „ „ gonospermus Savi.
„ „ „ „ nanus L.
„ „ „ „ nigerrimus Jurs.
„ „ „ „ oblongus Savi.
„ „ „ „ tuberosus.

Pisum arvence L.
„ Jomardi Schrank.
„ quadratum Mill.
„ saccharatum Hort.
„ sativum L.
„ „ „ v. abyssinicum
„ „ „ „ Concentator L.
„ „ „ „ Dickson's allerfrüheste.
„ „ „ „ hibernum Hort.
„ „ „ „ Michauxii L.
„ „ „ „ saccharatum Schb. giganteum griseum.
„ „ „ „ thebaicum L.

Soja hispida Moench v. nigra.

Tetragonolobus purpureus Moench.
„ Requienii Fisch & Mey.
„ siliquosus Roth.

Thermopsis caroliniana C. A. Curt.

Trifolium agrarium L.
„ alexandrinum L.
„ alpestre L.
„ arvense L.
„ elegans Savi.
„ glomeratum L.
„ hybridum L.
„ incarnatum L.
„ libanoticum Ehrenb.
„ Lupinaster L.
„ medium L.
„ minus Koch.
„ montanum L.
„ olympicum Hornem.
„ pannonicum L.
„ pratense L.
„ repens L.
„ resupinatum L.
„ rubens L.
„ trichocephalum M. Bieb.

Trigonella coerulea Ser.
„ Foenum graecum L.
„ monspeliaca L.

Vicia angustifolia Roth.
„ atropurpurea Desf.
„ Barbazitae Guss & Tenore.
„ cassubica L.
„ cordata Tenore.
„ Cracca L.
„ disperma D. C.
„ dumetorum L.
„ Faba L. var. dura.
„ „ „ „ maior.
„ „ „ „ mazagana.
„ „ „ „ minor.
„ ferruginea Bess.
„ grandiflora Scop.
„ hirsuta Koch.
„ hybrida L.
„ lathyroides L.
„ ludoviciana Nutt.
„ lutea L.
„ Michauxii Bieb.
„ Narbonensis L.
„ onobrychioides L.
„ pannonica Crantz.
„ peregrina L.
„ picta Fisch & Mey.
„ rubra Walp.
„ sativa L.
„ „ „ v. dalecarliensis.
„ „ „ „ dura.
„ „ „ „ leucosperma.
„ „ „ „ thebanensis.
„ „ „ „ valentina.
„ segetalis Thuill.
„ sepium L.
„ silvatica L.
„ striata M. B.
„ tetrasperma Moench.
„ villosa.

Linaceae.

Linum africanum L.
„ altaicum Fisch.
„ americanum L. v. album.
„ angustifolium Huds.
„ campanulatum L.
„ corymbiferum Desf.
„ extraaxillare Kit.
„ gallicum L.
„ humile L.
„ Lewisii Pursh.
„ maritimum L.
„ Mülleri Moris.
„ perenne L.
„ sibiricum D. C.
„ usitatissimum L.
1. crepitans.
2. hibernum.
3. hungaricum.
„ usitatissimum L. (Erfurt).
„ „ „ (Pirna).
„ „ „ (Pskoff, Rossia).
„ „ „ (Riga).
„ „ „ (Vega v. Valentia).
„ „ „ (Gelbsamiger.

Lythrarieae.

Cuphea petiolata Pohl.
„ Zimapani E. Morr.
Lythrum myrtifolium Lodd.

Malvaceae.

Abutilon Sonneratianum Sweet.
Althaea apterocarpa Fenzl.
„ armeniaca Tenore.
„ atrocarpa Fenzl.
„ chinensis Cav.
„ Heldreichii Boiss.
„ kurdica Schlecht.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
„ spicata Spreng.
„ sulphurea Boiss & Hohen.
Anoda crenatifolia Orteg.
„ cristata Schlecht.
Callirhoë involucrata A. Gray.
Hibiscus africanus Roth.
„ Trionum L.
Kostelezkya pentacarpa Ledeb.
Lavatera cachemiriana Cambess.
„ decumbens G. Don.
„ Davaei Pereira Continho.
„ malvaefolia Cav.
„ neapolitana Tenore.
„ thuringiaca L.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
„ trifida Cav. v. grandiflora Hort.
Malva abyssinica A. Br.
„ borealis Wallm.
„ brasiliensis Desr.
„ Durieui Spach.
„ glomerata Hort.
„ mauritiana L.
„ Morenii Pollini.
„ nicaeënsis All.
„ radiata L.
„ rotundifolia L.
„ silvestris L.
Napaea dioica L.
Palava flexuosa Mast.
„ malvaefolia Cav.
Sidalcea neomexicana A. Gray.
„ oregana A. Gray.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus floribundus Choisy.

Onagrarieae.

Epilobium adnatum Griseb.
„ anagalidifolium Lam.
„ boreale.
„ chilense Haussk.
„ davuricum Fisch.
„ lanceolatum Sebast.
„ spinatum Lam.
Eucharidium grandiflorum Fisch & Mey.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia amoena G. Don.
„ grandiflora Lindl.
„ Lady Satin.
„ Romanzowii Spach.
„ rubicunda Lindl.
„ Whitneyi × Hort.
Jussieua salicifolia H. B. & K. Nov.
Kneiffia floribunda Spach.
„ fruticosa Spr.
„ gracilis Bartl.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera alsinifolia Willl.
„ Berteriana Spach.
„ biennis L.
„ caespitosa Nutt.
„ Lamarkiana Ser.

Orobanchaceae.

Orobanche crenata Forsk (Vicia Faba).
„ Eryngii Duby (Eryngium).
„ flava Mart. (Petasites niveus).
„ Salviae F. Schultz (Salvia glutinosa).

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
„ fungosa Greene.
Argemone Barclayana Penny.
„ mexicana Sweet.
„ sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Hort.
Chelidonium Franchetianum Pran.
Corydalis sempervirens Pers.
Eschscholtzia crocea Benth.

Fumaria officinalis L.
Glaucium corniculatum Curt.
„ luteum Scop.
„ phoeniceum Crantz.
„ Sprengeri Heldr.
Hunnemannia fumariaefolia Sweet.
Hypecoum caucasicum Koch.
„ pendulum L.
Papaver album L.
„ Argemone L.
„ bracteatum Lindl.
„ californicum A. Gray.
„ caucasicum Bieb.
„ dubium L.
„ glaucum Boiss & Haussk.
„ Heldreichii Boiss.
„ hybridum L.
„ nudicaule L.
„ oreophyllum Rupr.
„ orientale L.
„ pavoninum Mey.
„ Rhoeas L.
„ somniferum L.
„ tauricolum Boiss.
Roemeria violacea Medic.

Plantagineae.

Plantago altissima Loisel.
„ arenaria Waldst & Kit.
„ argentea Chaix.
„ Candollei Rafin.
„ Cynops L.
„ graminea Lam.
„ hirtella H. B. & K. Nov.
„ indica L.
„ kamtschatica L.
„ lanceolata L.
„ maior L.
„ maior L. v. monstrosa.
„ media L.
„ Psyllium L.
„ purpurascens Nutt.
„ subulata L.
„ saxatilis Bieb.

Plumbagineae.

Armeria allioides Boiss.
„ alpina Willd.
Armeria boetica Boiss.
„ cassubica Boiss.
„ formosa Haynh.
„ longearistata Boiss & Reut.
„ plantaginea Willd.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
„ heterophylla Hook.
Gilia crassifolia Benth.
Phlox Drummondii Hook v. grandiflora.
Polemonium boreale Adams.
„ coeruleum L.
„ filicinum Greene.
„ foliosissimum A. Gray.
„ grandiflorum Benth.
„ himalayense Hook.
„ humile Willd.
„ lacteum Lehm.
„ mexicanum Cerv.
„ reptans L.
„ Richardsonii R. Gr.

Polygonaceae.

Emex Centropodium Meissn
Polygonum Bistorta L.
„ Convolvulus L.
„ Fagopyrum L.
„ Fagopyrum L. v. emarginatum.
„ marginatum L.
„ Persicaria L.
„ rotundatum Balb.
„ tataricum Gärtn.
„ tataricum Gärtn. v. secalinum.
Rheum officinale Baill.
„ palmatum L.
„ Rhaponticum L.
„ „ „ v. (Gross v. Cannstadt.)
„ „ „ v. Cyclop.
„ „ „ v. Delikatess.
„ undulatum L.
Rumex Acetosa L.
„ Acetosella L.
„ altissimus Wood.

Rumex cordifolius Hornem.
„ crispus L.
„ Lunaria L.
„ Patientia L.
„ pulcher L.
„ purpureus Poir.
„ salicifolius Weinm.
„ stenophyllus Ledeb.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
„ coerulea Schreb.
„ coerulea Schreb.
„ foemina Mill.
„ repens Pomel.
Androsace lactiflora Hort.
„ maxima L.
Asterolimon adoënse Kunze.
Lysimachia japonica Thunb.
„ quadrifolia L.
„ verticillata Bieb.
Primula carpatica Juss.
„ flagellicaulis Kern.
„ grandiflora Link.
„ macrocalyx Bunge.
„ media Peterm.
„ leucophylla Pax.
„ officinalis L.
„ Paxii W.
„ suaveolens Bertol.
„ uralensis Fisch.
„ variabilis Bast.
„ Thomasinii Gren & Godr.

Proteaceae.

Simsia calva A. Gray.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
„ Lycoctonum L.
„ orientale Mill.
„ Stoerkianum Reichb.
„ variegatum L.
Adonis autumnalis L.
„ flammea Jacq.
„ vernalis L.
Anemone cylindrica A. Gray.
„ decapetala J. F. Gmel.
„ multifida Poir.
„ parviflora Michx.
„ rivularis Buch & Ham.
„ virginiana L.
Aquilegia canadensis L.
„ nivea Baumg.
„ Skinneri Hook.
Caltha palustris L.
Clematis recta L.
Coptis anemonaefolia Sieb & Zucc
„ asplenifolia Salisb.
Delphinium bicolor Nutt.
„ Consolida L.
„ decorum Fisch & Mey.
„ dictiocarpum D. C.
„ discolor Fisch.
„ elatum L.
„ fissum Willd.
„ glabellum Turcz.
„ grandiflorum L.
„ paniceum L.
„ Przewalskii Huth.
„ silense Huth.
„ Skinneri Poir.
„ tatsienense Franch.
„ tirolense Kern.
„ tricolor Benth.
„ villosum Stev.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth & Sm.
„ arvensis L.
„ Bourgaei Jord.
„ ciliaris D. C.
„ coarctata C. C. Gmel.
„ damascena L.
„ diversifolia Franch.
„ Garidella Spen.
„ hispanica L.
„ Nigellastrum Willk.
„ orientalis Lam.
„ sativaL.
Paeonia corallina Retz.
„ humilis Willd.
„ lobata Pall.
„ triternata Pall.

Pulsatilla grandis Wender.
„ pratensis Mill.
Ranunculus acris L.
„ anemonaefolius D. C.
„ chaerophyllus L.
„ cordigerus Viv.
„ Chius D. C.
„ repens L.
„ sceleratus L.
Thalictrum alpinum L.
„ banaticum Rochel.
„ bulgaricum Velen.
„ cinereum Desf.
„ lucidum L.
„ maius Jacq.
„ medium Jacq.
„ petaloideum L.
„ pyrrhocarpum Ckodi.
„ sibiricum L.
„ sparsiflorum Turcz.
Trautvetteria palmata Fisch & Mey.

Resedaceae.

Reseda alba L.
„ crystallina Webb. & Berth.
„ inodora Reichb.
„ Jacquinii Reichb.
„ Luteola L.
„ Phyteuma L.
„ ramosissima Pourr.
„ stricta Pers.

Rosaceae.

Acaena cordifolia R. B.
„ myriophylla Lindl.
Agrimonia caffra E. Mey.
„ dahurica Willd.
„ Eupatoria L.
„ leucantha Kunze.
„ odorata Mill.
„ parviflora Ait.
„ repens L.
Alchemilla arvensis Scop.
„ pubenscens Bieb.
„ sulphurea L.
Comarum palustre L.

Cotoneaster acutifolia Turcz.
„ multiflora Bunge.
„ nigra Wahlenb.
„ vulgaris Lindl.

Geum album J. F. Gmel.
„ aleppicum Jacq.
„ canadense Murr.
„ chiloënse Balb.
„ coccineum Sibth & Sm.
„ japonicum Thunbg.
„ Laxmanni Gaertn.
„ magellanicum Lechler.
„ pallidum Fisch & Mey.
„ pyrenaicum Mill.
„ rubifolium Lej.
„ tirolense Kern.
„ triflorum Pursk.

Potentilla adscharica Sommier & Levier.
„ albanica Baldacci.
„ andicola Benth.
„ apennina Tenore.
„ astracanica Jacq.
„ astragalina Jacq.
„ calabra Tenore.
„ cataclines Lehm.
„ elegans Schlecht.
„ erecta L.
„ formosa D. Don.
„ geoides Bieb.
„ Hookeriana Lehm.
„ incanescens Opiz.
„ kurdica Boiss & Hohen.
„ montenegrina Pantoč.
„ pimpinelloides L.
„ pulcherrima Lehm.
„ ranunculoides Humb. & Bonpl.
„ salisburgensis Haenke.
„ splendens Ram.
„ tanacetifolia Willd.
„ taurica Willd.
„ Wrangeliana Fisch & Avè-Lall.

Poterium microphyllum Jord.
„ polygamum Walldst & Kit.
„ Sanquisorba L.
„ spinosum L.

Prunus virginica L.

Rosa alpina L.
„ „ „ cinnamomea L.
„ „ „ v. pyrenaica.
„ balsamea Bess.
„ cinnamomea L.
„ ferox Bieb.
„ glutinosa Sibth & Sm.
„ lucida Andr.
„ nitida Willd.
„ nutkana Presl.
„ pimpinellifolia L. v. marmorata.
„ rubrifolia Rupr.
„ spinulifolia Dematra.
„ virginica Mill.
Sanquisorba myriophylla Reichb.
Sibbaldia cuneata Hornem.
„ procumbens L.
Sorbus Hostii Heynh.
„ melanocarpa Heynh.
Spiraea Aruncus L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub & Spach.
„ hexaphylla All.
„ humifusa Bess.
„ laevigata L.
„ longiflora Waldst. & Kit.
„ montana Waldst & Kit.
„ orientalis Boiss & Hohen.
„ scutellaris Vis.
Crucianella aegyptiaca L.
„ gellanica Trin.
„ glauca A. Rich.
Galium Aparine L.
„ cinereum All.
„ Kitaibelianum Schult.
„ tricorne With.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae.

Ruta graveolens L.

Saxifragaceae.

Heuchera glabra Willd.
„ Richardsoni R. Br.
Mitella pentandra Hook.
Ribes pensylvanicum Lam.
Saxifraga crustata Vest.
„ Lapeyrousii D. Don.
„ pendurans Kit.
„ sibirica L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa linifolia Roezl.
Antirrhinum Huetii Reut.
„ maius L.
„ Orontium L.
„ rugosum Lour.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. Nov.
„ scabiosaefolia L.
Chelone Lyoni Pursh.
Digitalis alba Schrank.
„ ambigua Murr.
„ argyrostigma Fisch.
„ ferruginea L.
„ fulva Lindl.
„ gloxinoides L.
„ laevigata Waldst & Kit.
„ nevadensis Kunze.
„ ochroleuca Jacq.
„ purpurea L.
Linaria arvensis Desf.
„ genistifolia Mill.
„ multipunctata Hoffmg & Link.
„ reticulata Desf.
„ spuria Mill.
„ triornithophora Willd.
„ vulgaris Mill.
Mimulus Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
„ Sultani Benth.
Penstemon alpinus Torr.
„ diffusus Dougl.
„ procerus Dougl.
„ roseus G. Don.
„ virgatus A. Gray.
Rhinanthus villosus Pers. (Triticum vulgare)
Schistanthe peduncularis Kunze.
Verbascum glabratum Frivald.
„ nigrum L.

Veronica agrestis Fr.
„ arvensis L.
„ Beccabunga L.
„ caucasica M. Bieb.
„ excelsa Desf.
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl.
„ hederaefolia L.
„ incana L.
„ lanceolata Benth.
„ longifolia L.
„ maritima L.
„ persica Poir.
„ petraea Stev.
„ polita Fries.
„ praecox All.
„ spuria L.
„ Teucrium L.
„ triphyllos L.
„ Waldsteiniana Schott.
„ versicolor Vis.

Solanaceae.

Anisodus luridus Link & Otto.
Atropa Belladona L.
Browalia grandiflora R. Grah.
„ viscosa H. B. & K. Nov.
Cacabus quadrivalvis Hook.
Datura Bertolonii Parl.
„ inermis Jacq.
„ Leichardtii F. Muell.
„ quercifolia H. B. & K. Nov.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Dunalia inermis Boiss.
Hyoscyamus niger L.
„ pallidus Waldst. & Kit.
„ reticulatus L.
Nicandra physaloides Gärtn.
Nicotiana alata Link & Otto.
„ angustifolia Mill.
„ auriculata Bertol.
„ chinensis Fisch.
„ fructicosa L.
„ gigantea Ledeb.
„ glauca R. Groh.
„ glutinosa L.
„ longiflora Cav.
„ noctiflora Hook.
Nicotiana paniculata L.
„ rustica L.
„ Sanderiana Hort.
„ silvestris L.
„ solaniflora Walp.
„ Tabacum L.
„ texana Hort.
„ virginica Agardh.
„ viscosa Lehm.
Physalis philadelphica Lam.
Sarracha Joltomata Schlecht.
„ umbellata L.
Schizanthus grandiflorus Hort.
„ pinnatus Ruiz & Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
„ nigrum L.
„ racemiflorum Dun.

Umbelliferae.

Apium graveolens L. v. fol. crispis.
Astrantia Biebersteinii Fisch & Mey.
„ maior L.
Berula angustifolia Mert & Koch.
Bupleurum rotundifolium L.
Capnophyllum dichotomum Lag.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ bulbosum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spreng.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
„ „ „ v. lutea (Futtermöhre v. Saalfeld.
„ „ „ v. rubra.
Didiscus pusillus F. Muell.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium eburneum Decne.
„ giganteum Bieb.
Ferula thyrsiflora Sibth & Sm.
Foeniculum capillaceum Gilib.
„ officinale All.
Heracleum barbatum Ledeb.
„ persicum Desf.
„ ternatum Velen.
Laserpitium Panax Gouan.
Levisticum officinale Koch.

Libanotis buchtormensis D. C.
„ sibirica Koch.
Ligusticum scoticum L.
Lophosciadium meifolium D. C.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum austriacum Koch.
„ verticillare Spreng.
Pimpinella rotundifolia M. Bieb.
Prangos thapsioides D. C.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix brachycarpa Guss.
„ Pecten Veneris L.
Selinum Carvifolia L.
Seseli rigidum Waldst. & Kit.
Silaus flavescens Bernh.
„ pratensis Bess.
Siler trilobum Crantz.
Sium sisarum L.
Trachymene pilosa Sm.
Trinia vulgaris D. C.
Xanthogallum purpurascens Avè-Lall.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Urtica Dodartii L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Fedia scorpioides Dufr.
Patrinia intermedia Roem. & Schult.
Valeriana exaltata Mikan.
„ integrifolia Ledeb.
Valerianella coronata D. C.
„ membranacea Loisel.

Verbenaceae.

Verbena bonariensis L.
„ quadrangularis Vell.
„ teucroides Gill & Hook.
„ urticifolia L.

Violaceae.

Viola altaica Ker & Gawl.
„ canadensis L.
„ dactyloides Roem & Schult.
„ Jovi Janka.
„ labradorica Schrank.
„ lusitana Brot.
„ Munbyana Boiss.
„ rothomagensis Desf.
„ tricolor L. v. arvensis.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Anacampseros arachnoides Sims.
Aspidistra elatior Bl.
Artemisia argentea Ait.
Aucuba japonica Thunb v. picta.
Bryophyllum crenatum Baker.
Chloranthus erectus Sweet.
Convulvulus Cneorum L.
Crassula lycopodioides Lam.
Cuphea platycentra Benth.
Cyperus alternifolius L.
„ textilis Thunb.
„ gracilis R. Br.
Dyckia rariflora Schult.
Ficus stipulata Thunb.
Fuchsia alpestris Gardn.
„ corallina Hort.
„ gracilis Lindl.
„ procumbens R. Cunn.
Kleinia articulata Harw.
Libonia floribunda C. Koch.
Mackaya bella Harw.
Mesembryanthemum anceps Haw.
„ blandum Haw.
„ bulbosum Haw.
„ caulescens Mill.
„ crassulinum Spreng.
„ curvifolium Haw.
„ deltoides L.
„ echinatum Lam.
„ formosum Haw.
„ hirtellum Haw.
„ inconspicuum Haw.
„ Lehmani Eckel & Zeyh.
„ spectabile Haw.
Mesembryanthemum splendens L.
„ subincanum Haw.
„ Thunbergii Haw.
„ tumidulum Haw.
„ violaceum D. C.
Nephrolepis bostoniensis Hort.
Nertera depressa Banks & Soland.
Ophiopogon japonicus Ker & Gawl.
„ Jaburan Lodd.
Othonna crassifolia Harv.
Piper geniculatum Sw.
„ nigrum L.
Polypodium Lingua.
Reineckia carnea Kunth.
Rhipsalis Saglionis Otto.
„ grandiflora Haw.
Ruellia Devosiana Hort.
„ formosa Andr.
Salvia involucrata Cav.
Sansevieria zeylanica Willd.
Sedum sarmentosum Bunge.
„ Sieboldi Hort. fol. med. pictis.
„ Stahli Hort.
Selaginella africana.
„ caulescens Spring.
„ Martensii Spring.
„ uncinata Spring.
Sempervivum tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.
„ decorum Christ.
Strobilanthes Dyerianus Hort.
Tencrium Marum L.
„ fruticans L.
Veronica Traversii Hook.
Viburnum Tinus L.
Zingiber Zerumbet Rosc.

Tábor in Bohemia, 15. die m. Decembris 1914.

Ph. C. Ad. Kutín,
horti botanici assistens.

J. Svoboda,
hortulanus.

Prof. Dr. Fr. Bubák,
horti botanici moderator.

V. Trojan,
seminum conservator.

[illegible]